

BNCH201DCT

نامیاتی کیمیا

(Organic Chemistry)

بی۔ ایس سی۔ (آنرس)

چار سالہ پروگرام

دوسرا سمسٹر (کیمیا)

مرکز برائے فاصلاتی و آن لائن تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

حیدرآباد-32، تلنگانہ، بھارت

Copyright © 2025, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad

All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher (registrar@manuu.edu.in)

ISBN : 978-81-994264-0-5
Course : Organic Chemistry
First Edition : October 2025
Copies : 2100
Price : 126/- (The price of the book is included in admission fee of distance mode students)

Course Coordinator

Dr. Qasim Ullah, Senior Assistant Professor, Chemistry, School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India.

Editorial Board/Editors

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Prof. Salman Ahmad Khan | Professor (Chemistry), School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India. |
| 2. Prof. Pathan Mohd. Arif Ali Khan | Department of Chemistry, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce. Aurangabad. MH. India. |
| 3. Dr. Salahuddin Syed | Associate Professor (Chemistry), School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India. |
| 4. Dr. Qasim Ullah | Senior Assistant Professor (Chemistry), School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India. |
| 5. Prof. Lutfullah (Retd) | Department of Chemistry, Aligarh Muslim University, Aligarh. UP. India. |
| 6. Prof. Anees Ahmad (Retd) | Department of Industrial Chemistry Aligarh Muslim University, Aligarh. UP. India. |

Production

Prof. Nikhath Jahan, Professor (Urdu), CDOE MANUU	Mr. P Habibulla Assistant Registrar, Purchase & Stores Section, MANUU	Dr. Mohd Akmal Khan, Assistant Professor (C)/Guest Faculty, CDOE MANUU
Mohd Abdul Naseer Section Officer, CDOE MANUU	Shaik Ismail, UDC, CDOE, MANUU	Syed Faheemuddin, LDC Purchase & Stores Section, MANUU

On behalf of the Registrar, Published by:

Centre for Distance and Online Education

Maulana Azad National Urdu University

Gachibowli, Hyderabad-500032 (TG), India

Director: dir.dde@manuu.edu.in Publication: ddepublication@manuu.edu.in

Phone number: 040-23008314 Website: manuu.edu.in

CRC Prepared by the Dr. Mohammed Arifuddin, Faculty of Chemistry, CDOE, MANUU.

Printed at: Print Time & Business Enterprises, Hyderabad

فہرست

پیغام	5	وائس چانسلر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
پیغام	6	ڈائریکٹر، مرکز برائے فاصلاتی و آن لائن تعلیم
کورس کا تعارف	7	کورس کو آرڈی نیٹر

اکائی نمبر	اکائی کا نام	مصنف	صفحہ نمبر
1-	ساخت اور بندش	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	9
2-	نامیاتی مرکبات کا نظام تسمیہ	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	20
3-	نامیاتی مرکبات میں الکٹران منتقل	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	33
4-	گمک	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	41
5-	نامیاتی مرکبات کی میکانیت	ڈاکٹر محمد عارف الدین / ڈاکٹر شمشیر علی خان	55
6-	عامل اثر میڈیٹ	ڈاکٹر محمد عارف الدین / ڈاکٹر شمشیر علی خان	64
7-	نامیاتی مرکبات میں مکانی کیمیا	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	90
8-	مناظری ہم ترکیبی	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر شمشیر علی خان	99
9-	الکینس	ڈاکٹر سید صلاح الدین	119
10-	الکینس	ڈاکٹر سید صلاح الدین	135
11-	الکائینس	ڈاکٹر سید صلاح الدین	149
12-	سائیکلو الکینس	ڈاکٹر قسیم اللہ	160
	نمونہ امتحانی پرچہ		174
	لیب مینول	ڈاکٹر قسیم اللہ / ڈاکٹر محمد عارف الدین	176
	لیب مینول نمونہ امتحانی پرچہ		222

مصنفین کی تفصیلات

(Writer's Details)

Dr. Qasim Ullah, Senior Assistant Professor (Chemistry), School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India.	ڈاکٹر قسیم اللہ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر (کیمیا)، اسکول برائے سائنسی علوم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
Dr. Shamsheer Ali Khan, Retired Principal, Govt. Degree College, Husaini Alam, Hyderabad	ڈاکٹر شمشیر علی خان، ریٹائرڈ پرنسپل، گورنمنٹ ڈگری کالج، حسین علی، حیدرآباد
Dr. Salahuddin Syed, Associate Professor (Chemistry), School of Sciences, MANUU. Hyderabad. TG. India.	ڈاکٹر سید صلاح الدین، اسیوسیٹ پروفیسر (کیمیا)، اسکول برائے سائنسی علوم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
Dr. Mohammed Arifuddin, Assistant Professor/Guest Faculty, Chemistry, CDOE, MANUU.	ڈاکٹر محمد عارف الدین، اسسٹنٹ پروفیسر/گیسٹ فیکلٹی (کیمیا)، مرکز برائے فصلاتی و آن لائن تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

پروف ریڈر (Proof reader): ڈاکٹر قسیم اللہ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر (کیمیا)، اسکول برائے سائنسی علوم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

ٹائٹل پیج (Title Page): ابراہیم اکرم صدیقی

پیغام

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (MANUU) 1998 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے قائم کی گئی۔ یہ ایک مرکزی جامعہ ہے جس نے این اے اے سی کی جانب سے گریڈ A+ حاصل کیا ہے۔ اس جامعہ کے قیام کے مقاصد ہیں: (1) اردو زبان کا فروغ، (2) پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کو اردو میڈیم میں قابل رسائی اور دستیاب بنانا، (3) روایتی اور فاصلاتی طریقہ تعلیم کے ذریعے تعلیم فراہم کرنا، اور (4) خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا۔ یہ وہ نکات ہیں جو اس مرکزی جامعہ کو دیگر تمام مرکزی جامعات سے ممتاز کرتے ہیں اور اسے ایک انفرادیت بخشتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بھی مادری زبانوں اور علاقائی زبانوں میں تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

اردو کے ذریعے علم کے فروغ کا مقصد یہی ہے کہ اردو جاننے والے طبقے کے لیے عصری علوم اور مضامین تک رسائی آسان بنائی جائے۔ ایک طویل عرصے تک اردو میں درسی مواد کی کمی رہی ہے۔ اردو یونیورسٹی کے پاس اب اردو میں 350 سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے اور ہر سمسٹر کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

اردو یونیورسٹی این ای پی 2020 کے وژن کے مطابق مادری / گھریلو زبان میں تعلیمی مواد فراہم کرنے کے قومی مشن کا حصہ بننے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتی ہے۔ مزید یہ کہ اردو بولنے والا طبقہ اردو میں مطالعہ کے مواد کی عدم دستیابی کے سبب نئے اُبھرتے شعبوں اور جدید تر معلومات کے موجودہ میدانوں میں تازہ ترین معلومات و اطلاعات کے حصول سے محروم نہیں رہے گا۔ مذکورہ بالا میدانوں میں مواد کی دستیابی کی بدولت حصول معلومات کا نیا شعور بیدار ہوا ہے جو یقیناً اردو داں طبقے کی دانشورانہ ترقی پر اثر انداز ہو گا۔

فاصلاتی اور آن لائن طلبہ کے لیے تعلیم و تدریس کے عمل کو سہل بنانے کے لیے یونیورسٹی کا سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن (CDOE) اردو اور متعلقہ مضامین میں خود اکتسابی مواد (SLM) کی تیاری کو یقینی بناتا ہے۔

MANUU فاصلاتی اور آن لائن لرننگ کے طلبہ کے لیے SLM بلا معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ یہ مواد اردو کے ذریعے علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے برائے نام قیمت پر دستیاب ہے۔ تعلیم تک رسائی کے دائرے کو مزید پھیلانے کے مقصد سے، اردو / ہندی / انگریزی / عربی میں eSLM یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب رکھا گیا ہے۔

مجھے بے حد خوشی ہے کہ متعلقہ فیملی کی محنت اور مصنفین کے مکمل تعاون کی بدولت FYUG بی۔ اے، بی۔ ایس سی اور بی۔ کام کی کتابوں کی اشاعت کا عمل بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا ہے۔ فاصلاتی اور آن لائن لرننگ کے طلبہ کی سہولت کے لیے خود اکتسابی مواد (SLM) کی تیاری اور اشاعت کا عمل یونیورسٹی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے خود تعلیمی مواد کے ذریعے اردو جاننے والے ایک بڑے طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوں گے اور اس یونیورسٹی کے مقصد قیام کو پورا کریں گے اور اپنے ملک میں اپنی موجودگی کو جائز ٹھہرا سکیں گے۔

نیک تمناؤں کے ساتھ!

پروفیسر سید عین الحسن

شیخ الجامعہ، مانو

پیغام

موجودہ دور میں فاصلاتی تعلیم کو دنیا بھر میں ایک نہایت موثر اور مفید طریقہ تعلیم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس طریقہ تعلیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بھی اردو زبان بولنے والے عوام کی تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قیام کے وقت سے ہی فاصلاتی تعلیم کا طریقہ متعارف کرایا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے 1998 میں ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن (نظامت فاصلاتی تعلیم) کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور 2004 سے باقاعدہ پروگرام شروع ہوئے، اس کے بعد مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے۔

یو جی سی نے ملک میں نظام تعلیم کو موثر طور پر منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ (ODL) موڈ کے تحت چلنے والے مختلف پروگرام، جو سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن (CDOE) میں چل رہے ہیں، یو جی سی-ڈی ای بی کے منظور شدہ ہیں۔ یو جی سی-ڈی ای بی نے فاصلاتی اور باقاعدہ تعلیم کے نصاب کو ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے تاکہ فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔ چونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک ڈہرے طرز (ڈوئل موڈ) کی یونیورسٹی ہے جو فاصلاتی اور روایتی دونوں طریقہ تعلیم کی خدمات فراہم کرتی ہے، اس لیے اپنے مقاصد کو یو جی سی-ڈی ای بی کے رہنما خطوط کے مطابق حاصل کرنے کے لیے اس نے چوائس میڈ کریڈٹ سسٹم (CBCS) متعارف کرایا گیا جس کا خود اکتسابی مواد (Self Learning Materials) یو جی سی کے قوانین اور کریڈٹ فریم کے مطابق نئے سرے سے تیار کیے جا چکے ہیں۔

سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن (CDOE) کل انیس (19) پروگرام پیش کرتا ہے جن میں یو جی، پی جی، بی ایڈ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگرام شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی مہارتوں پر مبنی پروگرام بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ سی ڈی او ای نے جولائی 2025 سے این ای پی-2020 کے مطابق چار سالہ یو جی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ بی اے، بی ایس سی اور بی کام کے آئز پروگراموں کو این سی ایف کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے طلبہ کو آئز ڈگری حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ سال 2025-2026 سے ایم بی اے پروگرام اوڈی ایل موڈ میں متعارف کرایا گیا ہے۔

مانو نے طلبہ کی سہولت کے لیے نوریجنل سنٹرز (بنگلور، بھوپال، درجننگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر) اور چھ سب ریجنل سنٹرز (حیدرآباد، لکھنؤ، جموں، نوح، وارانسی اور امراتوتی) کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے واڑا میں ایک ایکسٹینشن سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ ان ریجنل اور سب ریجنل سنٹروں کے تحت ایک سو پچاس سے زیادہ لرنر سپورٹ سنٹر (LSCs) اور بیس پروگرام سنٹر بیک وقت چلائے جا رہے ہیں تاکہ طلبہ کو تعلیمی اور انتظامی سہولیات فراہم کی جاسکیں۔ سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور اپنے تمام پروگراموں میں صرف آن لائن موڈ کے ذریعے ہی داخلہ فراہم کرتا ہے۔

طلبہ کے لیے سیلف لرننگ میٹیریل (SLM) کی سوفٹ کاپی سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب کرائی جاتی ہیں اور آڈیو وویڈیو ریکارڈنگ کے لنک بھی ویب سائٹ پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ کو ای۔ میل اور واٹس ایپ گروپ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے جن کے ذریعے انہیں پروگرام کے مختلف پہلوؤں جیسے کورس رجسٹریشن، اسائنمنٹ، کاؤنسلنگ، امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ کاؤنسلنگ کے علاوہ گزشتہ دو برسوں سے طلبہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے زائد تدارک (Remedial) آن لائن کاؤنسلنگ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن تعلیمی اور معاشی طور پر پسماندہ آبادی کو عصری تعلیم کے دھارے میں شامل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی تعلیمی پالیسی (NEP-2020) کے مطابق مختلف پروگرامز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور توقع ہے کہ اس سے اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ کے نظام کو مزید موثر اور کارآمد بنانے میں مدد ملے گی۔

پروفیسر محمد رضا اللہ خان

ڈائریکٹر، سی ڈی او ای، مانو

کورس کا تعارف

اس کورس میں نامیاتی کیمیا- 1 کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بی۔ ایس سی (پہلے سمسٹر) کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کورس قومی تعلیمی پالیسی-2020 کے نصاب کے تحت 'بی۔ ایس۔ سی' کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نصاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ تھیوری کا ہے جو کہ بارہ (12) اکائیوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ لیب مینول کا ہے جس میں 4 اکائیاں ہیں۔ تھیوری میں جملہ تین بلاک ہیں اور ہر ایک بلاک میں چار اکائیاں ہیں۔ جب کہ لیب مینول میں صرف ایک بلاک ہے اور اس میں چار اکائیاں ہیں۔ ان اکائیوں کو مضمون کے ماہرین کے ذریعے کتابی شکل کی مطابقت میں اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ طالب علم اس کو آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکے۔

نامیاتی کیمیا- 1 پہلا حصہ تھیوری کا ہے جو کہ تین بلاک پر مشتمل ہے۔ ہر ایک بلاک کو چار-چار اکائیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح اس حصے میں جملہ بارہ اکائیاں ہیں۔ پہلے بلاک میں چار اکائیوں کے نام اس طرح ہیں۔ ساخت اور بندش، نامیاتی مرکبات کا نظام تسمیہ، نامیاتی مرکبات میں الکٹران منتقلی، اور گمک ہیں۔ اسی طرح دوسری بلاک کی اکائیوں کے نام اس طرح ہیں: نامیاتی مرکبات کی میکائیت، عامل انٹرمیڈیٹ، نامیاتی مرکبات میں مکانی ہم ترکیبیت، مناظری ہم ترکیبی ہیں۔ جبکہ تیسری بلاک کی اکائیوں کے نام اس طرح ہیں: الکنس، الکنس، الکانس اور سائیکوالکنس ہیں۔

ہر ایک اکائی کی شاخ اس طرح سے ہے۔ تمہید، مقاصد، عناوین، ذیلی عناوین، اکتسابی نتائج، کلیدی الفاظ اور نمونہ امتحانی سوالات۔ ہر ایک اکائی کے اختتام پر مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابوں کے نام دیے گئے ہیں جس سے طالب علم اس کورس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ کتاب کے آخر میں گزشتہ سال کا نمونہ امتحانی پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ لیب مینول کے کورس میں ایک بلاک ہے جس میں چار اکائیاں ہیں۔ کتاب کے آخر میں لیب مینول کا نمونہ امتحانی پرچہ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی امید کرتی ہے کہ یہ نصابی کتاب تھیوری اور لیب مینول طالب علموں کو کیمیا کے اعلیٰ پہلوؤں کو سمجھنے میں مؤثر اور مددگار ثابت ہوگی۔

قسیم اللہ

کورس کو آرڈی نیٹر

اکائی - 1: ساخت اور بندش

(Unit-1: Structure and Bonding)

اکائی کے اجزا

1.0	تمہید
1.1	مقاصد
1.2	نظریہ اختلاط اور سالمات کی ساخت
1.3	بند کی خصوصیات پر اختلاط کا اثر
1.4	بند کے پیرامیٹرس
1.4.1	بند کی لمبائی
1.4.2	بند کی توانائی
1.4.3	بند کا زاویہ
1.4	اکتسابی نتائج
1.5	نمونہ امتحانی سوالات

1.0 تمہید

کاربن کے مرکبات میں اختلاط یا (Hybridization) سے مراد اس میں موجود جوہری آرمیٹلس (Atomic Orbital's) کا آپس میں ملکر نئے مخلوط آرمیٹلس (Hybrid Orbital's) کا بننا ہے۔ یہ مخلوط آرمیٹلس ہی کیمیائی بندش میں حصہ لیتے ہیں۔ اختلاط سالموں کی ساخت اور انکی Geometry کے تعین کرنے کی لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔

1.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء کو اختلاط کے اصول اور اسکی قسموں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیگی۔ مزید طلباء کو کچھ مخصوص سالموں کی ساختوں کے بارے میں بھی جانکاری دی جائے گی۔ اسکے علاوہ طلباء کو کچھ خاص Bond Parameters جیسے کے 'بند کی لمبائی' 'بند کی توانائی' اور 'بند کا زاویہ' کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائیگی۔


1.2 نظریہ اختلاط اور سالمات کی ساخت



کاربن کی ایک انوکھی خاصیت یہ ہے کہ اس کی چھوٹی جسامت اور d آرٹبل کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف تین قسم کے اختلاط ظاہر کرتا ہے۔ کاربن میں تین طرح کے اختلاط جیسے sp ، sp^2 ، sp^3 واقع ہوتے ہیں۔ یہ کبھی $sp^3 d$ اختلاط کو ظاہر نہیں کرتا۔
اختلاط: کاربن مرکبات میں کاربن کے آرٹبلز آپس میں مل کر نئے آرٹبلز بناتے ہیں۔ اس عمل کو اختلاط کہتے ہیں اور حاصل ہونے والے نئے آرٹبلز کو مخلوط آرٹبلز کہتے ہیں۔ یہ مخلوط آرٹبلز کیمیائی بندش میں حصہ لیتے ہیں اور نئے بند بنا کر نئے کاربن کے مرکبات بناتے ہیں۔ اختلاط کا یہ عمل سالموں کی ساخت اور انکی Geometry کے تعین (Determine) کرنے کی لیے ذمہ دار ہوتا ہے

کاربن میں اختلاط

sp^3 اختلاط


کاربن کی الیکٹران کی تشکیل $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$ ہے۔ تحریکی حالت میں ایک الیکٹران $2s$ سے خالی $2p_z$ آرٹبل میں منتقل ہو جاتا ہے جس سے چار آرٹبلز میں ایک ایک الیکٹران موجود ہوتا ہے۔ اس حالت میں $2s$ اور تین $2p$ آرٹبلز میں اختلاط واقع ہوتا ہے۔
 (شکل 1.1)





شکل - 1.1: کاربن میں sp^3 اختلاط

CH_4 میں تمام C-H بند σ بند ہیں اور یہ sp^3-s برپوشی سے وجود میں آتے ہیں اس لیے ان کو σsp^3-s سے ظاہر کرتے ہیں۔
ایٹھین (C_2H_6) کی ساخت: ایٹھین کے کاربن میں sp^3 اختلاط واقع ہوتا ہے۔ C کے sp^3 اختلاطی آر بیٹل جو sp^3 مخلوط آر بیٹل کہلاتے ہیں ان میں ایک σ بند دو کاربن کے درمیان واقع ہوتا ہے اس کو sp^3-sp^3 سے ظاہر کرتے ہیں۔ جس کا مخصوص طول بند ہوتا ہے جو $1.54\text{\AA}$ کے برابر ہوتا ہے جبکہ تین مخلوط آر بیٹل ہائیڈروجن کے s آر بیٹل سے برپوشی کر کے s بند بناتے ہیں جن کو σsp^3-s سے ظاہر کرتے ہیں۔ (شکل 1.2)




شکل - 1.2: ایٹھین (C_2H_6) کی ساخت

جملہ 7 σ بند ہوتے ہیں جن میں ایک σsp^3-sp^3 اور 6 σsp^3-s ہوتے ہیں۔ اس مرکب میں دہرایا تہر ابند نہیں ہوتا۔


sp^2 اختلاط

کاربن کی تحریکی حالت میں جبکہ ایک s اور تین p آرٹیل میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے تو کاربن ایک (s) اور دو (p) آرٹیل استعمال کرتا ہے اور ایک p آرٹیل بغیر اختلاط کے ہوتا ہے جو π بند بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (شکل 1.3)



شکل - 1.3: کاربن میں sp^2 اختلاط

sp^2 اختلاط کی وجہ سے ایک Planar ساخت حاصل ہوتی ہے جس کا زاویہ 120° ہوتا ہے۔ (شکل 1.4)





شکل - 1.4: ایتھیلین (C_2H_4) کی ساخت

چونکہ اس مرکب میں π pz-pz بند واقع ہوتا ہے اس لیے اس میں دہرہ بند ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مرکب (یعنی Alkene) کو غیر شدہ ہائیڈروکاربن کہتے ہیں۔


sp اختلاط

تحریکی حالت میں ایک s اور تین p آر بیٹل میں ایک الیکٹران واقع ہوتا ہے تو بعض صورتوں میں کاربن اپنا صرف ایک s اور ایک p آر بیٹل کو اختلاط کے لیے استعمال کرتا ہے جبکہ دو p آر بیٹل غیر مخلوط رہتے ہیں اور یہ بند بناتے وقت Π بند بناتے ہیں۔ اس اختلاط کو sp اختلاط کہتے ہیں۔ اس سے ایسے مرکبات بنتے ہیں جس میں کاربن-کاربن تہرہ بند واقع ہوتا ہے مثلاً Alkyne (شکل 1.5)



شکل - 1.5: کاربن میں Sp اختلاط


دو کاربن جوہروں کے درمیان σ بند بنتا ہے جو sp مخلوط آر بیٹل کی برپوشی کی وجہ سے بنتا ہے۔ جبکہ دوسرا مخلوط آر بیٹل ہائیڈروجن سے برپوشی کر کے بند بناتا ہے جس کی نوعیت σ sp-s ہوتی ہے جبکہ C-C کے درمیان بند σ sp-sp ہوتا ہے۔ دو غیر مخلوط p آر بیٹل جانبی برپوشی کی وجہ سے دو Π بند بناتے ہیں۔ یہ اس میں ایک Π بند π py-py اور دوسرا π pz-pz ہوتا ہے جس کی وجہ سے کاربن-کاربن تہرہ بند واقع ہوتا ہے۔ (شکل 1.6)





شکل-1.6: اسیٹیلین (C_2H_2) کی ساخت

بنزین (C_6H_6) کی ساخت

بنزین ایک حلقہ دار عطری مرکب ہے جس میں چھ کاربن اور چھ ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں۔ اس مرکب میں ہر کاربن میں sp^2 اختلاط واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام کاربن کے جوہر ایک ہی سطح (Plane) میں واقع ہوتے ہیں۔ sp^2 اختلاط میں کاربن پر ایک p آر بیٹل غیر مخلوط ہوتا ہے جو سالمہ کی سطح پر عموداً Perpendicular واقع ہوتا ہے۔ تمام کاربن پر غیر مخلوط p آر بیٹل برپوشی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بنزین کے سالمہ کے دونوں جانب یعنی اوپر اور نیچے کی جانب الکٹرائی کثافت قائم ہو جاتی ہے۔ جس سے بنزین کا سالمہ ان دونوں الکٹرائی کثافت کے درمیان محصور ہوتا ہے۔ اس ساخت سے Kekule کی ساخت کو اخذ کیا گیا۔ جس میں باری باری یا ایک کے بعد دیگر سے دہرائندگی بات کی گئی تھی۔ وہ ساخت کے بعد صحیح معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کو مکمل رد بھی نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ بنزین کے بدلی تعاملات کی توضیح Kekule کی ساخت سے ہی سمجھائی جاسکتی ہیں۔ علاوہ ازیں گمک کو بھی اسی ساخت سے سمجھایا جاتا ہے۔ بنزین کی مخلوط ساخت کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ (شکل 1.7)





شکل - 1.7: بنزین (C_6H_6) کی ساخت

1.3 بند کی خصوصیات پر اختلاط کا اثر

بند کی خواص پر اختلاط کا اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو شریک گرتی بندروانی بند کے مقابلے میں کم توانائی والا ہوتا ہے۔ شریک گرتی بند رکھنے والے مرکبات کی خواص کی وجوہات پر مخلوط مرکبات کے خواص سے مختلف ہوتے ہیں جن پر ذیل کی سطور میں توضیح کی جاتی ہے۔ اختلاط کی وجہ سے ذیل کے خواص میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

2- جیومیٹرک ساخت

1- قیام پذیری

4- ترشی یا اساسی خاصیت

3- بند کے زاویہ کی تخصیص

1. قیام پذیری

مخلوط مرکبات کی قیام پذیری ان مرکبات کی قیام پذیری سے زیادہ ہوتی ہے۔ جن کے آرٹھل میں اختلاط واقع نہیں ہوتا۔ کیوں کہ مخلوط سائلے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے Bond Pair میں قوت دفع کمترین ہوتی ہے۔ جس سے قیام پذیری میں اضافہ ہوتا ہے مثلاً CH_4 میں sp^3 اختلاط واقع ہوتا ہے۔ جس سے Bond Pair ایک دوسرے سے اس حد تک دور ہوتے ہیں کہ جن میں قوت دفع نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن یہی مرکب اگر مخلوط ہو تو ہائیڈروجن جس میں s آرٹھل ہوتا ہے کی وجہ سے ایک s-s برپوشی اور تین sp برپوشی والا بند واقع ہو گا ان تمام کی توانائی الگ الگ ہوگی۔ اور sp برپوشی والے 90° پر واقع ہوں گے جن میں قوت دفع کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں

اور s-s بند کی نوعیت الگ ہوگی اس وجہ سے بہ حیثیت مجموعی سالمہ غیر قیام پذیر ہو جائے گا لیکن اس کی قیام پذیری کو sp^3 اختلاط سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے سالمے جن میں تمام بند یکساں ہوتے ہیں اور یہ sp^3 -s برپوشی سے وجود میں آتے ہیں ان میں قوت دفع کمترین ہوتی ہے کیوں کہ ان کے درمیان $28^\circ 109^\circ$ کا زاویہ واقع ہوتا ہے جس سے قوت دفع کمترین سطح پر پہنچ جاتی ہے مثلاً CO_2 ایک قیام پذیر مرکب ہے کیوں کہ اس میں sp اختلاط پایا جاتا ہے جبکہ CO ایک ناقیام پذیر مرکب ہے اس میں کوئی اختلاط واقع نہیں ہوتا اسی طرح کئی مثالیں ہیں جن میں قیام پذیری کی تبدیلی اختلاط کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔

2- جیو میٹرک ساخت

غیر مخلوط مرکبات کی کوئی مخصوص ساخت نہیں ہوتی لیکن مخلوط مرکبات ایک خاص ہندسی ساخت رکھتے ہیں مثلاً

sp^3 (Tetrahedral)	sp^2 (Planar) سطح
sp (Liner) خطی	sp^3d (Trigonal bipyramidal) مثلثی دواہرامی
sp^3d^2 (Octahedral)	sp^3d^2 (Pentagonal bipyramidal) محنسی دواہرامی

یہ ساختیں مستقل ہوتی ہیں اور ان میں عام حالات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

3- بند کے زاویہ کی تخصیص

اختلاط کی وجہ سے مرکب کے زاویہ کا بھی تخصیص ہو جاتا ہے۔

4- ترشی اور اساسی خواص میں تبدیلی

کاربن میں عام طور پر صرف sp^3 ، sp^2 اور sp اختلاط واقع ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ اختلاط s اور p آرٹھل کے درمیان واقع ہوتے ہیں اور کاربن میں d آرٹھل موجود نہیں ہو تو اس میں دیگر اختلاط واقع نہیں ہوتے اس قسم کے اختلاط ہیں۔ s کے حصہ کے اضافہ سے کاربن کی برقی منفیت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی ترتیب اس طرح ہے۔


$$sp > sp^2 > sp^3$$

اس کی وجہ یہ ہے کہ sp میں s اور p کا حصہ 50% ہے جبکہ sp^2 میں s کا حصہ 33% ہے جبکہ sp^3 میں 25% چونکہ sp میں s کا حصہ بہت زیادہ ہے اس لیے sp مخلوط کاربن بہت زیادہ برقی منفی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اساسی اور ترشی صلاحیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثلاً 1-Alkyne جس میں sp اختلاط واقع ہوتا ہے ترشی ہے جبکہ Ethene جس میں sp^2 اختلاط ہے اپنا π الکٹران بند بنانے کے لیے دیتا ہے اس لیے یہ لوئس کا اساس (Lewis Base) ہے جبکہ sp^3 اختلاط والے مرکبات نہ ترشہ ہیں نہ اساس۔

ترشی	sp^2 اساسی	sp^3 تعدیلی
------	--------------	---------------


1.4 بند کے پیرامیٹرس

شریک گرفتی بند (Covalent Bond) کی کچھ خاص بند کے پیرامیٹرس (Parameters) جیسے کہ 'بند کی لمبائی' بند کی توانائی اور بند کا زاویہ وغیرہ ہوتے ہیں جسکی وجہ سے یہ اپنی مخصوص پہچان رکھتا ہے۔ ان پیرامیٹرس کی وجہ سے کیمیائی مرکبات کی قیام پذیری اور ساخت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انکی وجہ سے یہ بند جوہروں کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں۔ (شکل 1.8)



شکل - 1.8: شریک گرفتی بند (Covalent Bond)

1.4.1 بند کی لمبائی: کسی بھی دو جوہروں کے درمیان بند کا فاصلہ بند کی لمبائی یا Bond Length کہلاتا ہے۔ بند کی لمبائی اسمیں شامل ہونے والے جوہروں کی قسموں اور Bond Order پر منحصر ہوتی ہے۔ (شکل 1.9)



شکل - 1.9: شریک گرفتی بند میں بند کی لمبائی


1.4.2 بند کی توانائی: کسی بھی سالمہ میں ایک مول سالمہ کے بند کو توڑنے کے لیے درکار توانائی اس بند کی بند توانائی (Bond Energy) کہلاتی ہے۔ کسی بھی بند کی بند توانائی اس سالمہ کی قیام پذیری کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ چندہ بند کی بند کی توانائی کو نیچے دیا گیا ہے۔ (جدول - 1.1)

جدول - 1.1

Bond Type	Bond	Bond Energy (kJ/mol)
Single Bonds	H-H	436

Single Bonds	C-H	413
Single Bonds	C-C	348
Double Bonds	C=C	614
Double Bonds	C=O	745
Triple Bonds	C≡C	839
Triple Bonds	N≡N	945

1.4.3 **بند کا زاویہ:** کسی بھی جوہر سے بننے والے دو شریک گرفتی بند کے درمیان پایا جانے والا زاویہ اس بند کا بند کا زاویہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی سالمہ کا بند کا زاویہ اس سالمہ کی ساخت اور Geometry کا تعین کرتا ہے۔ (شکل 1.10)



شکل - 1.10: شریک گرفتی بند میں بند کا زاویہ

1.5 اکتسابی نتائج

ہم نے اس اکائی میں معلوم کیا کہ

- ☆ نامیاتی مرکبات میں کاربن میں واقع ہونے والے اختلاط کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔
- ☆ چند نامیاتی مرکبات کی ساخت کو سمجھا۔
- ☆ اختلاط کی وجہ سے بند پر واقع ہونے والے اثرات کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔

1.6 کلیدی الفاظ

1. **اختلاط:** کاربن مرکبت میں کاربن کے آربٹلس آپس میں مل کر نئے آربٹلس بناتے ہیں۔ اس عمل کو اختلاط کہتے ہیں اور حاصل ہونے والے نئے آربٹلس کو مخلوط آربٹلس کہتے ہیں
2. **بند کی لمبائی:** کسی بھی دو جوہروں کے درمیان بند کا فاصلہ 'بند کی لمبائی' کہلاتا ہے۔
3. **بند کی توانائی:** کسی بھی سالمہ میں ایک مول سالمہ کے بند کو توڑنے کے لیے درکار توانائی اس بند کی بند توانائی کہلاتی ہے۔
4. **بند کا زاویہ:** کسی بھی جوہر سے بننے والے دو شریک گرفتی بند کے درمیان پایا جانے والا زاویہ اس بند کا بند کا زاویہ کہلاتا ہے۔

1.7 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- کاربن کتنے قسم کے اختلاط ظاہر کرتا ہے؟
- 2- بینزین میں ہر ایک کاربن پر کس طرح کا اختلاط ہوتا ہے؟
- 3- سائیکلو پروپین (Cyclopropane) میں ہر ایک کاربن پر کس طرح کا اختلاط ہوتا ہے۔
- 4- کاربن کی مکمل الیکٹرونی تشکیل کیا ہے؟
- 5- بند کی توانائی سے کیا مراد ہے۔
- 6- sp^2 اختلاط کی وجہ سے کس قسم کی ساخت حاصل ہوتی ہے؟

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- مرکب کی قیام پذیری پر اختلاط کا اثر بیان کیجیے۔
- 2- اسپٹیلین میں sp^3 اختلاط کو بیان کرتے ہوئے اسپٹیلین کی ساخت کو خاکہ کے ذریعہ سمجھائیے۔
- 3- C_2H_4 کی ساخت بنائیے۔
- 4- Bond Parameters پر مختصر نوٹ لکھیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- کاربن میں پائے جانے والے اختلاط پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔
- 2- اختلاط کی تعریف کیجیے۔ اختلاط کی وجہ سے بند پر واقع ہونے والے اثرات بیان کیجیے۔
- 3- بینزین (C_6H_6) کی ساخت مع خاکہ کے بیان کیجیے۔

اکائی-2: نامیاتی مرکبات کی نظام تسمیہ

(Unit-2: Nomenclature of Organic Compounds)

اکائی کے اجزا

2.0 تمہید

2.1 مقاصد

2.2 نامیاتی مرکبات کی جماعت بندی

2.3 طریقہ تسمیہ

2.4 اکتسابی نتائج

2.5 کلیدی الفاظ

2.6 پرچہ نمونہ سوالات

2.0 تمہید

نامیاتی کیمیا، علم کیمیا کی ایک اہم شاخ ہے جس کو عرف عام میں کاربن کیمیا (Carbon Chemistry) کہتے ہیں یہ کیمیا زمانہ قدیم سے موجود ہے لیکن یہ تجرباتی سائنس کے طور پر نہیں جانی جاتی تھی۔ لیکن علم کیمیا کے ارتقا کے ساتھ اس کو تجرباتی سائنس میں بدلا گیا تو اس علم کی تقسیم بھی ہوئی جسے ہم آج بنیادی طور پر طبعی کیمیا، غیر نامیاتی کیمیا اور نامیاتی کیمیا کا نام دیتے ہیں۔ دیگر تمام کیمیا جیسے بائیو کیمسٹری (Bio Chemistry)، زرعی کیمسٹری (Agricultural Chemistry)، طبی کیمسٹری (Medicinal Chemistry)، پالیمر کیمسٹری (Polymer Chemistry) وغیرہ سب ان بنیادی کیمیا کے وجہ سے وجود میں آئیں۔ نامیاتی کیمیا اتنا وسیع علم ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سنہ 2025 کے مطابق دوری جدول میں جملہ عناصر تقریباً 118 ہیں۔ ان میں سے 117 عناصر علیحدہ پڑے جاتے ہیں جبکہ دوری جدول میں 'C' کاربن ایک ایسا عنصر ہے جس سے ہزاروں مرکبات معرض وجود میں آئے ہیں۔ اس طرح صرف ایک عنصر کاربن کی وجہ سے ان گنت مرکبات وجود میں آئے ہیں جن کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک کاربن سے ان گنت مرکبات وجود میں آتے ہیں تو ان کے مطالعہ کے لیے اور تحقیق و تدقیق میں سہولت کے لیے ان کی جماعت بندی اور طریقہ تسمیہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔

2.1 مقاصد

- ☆ اس اکائی کے مطالعہ کے مقاصد یہ ہیں کہ
- ☆ علم کیمیا کی اس شاخ کا انفرادی طور پر مبسوط مطالعہ کیا جائے۔
- ☆ اس کیمیا کے بنیادی عنصر کاربن کے خواص اور بند کی مکمل معلومات حاصل کریں۔
- ☆ کاربن میں واقع ہونے والے اختلاط اور کثیر بندشی صلاحیت کا مطالعہ کیا جائے۔
- ☆ بہ حیثیت مجموعی کاربن اور ہائیڈروجن سے وقوع پذیر ہونے والے مرکبات کی پرجماعت بندی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔

2.2 نامیاتی مرکبات کی جماعت بندی

نامیاتی مرکبات کی کثرت کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان مرکبات کی جماعت بندی کی جائے تاکہ ان تمام مرکبات کے مطالعہ میں ایک نظام قائم ہو جائے اور آسانی سے ان کے خواص کا مطالعہ کیا جاسکے۔ ان مرکبات کو بنیادی طور پر دو بڑے گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

- (i) کھلے زنجیری مرکبات یا غیر حلقہ دار مرکبات (Open Chain Compounds / Acyclic)
- (ii) حلقہ دار مرکبات یا بند زنجیری مرکبات (Carbocyclic or Close Chain Compounds)

(i) کھلے زنجیری مرکبات یا غیر حلقہ دار مرکبات (Open Chain Compounds / Acyclic)

پہلی قسم کے مرکبات کو مزید دو ذیلی گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(a) سیر شدہ مرکبات (Saturated Hydrocarbons)

سیر شدہ مرکبات اس کی مثال Alkane ہے۔ ان مرکبات کا عمومی ضابطہ C_nH_{2n+2} ہے جبکہ n سے مراد کاربن کی تعداد ہے جیسے میتھین، CH_4 ، C_2H_6 ، پروپین (C_3H_8) وغیرہ۔

(b) غیر سیر شدہ مرکبات (Unsaturated Hydrocarbons)

دوسرا گروپ غیر سیر شدہ مرکبات کہلاتا ہے ان کو مزید دو ذیلی گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے ایسے مرکبات جن میں دہرا بند یا $(C=C)$ بند واقع ہو۔ ان مرکبات کا عمومی ضابطہ C_nH_{2n} ہوتا ہے مثال کے طور پر Alkene مثلاً $(H_2C=CH_2)$ Ethylene، $(H_3C-CH=CH_2)$ Propene وغیرہ۔ اسی گروپ کا دوسرا ذیلی گروپ ایسے مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے جن میں تھرا بند bond Triple واقع ہو جیسے Alkyne ان کا عمومی ضابطہ C_nH_{2n-2} ہے مثلاً Acetylene ($HC\equiv CH$) پرومائن ($H_3C-C\equiv CH$) وغیرہ ہے۔

غیر حلقہ دار مرکبات کو عام طور پر ہائیڈرو کاربنس Hydrocarbons کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ بنیادی طور پر C اور H پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مرکبات کو مجموعی طور پر Aliphatic مرکبات بھی کہا جاتا ہے۔


Carbocyclic Compounds or Homocyclic Compounds (ii)

کھلے زنجیری مرکبات میں آخری سروں پر پائے جانے والے کاربن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر یہ Terminal کاربن ایک دوسرے سے جڑ کر حلقہ بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان مرکبات کو حلقہ دار مرکبات کہا جاتا ہے۔ ان کی ذیلی دو اقسام ہوتی ہیں۔


(a) Alicyclic مرکبات یا Cyclo-aliphatic مرکبات: یہ وہ مرکبات ہیں جو Aliphatic مرکبات کے مماثل ہوتے ہیں لیکن ان میں حلقہ پایا جاتا ہے۔ ان میں سیر شدہ اور غیر سیر شدہ مرکبات ہوتے ہیں۔



Cyclopropane




Cyclobutane




Cyclopentane

مثلاً سیر شدہ حلقی دار مرکبات

ان کا عمومی ضابطہ C_nH_{2n} ہوتا ہے۔



Cyclohexene




Cyclopentene


نا سیر شدہ مرکبات

ان کا ضابطہ C_nH_{2n-2} ہوتا ہے۔


(b) یا عطری مرکبات (Aromatic Compounds): یہ بھی صرف C اور H سے بنتے ہیں۔ ان میں کثیر دوہرہ بند واقع ہوتا ہے گو کہ بظاہر غیر سیر شدہ نظر آتے ہیں لیکن کیمیائی اعتبار سے سیر شدہ مرکبات کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جیسے بینزین Benzene اور اس کے متعلقات جن کو Benzenoids کہتے ہیں۔ مثلاً بینزین، انیلین Aniline وغیرہ۔ اور جو بینزین کے مشتقات ہوں لیکن عطری خواص رکھتے ہوں Non-Benzenoid کہلاتے ہیں۔




Phenol فینول



Aniline انیلین




Benzene بنزین




جیسے Cyclopentadienyl

(iii) **Heterocyclic** مرکبات: یہ بھی حلقہ دار مرکبات کے مماثل ہوتے ہیں لیکن ان کی یہ نمایاں خاصیت ہوتی ہے کہ ان کے حلقہ میں کاربن کے علاوہ کوئی دوسرا جوہر جیسے N،S،O حلقے کا رکن ہوتے ہیں۔ مثلاً فیورین (Furan)، تھایوفین (Thiophene)، پیروول


(Pyrrole)



Furan



Thiophene



Pyrrole

2.3 نامیاتی مرکبات کا طریقہ تسمیہ

1. عام طریقہ تسمیہ (Common or Trivial Names)

ابتدائی دور میں جب نامیاتی مرکبات کی تعداد کم تھی اس وقت نامیاتی مرکبات کے نام ان کے ذرائع یا منبع اور ان کی تاریخ کی بنیاد پر رکھے جاتے تھے۔ مثلاً Methane جو دلدلی مقامات سے خارج ہوتی ہے اس کا نام Marsh gas دیا گیا۔ یوریا Urea جو Urine سے مشتق ہے۔ گلوکوز جس کا مزہ میٹھا ہے اس مٹھاس کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ فارمک ترشہ Formic Acid سرخ چوٹیوں کو کچل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ چوٹیوں کو Formica کہتے ہیں اس لیے اس کے ذریعے کی اساس پر یہ نام دیا گیا۔ الغرض ایسے مختلف مرکبات کے نام دئے جاتے تھے جو کسی سائنسی بنیاد پر نہ ہوتے، اسی لیے ان کو Common Names کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نامیاتی مرکبات کی تیاری کے طریقوں میں نت نئی ایجادات ہوئیں اور نئے نئے مرکبات وجود میں آئے اور ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا تو ایک ایسے طریقہ تسمیہ کی ضرورت پیش آئی جس کی بنیاد نہ صرف مضبوط اور سائنسی ہو بلکہ ہر نئے مرکب کے نام دینے کے لیے بہت عرصہ تک کارآمد ہو۔ سب سے پہلے 1892ء میں بین الاقوامی کیمیکل کانگریس نے ایک طریقہ پیش کیا جس کو Geneva System of Nomenclature کا نام دیا گیا۔ اس طریقہ سے مرکبات کے Systemic نام دئے گئے۔ لیکن یہ طریقہ بھی بعد میں ناکافی تصور کیا جانے لگا کیوں کہ متعدد مرکبات جن میں کثیر عملی گروپ Functional Group موجود ہوں یا وہ پیچیدہ مرکب ہوں تو ایسی صورت میں جینوا سسٹم ناکام ہو جاتا

ہے اس مشکل پر قابو پانے کے لیے 1930ء میں جینو اسٹم میں تبدیلیاں کی گئیں اور قواعد متعین کیے جن کی مدد سے ہر قسم کے مرکبات کے نام آسانی سے رکھے جاسکتے ہیں اس طریقہ کو (IUC) رائج کیا گیا یہ بھی بنیادی طور پر Systemic طریقہ کی بدلی ہوئی شکل تھی۔

1957ء میں IUC طریقہ کو IUPAC سے بدل دیا گیا IUPAC دراصل International Union of Pure and Applied Chemistry کا مخفف ہے۔ یہ طریقہ پوری دنیا میں قابل قبول اور رائج ہے۔ ہم اب IUPAC طریقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔

2. IUPAC کا طریقہ

اس طریقہ میں ہر کیمیائی ساخت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بنیادی ساخت کے اساس پر منحصر ہے اور اسی بنیادی ساخت کی تمام دیگر مرکبات متبدلہ شکل میں اس کے لیے تین بنیادی حصے ہیں۔

Root Word (i)

Primary Suffix (ii) ابتدائی لاحقہ

Secondary Suffix (iii) ثانوی لاحقہ

Prefixes (iv) سابقہ

1. Root Word

روٹ ورڈ سے مرکب کی بنیادی ساخت یا زنجیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ C_1 سے C_4 کے نام کے لیے مخصوص روٹ ورڈ مستعمل ہے جب کہ C_5 سے Greek (یونان) اعداد استعمال کیے جاتے ہیں۔ (جدول-2.1)

جدول-2.1: روٹ ورڈ

کاربن زنجیر	روٹ ورڈ	کاربن زنجیر	روٹ ورڈ
C_1	METH	C_7	HEPT
C_2	ETH	C_8	OCT
C_3	PROP	C_9	NON
C_4	BUET	C_{10}	DEC
C_5	PENT	C_{11}	UNDEC
C_6	HEX	C_{12}	DODEC

2- ابتدائی لاحقہ (Primary Suffix)

یہ وہ لاحقے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرکب سیر شدہ ہے یا غیر سیر شدہ ان لاحقوں کو روٹ ورڈ کے آگے استعمال کیا جاتا ہے۔ (جدول-2.2)

جدول-2.2: ابتدائی لاحقے

مرکب کی نوعیت	کاربن بند	ابتدائی لاحقے	مرکب کا جنسی یا عام نام
سیر شدہ کاربن	C-C	-ane	Alkane
غیر سیر شدہ کاربن	C=C	-ene	Alkene
غیر سیر شدہ کاربن	C≡C	-yne	Alkyne

3- ثانوی لاحقے (Secondary Suffix)

یہ لاحقے وہ ہیں جن کو ابتدائی حصوں کے بعد لایا جاتا ہے۔ ان سے مرکب کی حقیقی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ یہ دراصل مرکب میں موجود فعلی گروپ Functional Group کو ظاہر کرتے ہیں۔ (جدول-2.3)

جدول-2.3: ثانوی لاحقے

فعلی گروپ	ثانوی لاحقے	فعلی گروپ کی علامت	فعلی گروپ	ثانوی لاحقے	فعلی گروپ کی علامت
ہائیڈروکاربن	e	-CH-	کاربو آکسزلیک ترشہ	oic acid	-COOH
الکو حل	ol	-OH	ایسٹر	Oate	- C = O
آلڈ ہائیڈ	al	H-C = O	Alkyl Halide	yl halide	- C - X
کیٹون Ketone	one	(R) ₂ C = O	Nitro	Nitro	NO ₂
Acid Anhydride	-	-CO-O-OC-	Isonitrile	Isocyanide	- NC
Amines	-	-NH ₂	Nitrile	Cyanides	CN

ایک اجمالی نمونہ دیکھیں گے جس میں روٹ ورڈ اور ابتدائی اور ثانوی لاحقے کے استعمال سے کس طرح کسی مرکب کا نام رکھا جاتا ہے۔ (جدول-2.4)

جدول-2.4: روٹ ورڈ ابتدائی اور ثانوی لاحقے اور IUPAC نام

مرکب کا عمومی نام	بنیادی لفظ	ابتدائی لاحقے	ثانوی لاحقے	IUPAC نام
سیر شدہ ہائیڈروکاربن	Alk	-ane	-	Alkane

Alkene	-	-ene	Alk	Alkene
Alkyne	-	-yne	Alk	Alkyne
Alkanol	- ol	-ane	Alk	الکائیل الکوحل
Alkenol	- ol	-ene	Alk	غیر سیر شدہ الکوحل
Akanal	- al	-ane	Alk	سیر شدہ آلڈی ہائیڈ
Alkenal	- al	-ene	Alk	غیر سیر شدہ آلڈی ہائیڈ
Alkanone	- one	-ane	Alk	سیر شدہ کیٹون
Alkenone	- one	- one	Alk	غیر سیر شدہ کیٹون




4-سابقے (Prefix)

یہ کسی بھی مرکب کے نام کا وہ حصہ ہے جو مرکب کے نام سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ یہ سابقے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (i) ابتدائی

سابقے (Primary Prefix) (ii) ثانوی سابقے (Secondary Prefix)

(i) ابتدائی سابقے (Primary Prefix)

یہ صرف حلقہ دار نامیاتی مرکبات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حلقہ دار مرکبات جیسے C_4H_8 ، C_3H_6 وغیرہ اس کے نام سے قبل



(ii) ثانوی سابقے (Secondary Prefix)

اس قسم کے سابقے متبادل فعلی گروپ Substituents کے لیے مرکب کے حقیقی نام سے پہلے درج کیے جاتے ہیں۔ اگر متعدد ایسے گروپ موجود ہوں تو ان تمام کو حروف تہجی کی ترتیب میں مرکب کے نام سے پہلے درج کیے جاتے۔ (جدول-2.5)

جدول-2.5: بدلی گروپ کے سابقوں کے نام


بدلی گروپ	سابقوں کے نام	بدلی گروپ	سابقوں کے نام
X- (Halogen)	Halo	-COX (ایسڈ ہیلو آکسائیڈ)	Halocarboxy
Alkyl-R	Alkyl	-CN (سایانائیڈ)	Cyanato
-OH (الکوحل)	Hydroxy	-NC (آئیسو سائیائیڈ)	Isocyano
-OR (الکاکسی)	Alkoxy	-NO ₂ (نائیٹرو)	Nitro
-CHO (آلڈی ہائیڈ)	Formly	-NO (نائیٹروسو)	Nitroso
-CO (کیٹو)	Oyo, Keto	-NH ₂ (امائن)	Amine
-COO (ایسڈ)	Carboxy	SO ₃ H	Sulphonic
-COOR (ایسٹر)	Alkoxy	SO ₄ H	Sulpho

عددی سابقے (Numerical Prefix)


یہ عدوی سابقے اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب اصل زنجیر Main Chain پر ایک سے زائد ایک ہی قسم کے گروپ موجود ہوں یا کثیر بند سے کوئی بند ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہو۔ اس طرح ان گروپس کو بار بار کہنے کے بجائے ان سابقوں کی مدد سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

زنجیر کو نمبر اندازی کرنے کا طریقہ


پہلے مرکب میں Main Chain منتخب کیا جاتا ہے جن زنجیر میں سب سے زیادہ کاربن ہوں اس کو اصل زنجیر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر اندازی کرنے کے لیے اس جانب سے شروع کیا جاتا ہے جس جانب سے بدلی گروپ یا کثیر بند Multiple Bond کو کمترین نمبر حاصل ہو اس کو Lowest Sum Rule کہتے ہیں جس جانب بدلی گروپ قریب ہوں اس جانب سے نمبر اندازی کی جاتی ہے۔ مثلاً



مذکورہ بالا زنجیر میں کوئی بدلی گروپ نہیں ہے اس لیے جدھر سے چاہیں نمبر اندازی کی جاسکتی ہے لیکن بائیں جانب سے نمبر اندازی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔




II




I

طریقہ I غلط ہے کیوں کہ بدلی گروپ ($-\text{CH}_3$) کو عدد 4 ہوتا ہے جبکہ طریقہ II میں کمتر عدد (3) حاصل ہوتا ہے جو Lower Sum Rule کے مطابق ہے اسی طرح دہرا بند یا تہرا بند واقع ہو تو یہ خیال رکھا جانا چاہیے کہ ایسے بند کی کمترین عدد ظاہر کیا جائے مثلاً





II




I

طریقہ I صحیح نہیں ہے کیوں کہ $\text{C}=\text{C}$ کو عدد 3 دیا گیا ہے جبکہ شکل II میں اس بند کو عدد (2) حاصل ہوتا ہے جو صحیح ہے۔ اگر مرکب میں دہرا اور رتہرا بند ہو تو دہرے بند کو ترجیح دی جائے گی۔


بعض اوقات کاربن زنجیر کے آخری کاربن Terminal Carbon پر ہی فعلی گروپ ہو تو نمبر اندازی اسی کاربن سے کی جانی چاہیے بدلی گروپ کسی بھی کاربن پر ہوں مثلاً




Main Chain کاربن مرکبات میں ان کے نام کہنے سے قبل اصل زنجیر کی نشاندہی کی جانی چاہیے۔ بدلی گروپ کو Side Chain کہا جائے گا۔ اصلی زنجیر میں عموماً سب سے زیادہ کاربن ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کاربن زنجیر سے قیاسی طور پر دھاگہ گزارا جائے اور تمام کاربن اس میں آجائیں تو وہ اصلی زنجیر ہوگی اور باقی بدلی گروپ ہوں گے۔ چند مثالیں۔




طریقہ I میں زنجیر میں 7 کاربن ہیں اور دوسری زنجیر میں 6 کاربن ہیں تو اصلی چین ہی اصلی زنجیر ہوگی۔




زنجیر I میں 6 کاربن، زنجیر II میں 7 کاربن اور III میں 8 کاربن ہوں گے ایسی صورت میں اصل زنجیر، زنجیر III ہوگی۔ ان تمام اصول کی اساس پر مرکبات کے نام رکھیں جاتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں۔




3-Bromo-4-ethyl-2,5-dimethylhexane



4-Ethylheptane



4,5-Diethyloctane



3-Bromo-4-ethyl-5-methyloctane

اختلاف کے بنیادی اور اہم نکات کو جدول-2.6 میں بیان کیا گیا ہے۔

جدول-2.6: اختلاط کے بنیادی نکات

خواص	sp^3 اختلاط	sp^2 اختلاط	sp اختلاط
حصہ لینے والے آرٹھل کی تعداد	4	3	2
سالمہ کی ساخت	Tetrahedral	Planar	Linear
C-C طول بند	$1.54A^0$	$1.32A^0$	$1.2A^0$
C-H طول بند	$1.09A^0$	$1.08A^0$	$1.06A^0$
بند کا زاویہ	$109^0.28'$	120^0	180^0
مثال	Alkane	Alkene	Alkyne
عمومی ضابطہ	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n-2}
گروپ کا عمومی ضابطہ	C_nH_{2n+1}	C_nH_{2n-1}	C_nH_{2n-3}
نوعیت	سیر شدہ	غیر سیر شدہ	غیر سیر شدہ
کاربن کاربن بند کی نوعیت	(اکہر بند) C-C	(دہر بند) C=C	(تہر بند) $C \equiv C$
کیمیائی خاصیت	تعدیلی	اساسی	ترشی
عالمیت	غیر عامل (Paraffin)	زیادہ عامل	سب سے زیادہ عامل
قیام پذیری کی ترتیب	$sp^3 > sp^2 > sp$		
	-	sp^3 سے زیادہ	سب سے زیادہ

2.4 اکتسابی نتائج

ہم نے اس اکائی میں معلوم کیا کہ

☆ نامیاتی مرکبات کی جماعت بندی کی گئی۔

☆ ہم نے نامیاتی مرکبات کی ضرورت، تسمیہ اور طریقہ تسمیہ کا مطالعہ کیا۔ مختلف طریقوں میں IUPAC طریقہ کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔



2.5 کلیدی الفاظ

- 1- سیر شدہ مرکبات: اس کی مثال الکین ہے جیسے میتھین، CH_4 ۔ ان مرکبات کا عمومی ضابطہ C_nH_{2n+2} ہے جبکہ n سے مراد کاربن کی تعداد ہے
- 2- غیر حلقہ دار مرکبات: انکو عام طور پر ہائیڈروکاربن کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ بنیادی طور پر C اور H پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مرکبات کو مجموعی طور پر دہنی مرکبات بھی کہا جاتا ہے۔
- 3- عطری مرکبات: یہ بھی صرف C اور H سے بنتے ہیں۔ ان میں کثیر دوہرا بند واقع ہوتا ہے گویا کہ بظاہر غیر سیر شدہ نظر آتے ہیں لیکن کیمیائی اعتبار سے سیر شدہ مرکبات کی طرح عمل کرتے ہیں۔

2.6 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- غیر حلقی مرکب کے ایک مثال مع ساخت دیجیے۔



- 4- 2-Hydroxy-3-pentanone کی ساخت لکھیے۔

- 5- عطری مرکبات کی تعریف کیجیے۔

- 6- سیر شدہ مرکبات سے کیا مراد ہے۔ ایک مثال دیجیے۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- سیر شدہ اور ناسیر شدہ مرکبات کی تعریف کیجیے۔ مثالیں دیجیے۔
- 2- حلقہ دار مرکبات کی تعریف کیجیے۔ ان تمام میں کون سے لاحقے اور سابقے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھائیے۔
- 3- $HC \equiv CH$ ایک کمزور ترشی مرکب ہے وضاحت کیجیے۔
- 4- Ethylene ایک اساسی مرکب ہے وضاحت کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- نامیاتی مرکبات کی جماعت بندی کے بارے میں مکمل نوٹ لکھیے۔

2- نامیاتی مرکبات کے طریقہ تسمیہ پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔

3- IUPAC سسٹم کے اہم خدوخال بیان کیجیے۔ نیز یہ بھی بتائیے کہ یہ سسٹم دوسرے تمام طریقوں پر کیوں فوقیت رکھتا ہے۔

اکائی-3: نامیاتی مرکبات میں الیکٹران منتقل

(Unit-3: Electron Displacement in Organic Compounds)

اکائی کے اجزا

3.0 تمہید

3.1 مقاصد

3.2 امالی اثر (استقرائی اثر)

3.3 الیکٹرو میرک اثر

3.4 اکتسابی نتائج

3.5 کلیدی الفاظ

3.6 نمونہ امتحانی سوالات

3.0 تمہید

کیمیائی مرکبات کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات ہیں۔ مرکبات کی اس طرح درجہ بندی کی وجہ ان کے ماخذ ہیں۔ غیر نامیاتی مرکبات معدنوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات کی ساخت کھلی زنجیر نما (Open Chain) یا حلقہ نما (Cyclic) ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکبات ہائیڈرو کاربنس (Hydrocarbons) کہلاتے ہیں، جو دہنی (Aliphatic) یا عطری (Aromatic) ہوتے ہیں۔

نامیاتی مرکبات میں شریک گرفتی بند پایا جاتا ہے۔ کاربن کا جوہر چار شریک گرفتی بند تیار کر سکتا ہے۔ شریک گرفتی بند میں دو کاربن جوہروں کے درمیان ایک، دو یا تین الیکٹران جوڑ (Electron Pair) موجود ہوں، تو اکہر، دوہر یا تہر اہند حاصل ہوتا ہے۔ اگر کاربن۔ کاربن کے جوہروں کے درمیان اکہر اہند ہو تو اکہر شریک گرفتی بند حاصل ہوتا ہے۔ اگر کاربن کے ساتھ مختلف جوہر ہو تو بند قطبی ہوتا ہے۔ قطبیت کا انحصار جوہروں کے درمیان برقی منفیت کے فرق پر ہوتا ہے۔


اگر $X-C$ (X = مختلف جوہر) میں 'X' کی برقی منفیت کاربن سے زیادہ ہو تو یہ قطبی شریک گرفتی بند کہلاتا ہے۔ نامیاتی تعاملات سالمی یاروانی ہو سکتے ہیں اور رواں کیمیائی انواع کے طور پر حصہ لیتے ہیں۔

3.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء امالی اثر (Inductive Effect)، الیکٹرو میرک اثر (Electromeric effect)، میسومیرک اثر (Mesomeric effect)، گمک (Resonance)، بالامزدوجیت اور ان کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ دو قطبی معیار اثر اور ترشوں، اساسوں کی طاقت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔

3.2 امالی اثر یا استقرائی اثر (Inductive Effect)

اکہر اشتریک گرفتی بند مشترک الیکٹران جوڑ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مساوی الیکٹران کشش کی صلاحیت کے حامل دو جوہر یا گروپس اکہرے بند سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس بند کو مشابہ قطبی یا غیر قطبی (Homo Polar or Non-Polar) بند کہتے ہیں۔




اس طرح کے شریک گرفتی بند میں الیکٹران، دو جوہروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر Cl_2 یا H_2 سالمہ میں الیکٹران جوڑ کو جوہروں سے مساوی طور پر کشش کیا جاتا ہے اور سالمہ کا دو قطبی معیار اثر صفر ہوتا ہے۔

اکہرا بند میں دو مختلف جوہر ہوتو، الیکٹران جوڑ کے مقام میں تبدیلی ہوتی ہے اور الیکٹران جوڑ اعلیٰ برقی منفی جوہر کے جانب ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً HCl میں الیکٹران جوڑ کلورین کے قریب ہٹ جاتا ہے کیوں کہ کلورین کی برقی منفیت ہائیڈروجن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں Cl پر ہلکا منفی بار ($\text{Cl}^{\delta-}$) اور H پر ہلکا مثبت بار ($\text{H}^{\delta+}$) حاصل ہوتا ہے۔ ($\text{H}^+ - \text{Cl}^-$) اکہرے بند کے جوہروں میں منفی برقی منفیت کے فرق کے سبب برقی غیر تشاکل کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کو امالی اثر کہتے ہیں۔ امالی اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ($\rightarrow$) کا استعمال کیا جاتا ہے، جو برقی منفیت والے جوہر کی طرف ہوتا ہے۔ HCl کے لیے اس کو $\text{H} \rightarrow \text{Cl}$ کی طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں کلورین الیکٹران کشش کرتا ہے اس کو I ۔ اثر کہتے ہیں اور ہائیڈروجن الیکٹران دینے کا اثر کہتا ہے اس کو I^+ اثر کہتے ہیں۔


کاربن کی برقی منفیت ہائیڈروجن سے زیادہ ہوتی ہے۔ C-H بند میں الیکٹران کاربن کے قریب ہوتے ہیں۔ ($\text{H} \rightarrow \text{C}$) میتھائل گروپ میں تین C-H بند ہوتے ہیں اس طرح کاربن پر الیکٹران کا اضافہ ہوتا ہے۔

اگر اعلیٰ برقی منفیت جوہر Cl کاربن زنجیر سے جڑا ہو تو برقی بار زنجیر میں منتقل ہوتا ہے۔



فاصلہ میں اضافہ سے امالی اثر کم ہوتا جاتا ہے اور اس طرح تین یا چار بند کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے۔ C-1 پر مثبت برقی بار زیادہ ہوتا ہے اور C-2 ، C-3 کی جانب کم ہوتا رہتا ہے۔ کاربن کے جوہروں کی زنجیر کے امالی اثر کو زنجیر مالیت (Chain Induction) کہتے ہیں۔ کاربن زنجیر میں الیکٹران کے بہاؤ (Displacement) یا نقل مقام کو امالی اثر کہتے ہیں۔ اس کو I^+ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دائمی

اثر (Permanent Effect) ہے۔ نامیاتی مرکبات کے طبعی خواص مثلاً نقطہ جوش، نقطہ اجماع، ترشوں اور اساس کی طاقت، دو قطبی معیار اثر اور کیمیائی خواص پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ذیل میں I- اور I+ اثر کے گروپس کو بتلایا گیا ہے۔




امالی اثر کے استعمالات

1- کاربو آکسز الیک ترشوں کی طاقت (Strength of Carboxylic Acids)

ترشہ ایک پروٹان دہندہ (Proton Donor) ہے۔ طاقتور ترشہ، پروٹان دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ کاربو آکسز الیک ترشہ کی طاقت امالی اثر سے بیان کی جاسکتی ہے۔



الکٹران کشش کرنے والا گروپ (I- اثر) $-COOH$ سے جڑا ہو تو ترشی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر الکٹران دہندہ گروپ (I+ اثر)، $-COOH$ سے جڑا ہو تو ترشی طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ $HCOOH$ (فارک ترشہ) کی طاقت CH_3COOH سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ CH_3 گروپ ایک الکٹران دہندہ گروپ ہے اس لیے H^+ آسانی سے نہیں آزاد ہوتا ہے۔



$$K_a = 24 \times 10^{-5}$$

$$K_a = 1.85 \times 10^{-5}$$


کلورو ایسیٹک ترشہ ($ClCH_2COOH$) کی طاقت CH_3COOH سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ کلورین کی برقی منفیت زیادہ ہوتی ہے اور کلورین الکٹران کشش والا جوہر ہے۔



کلورو ایسیٹک ترشہ (طاقتور)

ایسیٹک ترشہ (کمزور)


مونو کلورو، ڈائی کلورو اور ٹرائی کلورو ایسیٹک ترشہ کی بڑھتی ہوئی طاقت ذیل میں دی گئی ہے۔ ٹرائی کلورو ایسیٹک ترشہ میں تین کلورین جوہر ہوتے ہیں اور یہ I- اثر رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ زیادہ طاقتور ترشہ ہے۔



ٹرائی کلورو ایسیٹک ترشہ ڈائی کلورو ایسیٹک ترشہ مونو کلورو ایسیٹک ترشہ ایسیٹک ترشہ



2- امین کی اساسی طاقت (Strength of Amines)

اساس، پروٹان کو قبول کرتا ہے یا الکٹران جوڑ (Electron pair) دہندہ ہے۔ امین مرکبات اساسی ہوتے ہیں، کیوں کہ ان میں نائٹروجن پر الکٹران جوڑ ہوتا ہے۔ الکٹران دہندہ یا +I اثر والا گروپ نائٹروجن سے جڑا ہوتا ہے، اساسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔





3- کاربن مثبت رواں کی قیام پذیری

امالی اثر، کاربن مثبت رواں کی قیام پذیری کی تشریح کرتا ہے۔ ثالثی کاربن مثبت رواں کی قیام پذیری زیادہ ہوتی ہے، کیوں کہ کاربن کا مثبت برقی بار، چار کاربن جوہروں پر منتشر ہوتا ہے۔ ثانوی اور ابتدائی امین میں کاربن کا مثبت بار تین اور دو کاربن پر منتشر ہوتا ہے اور قیام پذیری میں کمی واقع ہوتی ہے۔



4- کاربن منفی رواں کی قیام پذیری

کاربن منفی رواں کی قیام پذیری کو ذیل میں دیا گیا ہے۔




اکائیل گروپ (R) الکٹران دہندہ گروپ (+I اثر) ہیں۔ یہ گروپ کاربن کے جوہر پر الکٹران کی کثافت کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے قیام پذیری میں کمی اور عاملیت میں اضافہ ہوتا ہے۔


3.4 الیکٹرومیرک اثر (Electromeric Effect)

ایک ضعفی بند (دوہرہ بند، تہرہ بند) میں σ اور π الکٹران ہوتے ہیں۔ π الکٹرانس کی کشش مرکزی جوہروں سے کم ہوتی ہے اور ان میں آسانی سے قطبیت واقع ہوتی ہے۔ جب ایک متعامل بند کے قریب آتا ہے، تو الکٹرانس ایک جوہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں اس جوہر پر منفی برقی بار اور دوسرے جوہر پر مثبت برقی بار حاصل ہوتا ہے۔

+ E effect




- E effect




ایک ضعفی بند میں قطبی متعامل (Polar Reagent) کی وجہ سے مشترکہ الکٹران جوڑ کی ایک جوہر کی جانب مستقل طور پر منتقلی الیکٹرومیرک اثر کہلاتی ہے۔ یہ ایک عارضی اثر (Temporary Effect) ہے کیونکہ قطبی متعامل ہٹانے پر مرکب اصلی حالت میں واپس آجاتا ہے۔ الیکٹرومیرک اثر کو 'E' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

Propylene میں الیکٹرومیرک اثر کو دو طریقوں سے بتایا جاسکتا ہے۔ الکٹران شفٹ کا انحصار قطبی متعامل کی نوعیت پر ہوتا ہے۔



کاربونیل گروپ ($>\text{C}=\text{O}$) میں کاربن پر جزوی مثبت بار اور آکسیجن کی اعلیٰ برقی منفیت کی وجہ سے جزوی منفی بار ہوتا ہے جب قطبی متعامل کی وجہ سے مشترکہ الکٹران جوڑ مکمل آکسیجن جوہر پر منتقل ہوتا ہے اور کاربن پر مثبت برقی بار حاصل ہوتا ہے۔




اگر امالی اثر اور الیکٹرومیرک اثر ایک ساتھ واقع ہوں، تو تعامل میں الیکٹرومیرک اثر حاوی رہتا ہے۔

الیکٹرومیرک اثر کے استعمالات


1- الکین کے جمعی تعاملات: Br_2 اور ایتھیلین (Ethylene) کے جمعی تعامل سے 1'2-ڈائی برومو ایتھین (1,2-Dibromo Eethane) حاصل ہوتا ہے۔

ایتھیلین (C_2H_4) پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا لیکن Br_2 کے سالمے کی موجودگی میں قطبیت واقع ہوتی ہے اور $\text{Br}^{s+} - \text{Br}^{s-}$ (تقطیب شدہ برومین) حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے C_2H_4 کے π الیکٹرانس میں الیکٹرومیرک اثر ہوتا ہے اور C_2H_4 کے ایک کاربن پر مثبت جزوی برقی بار اور دوسرے کاربن پر منفی جزوی برقی بار حاصل ہوتا ہے۔ Br^{s+} کا کاربن منفی رواں پر اضافی عمل ہوتا ہے اور Br^{s-} کا کاربن مثبت رواں پر اضافی عمل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں Trans-1,2-dibromoethane حاصل ہوتا ہے۔



2- کاربونیل گروپ کے اضافی تعاملات: $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$ اور HCN کا اضافی تعامل:

ایسیٹون میں $\text{C}=\text{O}$ کے کاربن پر جزوی مثبت بار اور آکسیجن پر جزوی منفی بار ہوتا ہے۔ HCN کی وجہ سے $\text{C}=\text{O}$ کے π الیکٹرانس کی طرف حرکت کرتے ہیں اور اس پر منفی برقی بار حاصل ہوتا ہے۔ (الیکٹرومیرک اثر) جب کہ کاربن پر مثبت برقی بار حاصل ہوتا ہے۔ مرکز پسند CN^- فوری کاربن پر عمل کرتا ہے جب کہ H^+ کا تعامل آکسیجن پر ہوتا ہے۔



امالی اثر کی امتیازی خصوصیات

- (i) یہ سیر شدہ مرکبات میں عمل کرتا ہے
- (ii) اس میں σ بند حصہ لیتے ہیں
- (iii) جزوی برقی بار حاصل ہوتے ہیں
- (iv) یہ اثر مختصر فاصلہ تک عمل کرتا ہے

(v) اس اثر میں گمگ ساختیں نہیں ہوتی

3.5 اکتسابی نتائج

- اس اکائی میں ہم نے حسب ذیل کے بارے میں جانکاری حاصل کی:
- 1- ایک بند میں مخالف برقی بار کا پیدا ہونا، قطبیت کہلاتا ہے۔
 - 2- متجانس دو جوہری سالمہ کی قطبیت صفر ہوتی ہے۔ غیر متجانس دو جوہری سالمات میں قطبیت واقع ہوتی ہے۔ قطبیت کے درجے کا انحصار جوہروں کی برقی منفیت کے فرق پر ہوتا ہے۔
 - 3- ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی قطبیت کا درجہ حسب ذیل ہے۔
 $HF > HCl > HBr > HI$
 - 4- اکہرے بند میں برقی بار کا منتقل امالی اثر کہلاتا ہے، جب دو جوہر مختلف ہو۔
 - 5- امالی اثر کی مدد سے کاربائسک تیشوں کی طاقت، امین کی اساسی طاقت، کاربن مثبت رواں (Carbonium ion) اور کاربن منفی رواں (Carbanion) کی قیام پذیری کی تشریح کی جاسکتی ہے۔
 - 6- الیکٹرومیرک اثر، ضعیفی بند (دوہر ابندیاتہر ابندی) میں واقع ہوتا ہے۔

3.6 کلیدی الفاظ

- 1- امالی اثر : سیر شدہ نظام میں الیکٹران کی ترسیل۔
- 2- میسومیرک اثر : غیر سیر شدہ نظام میں π الیکٹرانس کی ترسیل۔

3.7 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- کاربن زنجیر کی لمبائی میں اضافہ سے زنجیری امالیت میں کیا اثر ہوتا ہے؟
- 2- ایک مرکب میں امالی اثر اور الیکٹرومیرک اثر عمل کرتے ہوں تو ان میں سے کون سا اثر فوقیت یا نمایاں ہوتا ہے؟
- 3- NH_3, H_2O, CO_2 میں کون سا سالمہ خطی سالمہ ہے؟
- 4- اکہرے بند میں برقی بار کا منتقل کیا کہلاتا ہے؟

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- امالی اثر اور میسومیرک اثر کے خصوصیات کا تقابل کیجیے۔

2- RNH_2 کی اساسیت NH_3 سے زیادہ اور R_2NH سے کم ہوتی ہے۔ وضاحت کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

1- امالی اثر کیا ہے؟ امالی اثر کو استعمال کرتے ہوئے، کاربن منفی رواں (ثالثی ثانوی، ابتدائی) کی قیام پذیری کی وضاحت کیجیے۔

2- کاربو آکسز الیک ترشوں کی طاقت (Strength of Carboxylic acids) کو امالی اثر کی روشنی میں بیان کیجیے۔

اکائی - 4 : گمک

(Unit-4: Resonance Effect)

اکائی کے اجزا	
4.0 تمہید	
4.1 مقاصد	
4.2 گمک	
4.3 میسومیرک اثر	
4.4 بالامزدوجیت	
4.5 دو قطبی معیار اثر	
4.6 اکتسابی نتائج	
4.7 کلیدی الفاظ	
4.8 پرچہ نمونہ سوالات	

4.0 تمہید

گمک یا (Resonance) کیمیا کا بنیادی نظریہ ہے جو کہ سالموں یا رواں میں الیکٹرانس کے Delocalization کو بیان کرتا ہے اور اسکی وجہ سے وہ سالمے یا رواں انکی Bonding حالت میں More Stable ساخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ سالمے یا رواں کے Single Lewis Structure اس سالمے یا رواں کی حقیقی مستحکیمت کو ظاہر کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ گمک کے ذریعہ Multiple Structures یا Resonance Structures کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ مخلوط ساخت (Hybrid Structure) کو بتلاتا ہے جو کہ Stable ہوتا ہے۔ گمک کا عمل Multiple Atoms جو کہ سالمے میں موجود ہوتے ہیں میں الیکٹرانس کی Sharing کی وجہ سے ہوتا ہے۔


4.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء گمک کے بالا مزدوجیت اور ان کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ دو قطبی معیار اثر اور ترشوں، اساسوں کی طاقت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اسکے علاوہ طلباء کو گمک کو ظاہر کرنے والے سالموں کی مثالوں کو بتلایا جائے گا۔ مزید طلباء کو گمک کی شرائط گمک کا سالموں کی Stability، بند کی لمبائی، گمک کی توانائی پر اثر کو بھی بتلایا جائے گا۔ آخر میں گمک کی قسموں اور اسکے استعمالات کی بھی معلومات فراہم کی جائے گی۔

4.2 گمک (Resonance)


اگر ایک مرکب کو دو یا زائد ساختوں سے ظاہر کیا جائے اور کوئی بھی ساخت مرکب کی مکمل خصوصیات کو بیان نہ کرے تو اس مظہر کو گمک کہتے ہیں۔ ان مختلف ساختوں کو گمک ساختیں (Resonance Structures) یا مستند ساختیں (Canonical Structures) کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر بینزین کو دو ساختوں سے ظاہر کیا جاتا ہے لیکن اصل ساخت ان دونوں ساختوں کے درمیان ہوتی ہے۔




بینزین کی مخلوط گمک (Resonance Hybrid) دونوں ساختوں سے مختلف ہوگی۔ گمک ساختیں زیادہ ہو تو مرکب زیادہ قیام پذیر ہوگا۔ گمک ساختوں کے درمیان $\longleftrightarrow$ کا نشان لگایا جاتا ہے۔ مختلف مرکبات کی گمک ساختوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔


Carboxylate ion -1




Allyl Carbocation-2



Phenoxide Ion-3



4-انیلین Aniline



گمک کی امتیازی خصوصیات

- 1- اس کو دو یا زیادہ گمک ساختوں یا مستند ساختوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- 2- کوئی بھی ساخت مرکب کی مکمل خصوصیات کو ظاہر نہیں کرتی۔
- 3- تمام ساختوں میں جوہروں کا مقام ایک ہی ہونا چاہیے۔
- 4- الیکٹران شفٹ (Electron Shift) سے گمک ساختیں قابل تبدیل ہونی چاہیے۔
- 5- مخلوط گمک (Resonance Hybrid) دوسری گمک ساختوں سے زیادہ قیام پذیر ہوتی ہے۔
- 6- گمک ساختیں زیادہ ہو تو مرکب کی قیام پذیری زیادہ ہوتی ہے۔
- 7- مخلوط گمک میں بند کا طول گمک ساختوں کے بند کے طول سے کم ہوتا ہے۔
- 8- گمک ساختیں زیادہ ہوں تو گمک اعظم ترین ہوتا ہے اور مستند ساختیں معادل ہوں گی۔
- 9- گمک توانائی زیادہ ہو تو مرکب کی قیام پذیری زیادہ ہوگی۔
- 10- ایسی ساختیں زیادہ قیام پذیر ہوں گی جس میں منفی بار اعلیٰ برقی منفیت کے جوہر پر اور مثبت بار کم برقی منفیت کے جوہر پر ہو۔

4.3 میسو میرک اثر (Mesomeric Effect)

ایک غیر شدہ جفتی π نظام میں الیکٹران ایک حصہ سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور مرکب میں گمک واقع ہوتی ہے۔
الیکٹرانس یا بار کا گمک کی وجہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہونے کا عمل میسو میرک اثر (Mesomeric Effect) کہلاتا ہے۔
اس کو 'M' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

اس کے دو اقسام ہیں۔


(i) M + اثر (ii) M - اثر

(i) M + اثر: اگر ایک جوہر یا گروپ جفتی π نظام کو الیکٹرانس دیتا ہے تو اس کو M + اثر والا جوہر یا گروپ کہتے ہیں۔


M + اثر والے جوہر یا گروپ ذیل میں دیے گئے ہیں۔

M + گروپ: $-Cl, -Br, -OH, -NH_2, -NR_2, O-R$

Cl^- اور NH_2^- کے M + اثر کی تشریح ذیل میں دی گئی ہے۔



Vinyl Chloride




Buta-1,3-dien-1-Amine

(ii) M - اثر: اگر ایک جوہر یا گروپ جفتی π نظام سے الیکٹران کو راغب کرتا یا کشش کرتا ہو تو اس کو M - اثر والا جوہر یا گروپ کہتے ہیں۔

M - گروپ:

گروپ کے M - اثر کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔




Acrylaldehyde

میسو میرک اثر کے استعمالات


1- کاربو آکسز الیک ترشے اور فینول کی ترشی خاصیت

ترشہ ایک پروٹان دہندہ (Proton Donor) ہے۔ کاربکسلک ترشے پروٹان کا اخراج کر کے نمک کی وجہ سے قیام پذیر


Carboxylate Ion بناتے ہیں۔



فینول کی خاصیت ترشی ہوتی ہے۔ فینول سے پروٹان کا اخراج ہوتا ہے اور فینا کسائیڈ آئن حاصل ہوتا ہے۔ گمک کی وجہ سے فینا کسائیڈ قیام پذیر ہوتا ہے۔



کاربو آکسز الیک ترشہ فینول سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کیونکہ معادل ساختوں کی وجہ سے Carboxylate Ion زیادہ قیام پذیر ہے۔ کاربونک ترشہ کی طاقت کاربکسلک ترشہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کاربونیٹ کی تین معادل گمک ساختیں ہوتی ہیں۔




2۔ الکائیل امین اور انیلین کی اساسی خصوصیت

الکائیل امین اساسی ہوتے ہیں کیونکہ نائٹروجن جو ہر پروٹون (Electron Pair) ہوتا ہے۔ الکائیل امین کی اساسی طاقت امونیا اور انیلین سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ الکائیل گروپ الیکٹران دہندہ ہوتے ہیں۔



اساسی طاقت کا درجہ

انیلین کی اساسی طاقت NH_3 سے کم ہوتی ہے کیوں کہ الیکٹران جوڑ بنزین حلقہ پر منتقل ہوتا ہے۔




انیلین کی گمک کی ساخت

جدول-4.1: امالی اثر اور میسومیرک اثر میں امتیازی خصوصیات

امالی اثر (Inductive effects)	میسومیرک اثر (Mesomeric effect)
(i) یہ سیر شدہ مرکبات میں عمل کرتا ہے۔	(i) یہ غیر شدہ سالمات میں عمل کرتا ہے۔
(ii) اس میں σ بند حصہ لیتے ہیں۔	(ii) اس میں π بند حصہ لیتے ہیں۔
(iii) جزوی برقی بار حاصل ہوتے ہیں۔	(iii) مستقل برقی بار حاصل ہوتے ہیں۔
(iv) یہ اثر مختصر فاصلہ تک عمل کرتا ہے۔	(iv) اس اثر کی ترسیل جفتی نظام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک واقع ہوتی ہے۔
(v) اس اثر میں گمک ساختیں نہیں ہوتی۔	(v) یہ اثر گمک ساختوں کا اظہار کرتا ہے۔

4.4 بالامزدوجیت (Hyper Conjugation)

اس اثر کو بیکر (Baker) اور ناتھن (Nathan) نامی سائنسدانوں نے پیش کیا۔ اس لیے اس کو بیکر-ناتھن اثر بھی کہتے ہیں۔ یہ غیر معین یا گمک نما اثر ہے۔ اس میں σ مدار چہ اور P مدار چہ یا π مدار چہ کی برپوشی واقع ہوتی ہے۔ الکیل گروپ جس میں ہائیڈروجن کاربن پر ہوتا ہے، غیر شدہ نظام سے متصل ہوں تو ایک H^+ رواں اور الیکٹران کا اخراج کرتے ہیں۔ C-H بند کے الیکٹران کا غیر معین ہونا بالا مزدوجیت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر پروپین (Propene) میں بالامزدوجیت اثر واقع ہوتا ہے اور گمک ساختیں حاصل ہوتی ہے۔



پروپین میں بالا مزدوجیت


ساختیں II، III، IV میں ہائیڈوجن اور کاربن کے درمیان کوئی بند حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بالا مزدوجیت کو غیر بندگمک (No bond Resonance) بھی کہتے ہیں۔ الکیل گروپ کے بالا مزدوجیت اثر کو ذیل میں دیا گیا ہے۔



بالا مزدوجیت کے استعمالات


1- کاربن مثبت رواں کی قیام پذیری

غیر بندگمک ساختوں سے کاربن مثبت رواں کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ الکیل گروپس کی تعداد زیادہ ہو تو غیر بندگمک ساختیں بھی زیادہ ہوں گی۔ مثبت برقی بار زیادہ منتشر ہو گا اور قیام پذیری میں اضافہ ہو گا۔ ہائیڈروجن کی تعداد میں اضافہ سے زیادہ گمک ساختیں حاصل ہوتی ہیں۔




2- آزاد اسیلوں کی قیام پذیری

تمام آزاد اسیلے سوائے میتھائل اسیلیے کے غیر بندگمک ساختوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں الکیل گروپ کا بند اور طاق الیکٹران کا P-مدراجہ حصہ لیتا ہے۔ الکیل گروپ پر ہائیڈروجن جو ہر کی تعداد زیادہ ہو تو غیر بندگمک ساختیں زیادہ ہوں گی اور قیام پذیری میں اضافہ ہو گا۔ ابتدائی آزاد اسیلیے کی چار گمک ساختیں ہوتی ہیں جب کہ ثانوی میں سات اور ثالثی آزاد اسیلیے میں دس غیر بندگمک ساختیں ہوتی ہیں۔ اس طرح قیام پذیری میں اضافہ ہو گا۔



3- الکین کی قیام پذیری

C=C بند سے الکائیل گروپ زیادہ جڑے ہوں تو قیام پذیری زیادہ ہوگی۔ مثلاً 2-Butene کی قیام پذیری پروپین (Propene) سے زیادہ ہوگی۔



2-Butene میں C=C بند پر دو متھائل گروپ ہیں جب کہ پروپین میں صرف ایک متھائل گروپ C=C سے جڑا ہوتا ہے۔

4.5 دو قطبی معیار اثر (Dipole Moment)


دو متجانس جوہروں کے بند میں مشترک الیکٹران مساوی طور پر دو جوہروں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان پر کوئی برقی بار نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کو غیر قطبی شریک گرتی بند (Non-Polar Covalent Bond) کہتے ہیں۔

دو غیر متجانس یا مختلف جوہروں A-B کے درمیان مشترک الیکٹران جوڑ اعلیٰ برقی منفیت جوہر کے قریب آتے ہیں اور اس پر جزوی منفی بار (δ^-) حاصل ہوتا ہے اور دوسرے کم برقی منفیت جوہر پر جزوی مثبت بار (δ^+) حاصل ہوتا ہے۔ اس بند کو قطبی شریک گرتی بند (Polar Co-valent Bond) کہتے ہیں۔ دو جوہروں کی برقی منفیت کی قیمتوں میں زیادہ فرق ہو تو بند کی قطبیت (Polarity) زیادہ ہوگی۔ قطبیت کے درجہ کو دو قطبی معیار اثر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر برقی منفیت کا فرق صفر ہو تو بند کی قطبیت صفر ہوگی۔

متجانس جوہروں کے درمیان بند Cl:Cl H:H غیر قطبی شریک گرتی بند (A-A)، (B-B)

غیر متجانس جوہروں کے درمیان بند $H^{\delta+} - Br^{\delta-}$ $H^{\delta+} - Cl^{\delta-}$ قطبی شریک گرتی بند (A-B)

ایک بند A-B کو غور کیجیے جس میں B' کی برقی منفیت، A سے زیادہ ہے مشترک الیکٹران جوڑ B' کے قریب آتا ہے اور اس پر جزوی منفی برقی بار ($-q$) حاصل ہوتا ہے اور A پر جزوی مثبت برقی بار ($+q$) حاصل ہوتا ہے اور جوہروں کے درمیان فاصلہ 'd' ہو تو۔



$$\mu = q \times d$$

دو برقی باروں کے برق (q) اور ان کے درمیانی فاصلہ (d) کا حاصل ضرب قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ اس کو μ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

حسابی طور پر اس کو مندرجہ ذیل مساوات سے دیا جاتا ہے۔


جہاں پر $q =$ برقی بار، برقی سکون اکائی (e, su) میں

$d =$ جوہروں کا درمیانی فاصلہ (سینٹی میٹر) میں

$\mu =$ کی قیمت دیبائی 'D' Debye ہے۔

$$1D = 10^{-18} \text{ e.s.u.cm}$$


‘ μ ’ ایک سمتی مقدار ہے جس میں مقدار اور سمت ہوتی ہے۔ ‘ μ ’ کو تیر (arrow) کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے تیر کا سر (head) اعلیٰ برقی منفیت جوہر کی طرف ہوتا ہے۔



دو قطبی معیار اثر کے استعمالات

I۔ دو جوہری سالمات کی قطبیت

متجانس دو جوہری سالمات کا دو قطبی معیار اثر صفر ہوتا ہے جیسے F_2, O_2, Cl_2, H_2 وغیرہ غیر متجانس دو جوہری سالمات جیسے HBr, HCl, HF کا دو قطبی معیار اثر ہوتا ہے کیوں کہ جوہروں کے برقی منفیت کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ برقی منفیت میں زیادہ فرق ہو تو دو قطبی معیار اثر بھی زیادہ ہو گا ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی قطبیت کا درجہ ذیل میں دیا گیا ہے۔



ایک بند کی روانی خاصیت کے فیصد کو ذیل کی مساوات سے محسوب کیا جاتا ہے۔

روانی خاصیت کا فیصد = مشاہدہ کردہ معیار اثر / ضابطہ سے حاصل کردہ معیار اثر $\times 100$

$$\% \text{ of ionic Character} = \frac{\mu_{\text{obs}}}{\mu_{\text{ionic}}} \times 100$$

$\mu_{\text{obs}} =$ Observed dipole movement


$\mu_{\text{ionic}} =$ Theoretical dipole movement

II۔ سالمات کی جیومیٹری یا اشکال


1۔ دو جوہری سالمہ خطی ہوتا ہے۔

2۔ تین جوہری سالمہ AB_2 کے اشکال دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(a) تین جوہری سالمات CO_2 , CS_2 کا دو قطبی معیار اثر صفر ہوتا ہے۔ ان سالمات میں ایک بند کا معیار اثر دوسرے بند سے تعدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سالمات خطی ہوتے ہیں۔




(خطی سالمہ)




(خطی سالمہ)

(b) تین جوہری سالمات SO_2 , H_2O کے مخصوص معیار اثر ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زاویائی شکل رکھتے ہیں۔

مثلاً H_2O کا دو قطبی معیار اثر 1.85 D ہے اور بند کا زاویہ 104.5° ہے۔ H_2O کی شکل V-نما ہوتی ہے




3۔ چار جوہری سالمات BF_3 کا دو قطبی معیار اثر صفر ہے۔ اس کی شکل مسطح سہ ضلعی ہوتی ہے۔




CCl_4 , CH_4 کے دو قطبی معیار اثر مخصوص ہوتے ہیں اور ان کی ساختیں اہرامی (Pyramidal) ہوتی ہیں۔ NH_3 کا معیار اثر 1.48 D ہے۔

اور بند کا زاویہ 107° ہے۔



$\text{CCl}_4, \text{CH}_4$ کے معیار اثر صفر ہوتے ہیں یہ چار سطحی متشکل ساختیں ہیں۔




4۔ ہم رو-ضد رو ہم ترکیبوں میں امتیاز

دو قطبی معیار اثر سے ہم رو-ضد رو ہم ترکیبوں میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ ہم رو ہم ترکیبے کا معیار اثر زیادہ ہوتا ہے جب کہ ضد رو ہم ترکیبے کا معیار اثر بہت کم یا صفر ہوتا ہے۔



Cis-1,2-Dichloroethylene ($\mu=1.90\text{D}$)





Trans-1,2-Dichloroethylene ($\mu=0$)

5۔ عطری مرکبات کے دو قطبی معیار اثر

بنزین C_6H_6 کا معیار اثر صفر ہوتا ہے اور یہ سطحی سالمہ ہے۔ آر تھو، پیرا، میٹا مشتقات کے دو قطبی معیار اثر کو ذیل میں دیا گیا ہے۔

ortho > meta > para

 non polar, $\mu = 0 \text{ D}$	 ortho dichloro benzene $\mu = 2.30 \text{ D}$ meta dichloro benzene $\mu = 1.48 \text{ D}$ para dichloro benzene $\mu = 0 \text{ D}$
Benzene Dipole Movement	Ortho, Meta and Para substituted Benzene Dipole Movement

4.6 اکتسابی نتائج

- اس اکائی میں ہم نے حسب ذیل کے بارے میں جانکاری حاصل کی:
- 1- متجانس دو جوہری سالمہ کی قطبیت صفر ہوتی ہے۔ غیر متجانس دو جوہری سالمات میں قطبیت واقع ہوتی ہے۔ قطبیت کے درجے کا انحصار جوہروں کی برقی منفیت کے فرق پر ہوتا ہے
 - 2- ایک مرکب کو دو یا زائد ساختوں سے ظاہر کیا جائے اور کوئی بھی ساخت مرکب کی مکمل خصوصیات کو ظاہر نہ کرے تو اس مظہر کو گمک کہتے ہیں۔
 - مختلف ساختوں کو گمک ساختیں کہتے ہیں۔
 - 3- مخلوط گمک (Resonance Hybrid)، دوسری ساختوں سے زیادہ قیام پذیر ہوتی ہے۔
 - 4- میسومیرک اثر سے کاربو آکسز الیک ترشوں اور فینول کی ترشی طاقت اور الکیل امین کی اساسی طاقت کی تشریح اور تقابل کیا جاتا ہے۔
 - 5- الکیل گروپ جس میں ہائیڈروجن کاربن پر ہوا اور غیر شدہ نظام سے جڑے ہوں تو ایک H^+ رواں اور الکٹران کا اخراج ہوتا ہے۔ اس اثر کو بالامزدوجیت کہتے ہیں۔
 - 6- بالامزدوجیت کو غیر بند گمک (No bond Resonance) بھی کہتے ہیں۔
 - 7- دو برقی باروں کے برق (q) اور ان کے درمیانی فاصلہ (d) کا حاصل ضرب دو قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ اس کو μ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
 - 8- دو قطبی معیار اثر کی اکائی دیبائی (Debye) ہے۔ $D = 10^{-18} \text{ e.s.u.cm}$
 - 9- بند کی روانی خاصیت کے فیصد کو ذیل کی مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

روانی خاصیت کا فیصد = مشاہدہ کردہ معیار اثر / ضابطہ سے حاصل کردہ معیار اثر $\times 100$

10- دو قطبی معیار اثر سے بند کی قطبیت، سالمات کے اشکال کی تشریح کی جاسکتی ہے۔

4.6 کلیدی الفاظ

- 1- گمک : ایک مرکب کی مختلف ساختیں اور کوئی ساخت مرکب کی مکمل خصوصیات کو بیان نہیں کرتی۔
- 2- دو قطبی معیار اثر : قطب کے بار اور بند کے قطبوں کے درمیان فاصلہ کا حاصل ضرب
- 3- بالامزدوجیت : غیر بند گمک (No bond Resonance)
- 4- دیبائی ((Debye : دو قطبی معیار اثر کی اکائی

4.7 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- غیر بند گمک (No bond Resonance) ہے۔
- 2- کاربن زنجیر کی لمبائی میں اضافہ سے زنجیری امالیت میں کیا ہوتا ہے؟
- 3- مندرجہ ذیل میں سے کون سا سالمہ خطی ہے۔
- 4- ہندسی ہم ترکیبوں کے امتیاز میں کون سا طریقہ کار آمد ہے؟
- 5- H_2O میں بند کا زاویہ ہے۔
- 6- NH_3 کی شکل ہے۔

(A) خطی (B) سطحی (C) اہرامی (Pyramidal) (D) زاویائی

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- حسب ذیل اصطلاحات کی تشریح کیجیے۔
(A) غیر بند گمک (B) زنجیری عاملیت
- 1- فینا کسائیڈ رواں (Phenoxide Ion) کی گمک ساختیں لکھیے۔
- 2- CH_3COOH سے ClCH_2COOH ترشہ زیادہ طاقتور ہے۔ وضاحت کیجیے۔
3. امونیا کی ساخت بیان کرو۔
- 4- Hyperconjugation پر مختصر نوٹ لکھیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- دو قطبی معیار اثر سے کیا مراد ہے؟ اس کی اکائی کیا ہے؟ سالمات کی قطبیت اور دو جوہری، تین جوہری سالمات کی اشکال معلوم کرنے میں کس طرح کارآمد ہے؟
- 2- گمک کی تعریف کیجیے اور امتیازی خصوصیات بیان کیجیے۔
- 3- Aniline، Carboxylate Ion اور Ally Carbocation کی گمک ساختیں لکھیے۔

اکائی-5: نامیاتی مرکبات کی میکانیت

(Unit-5: Mechanism of Organic Reaction)


اکائی کے اجزا

0.5	تمہید
1.5	مقاصد
5.2	بند کی شکستگی، متجانس شکستگی اور غیر متجانس شکستگی
5.3	نامیاتی تعاملات کے اقسام اور میکانیت
5.3.1	بدلی تعاملات
5.3.2	جمعی یا اضافی تعاملات
5.3.3	اخراجی تعاملات
5.4	اکتسابی نتائج
5.5	کلیدی الفاظ
5.6	نمونہ امتحانی سوالات


5.0 تمہید

کیمیائی تعاملات روانی یا سالمی ہوتے ہیں اور کئی نامیاتی مرکبات کیمیائی تعاملات میں رواں کے طور پر حصہ لیتے ہیں اور آبی واسطے (Aqueous Medium) میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔

نامیاتی مرکبات سالمی ہوتے ہیں اور تعامل میں حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً میتھین کی کلورینیشن میں میتھین اور کلورین کا آپسی سالمی تعامل ہوتا ہے۔



اس کے باوجود چند ایسے تعاملات ہیں جن میں عامل (Reagent) روانی نوعیت رکھتے ہیں مثال کے طور پر میتھائل برومائڈ کے ساتھ OH^- رواں (قلی) کے تعامل سے میتھائل الکوحل کی تیاری ایک روانی تعامل ہے۔



لیکن کئی تعاملات میں نامیاتی اشیاء سالمی شکل میں ہی حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً CH_3Br ہمیشہ سالمی شکل میں ہی پایا جاتا ہے۔ سالمی تعاملات میں بند کی شکستگی (Bond cleavage) واقع ہوتی ہے اور نئے بند حاصل ہوتے ہیں۔ بند کی شکستگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ بند کی شکستگی سے مختلف انواع حاصل ہوتے ہیں جیسے الکٹران پسند (Carbo Cation) 'مرکزہ پسند انواع' (Carbanion) اور آزاد اعلیٰ (Free Radical) بنتے ہیں۔

نامیاتی مرکبات میں تعامل مرحلہ وار (Stepwise) ہوتا ہے۔ اس مرحلہ وار تعامل کے مطالعہ کو اسکی میکینیت (Mechanism) کہتے ہیں۔

5.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء کو بند کی متجانس (مشابہ) اور غیر متجانس (غیر مشابہ) شکستگی 'ان سے حاصل ہونے والے انواع' (اشیاء) نامیاتی تعاملات اور نامیاتی عامل کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیگی۔

اسکے علاوہ اس اکائی میں حسب ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ بند کی شکستگی 'متجانس اور غیر متجانس شکستگی۔
- ☆ بند کی شکستگی میں حاصل ہونے والے انواع۔
- ☆ نامیاتی تعاملات کی درجہ بندی اور تعاملات کی میکینیت۔


5.2 بند کی شکستگی، متجانس شکستگی اور غیر متجانس شکستگی

سالمی تعامل میں (Molecular Reaction) میں شریک گرفتہ بند ٹوٹتے اور نئے بند حاصل ہوتے ہیں۔ ایک شریک گرفتہ بند میں مشترکہ الکٹران بند ہوتا ہے۔ تعامل کے دوران شریک گرفتہ بند ٹوٹتا ہے۔ اس عمل کو بند کی شکستگی کہتے ہیں۔ بند کی شکستگی کے دو طریقے ہوتے ہیں متجانس یا مشابہ شکستگی اور غیر متجانس یا غیر مشابہ شکستگی۔

- 1- متجانس یا مشابہ شکستگی (Homolytic Cleavage or Fission or Homolysis)
- 2- غیر متجانس یا غیر مشابہ شکستگی (Heterolytic Cleavage or Fission or Heterolysis)


1- متجانس شکستگی

اگر شریک گرفتہ بند دو جوہروں یا گروپس کے درمیان متماثل طور پر ٹوٹ جائے تو اس کو متجانس شکستگی کہتے ہیں۔ حاصل ہونے والے ہر حصہ میں ایک الکٹران ہوگا۔ اس شکستگی کو متماثل شکستگی بھی کہتے ہیں۔




A اور B. طاق الیکٹران (Odd Electron) والے انواع (اشیاء) ہیں۔ ان کو آزاد اصلییے (Free Radicals) کہتے ہیں۔

مثلاً سورج کی روشنی یا اعلیٰ تپش پر کلورین کے سالمے کی متجانس شکستگی واقع ہوتی ہے۔



کلورین جوہر یا آزاد اصلییے تیرکان نشان الیکٹران کے تبادلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جوہری آزاد اصلییہ (Monoatomic) عنصر کا

جوہر ہے۔ آزاد اس لیے تعدیلی انواع ہیں جو کسی رسمی بار (Formal Charge) سے منسلک نہیں ہوتے۔



میتھائل آزاد اصلییہ

2- غیر متجانس شکستگی


اگر شریک گرفتہ بند دو جوہروں یا گروپس کے درمیان غیر متماثل طور پر ٹوٹ جائے تو اس کو غیر متجانس شکستگی کہتے ہیں۔ اس

شکستگی میں الیکٹران جوڑ ایک جوہر پر منتقل ہوتا ہے اس پر منفی برقی بار حاصل ہوتا ہے اور یہ منفی رواں کہلاتا ہے دوسرے جوہر پر مثبت برقی بار حاصل ہوتا ہے اور مثبت رواں کہلاتا ہے۔ اس شکستگی کو غیر متماثل شکستگی کہتے ہیں یہ شکستگی دو مختلف برقی منفیت والے جوہروں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔



مثبت رواں منفی رواں

(الیکٹران پسند) (مرکزہ پسند)



اس طرح غیر متجانس شکستگی میں مثبت رواں (الکٹران پسند انواع) اور منفی رواں (مرکزہ پسند انواع) حاصل ہوتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات کے تعاملات جن میں رواں حاصل ہوتے ہیں روانی نامیاتی مرکبات کہلاتے ہیں۔ تمام روانی تعاملات میں شریک گرفتہ بند کی غیر متجانس شکستگی عمل میں آتی ہے۔

5.3 نامیاتی تعاملات کے اقسام اور میکانیت

نامیاتی تعاملات کے تین اہم اقسام ہیں۔


- | | |
|-----|--|
| I | بدلی تعاملات (Substitution Reactions) |
| II | جمعی یا اضافی تعاملات (Addition Reactions) |
| III | اخراجی تعاملات (Elimination Reactions) |

5.3.1 بدلی تعاملات

ان تعاملات میں ایک جوہر یا گروپ کا دوسرے جوہر یا گروپ سے تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ بدلی گروپ کی نوعیت کے لحاظ سے یہ آزاد اصریلے، الکٹران پسند یا مرکزہ پسند بدلی تعاملات ہوتے ہیں ان کو تین مزید گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1- آزاد اصریلہ بدلی تعامل (Free Radical Substitution Reaction)


اس تعامل میں آزاد اصریلوں سے بدلی تعاملات واقع ہوتے ہیں جیسے الکلیں کی ہیالوجنیشن میں CH_4 اور Cl_2 کے درمیان تعامل ایک ضیاء کیمیائی تعامل ہے جو سورج کی روشنی کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔



2۔ الکٹر ان پسند بدلی تعاملات


ان تعاملات میں الکٹر ان پسند جوہر یا گروپ دوسرے جوہر یا گروپ کی جگہ لیتا ہے اس طرح ایک جوہر یا گروپ کا دوسرے جوہر یا گروپ سے تبادلہ ہوتا ہے۔

مثلاً بینزین کے کلورینیشن کے دوران کلورونیم رواں بینزین کے ہائیڈروجن جوہر کی جگہ لیتا ہے اور کلورو بینزین حاصل ہوتا ہے۔ یہ تعامل لیوی ترشہ FeCl_3 کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔



3۔ مرکزہ پسند بدلی تعاملات

ان تعاملات میں ایک مرکزہ پسند جوہر یا گروپ دوسرے مرکب کے جوہر یا گروپ کی جگہ لیتا ہے یعنی ایک مرکزہ پسند جوہر یا گروپ کا دوسرے مرکزہ پسند سے تبادلہ عمل میں آتا ہے




اس تعامل میں Cl^- کا OH^- سے تبادلہ ہوتا ہے OH^- مرکزہ پسند رواں ہے۔

5.3.2 II اضافی یا جمعی تعاملات

ان تعاملات میں جوہر یا گروپ ناسیر یا غیر شدہ مرکبات کے دوہرے یا تہرے بند پر عمل کر کے سیر شدہ مرکبات بناتے ہیں تعامل کی ابتداء آزاد اصدید یا الکٹر ان پسند یا مرکزہ پسند سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کو مزید گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔


1۔ آزاد اصدید اضافی تعامل

اس تعامل کی ابتداء آزاد اصلیه سے ہوتی ہے مثلاً پروپین (Propene) اور HBr کا تعامل پر آکسائیڈ کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے اور Br اصلیه تعامل کی ابتداء کرتا ہے




2۔ الکٹران پسند جمعی تعاملات

ان تعاملات میں الکٹران پسند رواں سے تعامل کی ابتداء ہوتی ہے۔
مثلاً پروپین اور HBr تعامل کے میں H^+ الکٹران پسند رواں سے تعامل واقع ہوتا ہے۔



3۔ مرکزہ پسند جمعی تعاملات

ان تعاملات میں مرکزہ پسند رواں سے تعامل کی ابتداء ہوتی ہے۔
مثلاً ایلڈ یہائیڈ اور HCN کے تعامل میں CN^- مرکزہ پسند رواں تعامل کی ابتداء کرتا ہے۔




5.3.3 III - اخراجی تعاملات

اضافی تعامل کا معکوس اخراجی تعامل کہلاتا ہے ان تعاملات میں مرکب سے جوہر یا گروپس کا اخراج ہوتا ہے اور ضعفی بند (دوہرے یا تھرے بند) یا نائسیر شدہ مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔ اخراجی تعاملات میں بھی تعامل کی ابتداء الکٹران پسند 'مرکزہ پسند یا آزاد اصلیه سے ہوتی ہے ان کی تین گروپس میں تقسیم کی جاتی ہے۔

1۔ الکٹران پسند اخراجی تعاملات

ان تعاملات کی ابتداء الکٹران پسند نوع سے ہوتی ہے۔
مثلاً الکوحل کی نابیدگی (Dehydration of alcohol)

الکوحل کو مرکب H_2SO_4 کے ساتھ $160^{\circ}C$ تا $170^{\circ}C$ تپش تک گرم کرنے پر الکین (Alkene) حاصل ہوتی ہے۔ تعامل کے دوران H_2O کا اخراج ہوتا ہے اس لیے اس کو نائیدگی (Dehydration) کہتے ہیں۔




2- مرکزہ پسند اخراجی تعاملات

ان تعاملات کی ابتداء مرکزہ پسند سے ہوتی ہے۔


اکائیل ہیلانیڈ کی ہائیڈروجن ہیلوجن رہائی:

اکائیل ہیلانیڈ کو الکوحلی KOH کے ساتھ گرم کرنے پر الکین (Alkene) حاصل ہوتی ہے۔ تعامل کے دوران ہائیڈروجن اور ہیلوجن کا اخراج ہوتا ہے اس لیے اس تعامل کو ہائیڈروجن ہیلوجن براری کہتے ہیں۔



3- ہیلوجن رہائی

ویسینل ڈائی ہیلانیڈ (Vicinal dihalides) جیسے 1,2-ڈائی برومو ایٹھین کو زنک (Zn) سفوف کے ساتھ گرم کرنے پر ایٹھین (Ethene) حاصل ہوتی ہے اس تعامل کے دوران ہیلوجن کی رہائی عمل میں آتی ہے۔ اس لیے اس کو ہیلوجن رہائی (Dehalogenation) کہتے ہیں۔



5.4 اکتسابی نتائج

اس اکائی میں ہم نے حسب ذیل کا مطالعہ کیا۔

- 1- کیمیائی مرکبات کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی غیر نامیاتی مرکبات اور نامیاتی مرکبات۔
 - 2- کیمیائی تعاملات دو (2) قسم کے ہوتے ہیں۔ روانی تعاملات (غیر نامیاتی تعاملات) اور سالمی تعاملات (نامیاتی تعاملات) روانی تعاملات کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جب کہ نامیاتی تعاملات سست رفتار سے واقع ہوتے ہیں۔
 - 3- سالمی تعاملات میں بند کی شکستگی واقع ہوتی ہے اور نئے بند حاصل ہوتے ہیں۔
 - 4- بند کی شکستگی دو طریقوں سے واقع ہوتی ہے، متجانس شکستگی اور غیر متجانس شکستگی۔
 - 5- متجانس شکستگی میں شریک گرفت بند تشاکلی طور پر ٹوٹتا ہے اور طاق الکٹران انواع حاصل ہوتے ہیں ان کو آزاد اصلئے کہتے ہیں ان میں بے جوڑ الکٹران ہوتا ہے۔
 - 6- غیر متجانس شکستگی میں شریک گرفت بند غیر تشاکلی طور پر ٹوٹتا ہے۔ جس سے منفی بار اور مثبت بار والے انواع حاصل ہوتے ہیں جو بالترتیب مرکزہ پسند (Carbo Cation) اور الکٹران پسند (Carbanion) کہلاتے ہیں۔
 - 7- عاملات کی درجہ بندی میں آزاد اصلئے الکٹران پسند اور مرکزہ پسند شامل ہیں آزاد اصلئے (طاق الکٹران انواع) ' الکٹران پسند (مثبت رواں یا الکٹران فقدان سالمات) اور مرکزہ پسند (منفی رواں یا کثیر الکٹران سالمات) ہوتے ہیں۔
 - 8- الکٹران پسند انواع لیوی ' لوری برانسٹیڈ ' ارہنس ترشے ہوتے ہیں اور الکٹران جوڑ کو قبول کرتے ہیں مرکزہ پسند انواع لیوی اور لوری۔ برانسٹیڈ اساس ہوتے ہیں۔ یہ الکٹرائی جوڑ دہندہ ہوتے ہیں۔
 - 9- نامیاتی تعاملات کی جماعت بندی ذیل میں دی گئی ہے۔
- (a) بدلی تعاملات
 - (b) اضافی یا جمعی تعاملات
 - (c) اخراجی تعاملات
 - (d) Re-arrangement

5.5 کلیدی الفاظ

- 1- بند کی شکستگی: شریک گرفت بند کا ٹوٹنا
- 2- متجانس شکستگی: شریک گرفت بند کا تشاکل طور پر ٹوٹنا
- 3- غیر متجانس شکستگی: شریک گرفت بند کا غیر تشاکل طور پر ٹوٹنا
- 4- الکٹران پسند انواع: مثبت بار رواں (لیوی ترشے)

5.6 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- متجانس شکستگی سے حاصل ہونے والے انواع کون سے ہیں۔
- 2- غیر متجانس شکستگی سے حاصل ہونے والے انواع کون سے ہیں۔
- 3- الکٹر ان پسند سالمہ کی ایک مثال دیجئے۔
- 4- مرکزہ پسند انواع کی مثال دیجئے۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- بند کی شکستگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح انجام پاتی ہے؟
- 2- الکٹر ان پسند انواع کیا ہیں؟ یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ تشریح کیجئے۔
- 3- مرکزہ پسند انواع سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- بند کی شکستگی 'اس کے اقسام اور حاصل ہونے والے انواع کی تفصیل سے تشریح کیجئے۔
- 2- نامیاتی تعاملات کی جماعت بندی کیجئے اور ہر جماعت کی تعریف کیجئے اور مثالیں لکھیے۔
- 3- اضافی یا جمعی تعاملات (Addition Reactions) کے بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیے۔

اکائی - 6: عامل انٹر میڈیٹ

(Unit-6: Reaction Intermediate)


اکائی کے اجزا

6.0	تمہید
6.1	مقاصد
6.2	بند کی شکستگی متجانس شکستگی اور غیر متجانس شکستگی
6.3	عاملات اور متعاملات
6.4	کاربن مثبت رواں 'کاربن منفی رواں' آزاد اصرلیے 'اشکال اور قیام پذیری
6.5	ناپٹر نینس
6.6	ارائینس
6.7	قابل بار کو محسوب کرنا
6.8	تعالی میکانیت کے تعین کے طریقے
6.9	اکتسابی نتائج
6.10	کلیدی الفاظ
6.11	نمونہ امتحانی سوالات


6.0 تمہید

کیمیائی تعاملات روانی یا سالمی ہوتے ہیں کئی نامیاتی مرکبات میں رواں حصہ لیتے ہیں اور آبی واسطے (Aqueous Medium) میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔

نامیاتی مرکبات سالمی ہوتے ہیں اور تعامل میں حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً میتھین کی کلورینیشن میں میتھین اور کلورین کا آپس میں سالمی تعامل ہوتا ہے۔



اس کے باوجود چند ایسے تعاملات ہیں جن میں عامل (Reagent) روانی نوعیت رکھتے ہیں مثال کے طور پر میتھائل برومائڈ کے ساتھ OH^- رواں (قلی) کے تعامل سے میتھائل الکو حل کی تیاری ایک روانی تعامل ہے۔



لیکن کئی تعاملات میں نامیاتی اشیاء سالمی شکل میں ہی حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً CH_3Br ہمیشہ سالمی شکل میں ہی پایا جاتا ہے۔ سالمی تعاملات میں بند کی شکستگی (Bond Cleavage) واقع ہوتی ہے اور نئے بند حاصل ہوتے ہیں۔ بند کی شکستگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ بند کی شکستگی سے مختلف انواع حاصل ہوتے ہیں جیسے الکٹران پسند، مرکزہ پسند انواع اور آزاد اصلییے اور دوسرے انٹرمیڈیٹ جیسے 'Carbene'، 'Nitrenes'، 'Arynes' بنتے ہیں۔

6.1 مقاصد

- اس اکائی میں طلباء کو بند کی متجانس (مشابہ) اور غیر متجانس (غیر مشابہ) شکستگی 'انے حاصل ہونے والے انواع (اشیاء)' نامیاتی تعاملات اور نامیاتی عامل کے بارے میں بتلایا جائے گا۔
- مزید طلباء کو اس اکائی میں حسب ذیل کی معلومات فراہم کی جائے گی۔
- ☆ بند کی شکستگی، متجانس اور غیر متجانس شکستگی۔
 - ☆ بند کی شکستگی میں حاصل ہونے والے انواع۔
 - ☆ متممات اور علامت 'الکٹران پسند' مرکزہ پسند اور آزاد اصلییے۔
 - ☆ نامیاتی تعاملات کی درجہ بندی اور تعاملات کی میکینیت۔
 - ☆ کاربن مثبت رواں (Carbocation or Carbonium) 'کاربن منفی رواں (Carbanion) (Free Radicals) 'کاربنیں (Carbenes) 'قیام پذیری اور اشکال۔

اسکے علاوہ 'Assigning Formal Charge'، 'Methods of Determination of Reaction Mechanism' کے بارے میں بھی جانیں گے۔

6.2 بند کی شکستگی، متجانس شکستگی اور غیر متجانس شکستگی


سالمی تعامل میں (Molecular Reaction) میں شریک گرتی بند ٹوٹتے اور نئے بند حاصل ہوتے ہیں۔ ایک شریک گرتی بند میں مشترکہ الکٹران بند ہوتا ہے۔ تعامل کے دوران شریک گرتی بند ٹوٹتا ہے۔ اس عمل کو بند کی شکستگی کہتے ہیں۔ بند کی شکستگی کے دو طریقے ہیں متجانس یا مشابہ شکستگی اور غیر متجانس یا غیر مشابہ شکستگی۔

1- متجانس یا مشابہ شکستگی (Homolytic Cleavage or Fission or Homolysis)

2- غیر متجانس یا غیر مشابہ شکستگی (Heterolytic Cleavage or Fission or Heterolysis)


1- متجانس شکستگی

اگر شریک گرفتہ بند دو جوہروں یا گروپس کے درمیان متماثل طور پر ٹوٹ جائے تو اس کو متجانس شکستگی کہتے ہیں۔ حاصل ہونے والے ہر حصہ میں ایک الیکٹران ہوگا۔ اس شکستگی کو متماثل شکستگی بھی کہتے ہیں۔




A اور B. طاق الیکٹران (Odd Electron) والے انواع (اشیاء) ہیں۔ ان کو آزاد اصلییے (Free Radicals) کہتے ہیں۔

مثلاً سورج کی روشنی یا اعلیٰ تپش پر کلورین کے سالمے کی متجانس شکستگی واقع ہوتی ہے۔



کلورین جوہر یا آزاد اصلییے تیرکانشان الیکٹران کے تبادلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جوہری آزاد اصلییہ (Monoatomic) عنصر کا

جوہر ہے۔ آزاد اس لیے تعدیلی انواع ہیں جو کسی رسمی بار (Formal Charge) سے منسلک نہیں ہوتے۔



میٹھانیل آزاد اصلییہ

2- غیر متجانس شکستگی

اگر شریک گرفتہ بند دو جوہروں یا گروپس کے درمیان غیر متماثل طور پر ٹوٹ جائے تو اس کو غیر متجانس شکستگی کہتے ہیں۔ اس

شکستگی میں الیکٹران جوڑ ایک جوہر پر منتقل ہوتا ہے اس پر منفی برقی بار حاصل ہوتا ہے اور یہ منفی رواں کہلاتا ہے دوسرے جوہر پر مثبت برقی بار حاصل ہوتا ہے اور مثبت رواں کہلاتا ہے۔ اس شکستگی کو غیر متماثل شکستگی کہتے ہیں یہ شکستگی دو مختلف برقی منفیت والے جوہروں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔




منفی رواں

مثبت رواں

(مرکزہ پسند)


(الیکٹران پسند)



اس طرح غیر متجانس شکستگی میں مثبت رواں (الکٹران پسند انواع) اور منفی رواں (مرکزہ پسند انواع) حاصل ہوتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات کے تعاملات جن میں رواں حاصل ہوتے ہیں روانی نامیاتی مرکبات کہلاتے ہیں۔ تمام روانی تعاملات میں شریک گرفتہ بند کی غیر متجانس شکستگی عمل میں آتی ہے۔

6.3 عاملات اور متعاملات، الکٹران پسند، مرکزہ پسند، آزاد اعلیٰ

ایک کیمیائی تعامل کو کیمیائی مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے جس میں حصہ لینے والی اشیاء کے مول کی تعداد کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً میتھین اور Br_2 کے تعامل میں میتھین اور Br_2 متعاملات ہیں جب کہ میتھائل برومائڈ حاصلات ہے۔ متعاملات زیر طبقہ (Substrate) اور عامل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ نامیاتی شے جس سے حاصلات پیدا ہو 'زیر طبقہ' (Substrate) کہلاتی ہے۔ بعض تعاملات میں غیر نامیاتی متعامل بھی کیمیائی تعامل کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو عامل کہتے ہیں۔ CH_4 اور Br_2 کے درمیان تعامل روشنی کے زیر اثر عمل میں آتا ہے اور یہ ضیاء کیمیائی تعامل (Photo Chemical Reaction) کہلاتا ہے۔



عاملات اور تعاملات کو تین انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

I- الکٹران پسند (Electrophilic Reagents or Electrophile)

II- مرکزہ پسند (Nucleophilic Reagents or Nucleophile)

III- آزاد اعلیٰ (Free Radicals)

I- الکٹران پسند انواع

چند عاملات (سالمات یا رواں) کی الکٹران کثافت (Electron Density) کم ہوتی ہے اس لیے ان کو الکٹران فقداں انواع (Electron Deficient Species) بھی کہتے ہیں اس لیے یہ انواع متعامل میں ایسے مرکز کو تلاش کرتے ہیں جن کی الکٹران کثافت زائد ہو۔ ان الکٹران کو کشش کرنے والے عاملات الکٹران پسند کہلاتے ہیں۔ مثلاً HCl ایک پروٹان دہندہ (Proton Donor) ہے اور H^+ پروٹان بہت زیادہ عاملیت رکھتا ہے۔ پروٹان میں الکٹران کی فقداں اس کے رسمی چارج (Formal Charge) سے ظاہر ہوتی ہے۔ پروٹان (H^+) متعامل کے سالمہ میں کثیر الکٹران مرکز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس لیے پروٹان ایک الکٹران پسند نوع ہے۔

الکٹران پسند انواع تعدیلی بھی ہوتے ہیں بوران ٹرائی فلورائیڈ (BF_3) ایک لیوس ترشہ (Lewis Acid) ہے۔ مرکزی جوہر بوران الکٹران کے ہشتہ (Octet) کو مکمل کرنے سے قاصر ہے یہ تین شریک گرتی بند کے ذریعے صرف چھ (6) الکٹران کا ہشتہ (Sextet) بناتا ہے۔ اس طرح بوران الکٹران فقہان جوہر ہے۔ اس لیے کیمیائی تعاملات میں ہشتہ کی تکمیل کے لیے الکٹران کی تلاش میں رہتا ہے۔ لہذا BF_3 ایک الکٹران پسند سالمہ ہے۔ اس طرح AlCl_3 بھی الکٹران پسند کہلاتا ہے۔ تمام اریٹھنس ترشے (Arrhenius Acids) پروٹان دہندہ (Proton Donors) اور تمام لیوس ترشے (Lewis Acids) الکٹران جوڑ قبول کنندہ الکٹران پسند ہوتے ہیں۔ بعض تعاملات میں تعدیلی انواع درمیانی مرکب کی طرح پیدا ہوتے ہیں مثلاً کاربن (Carbene) اور عامل کا فعل انجام دیتے ہیں۔ BF_3 کی طرح CH_2 : (کاربن) بھی ایک الکٹران پسند ہے۔


II۔ مرکزہ پسند انواع

بعض عاملات (سالمات یا رواں) میں الکٹران کی کثافت یا مرکزہ ہوتے ہیں اور یہ الکٹران فقہان کی طرف رغبت رکھتے ہیں کئی تعاملات میں الکٹران پسند عاملات مرکزہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ چوں کہ ان میں الکٹران کثافت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کو مرکزہ پسند کہتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ میں عامل گروپ OH^- ہوتے ہیں۔ اریٹھنس اساس (Arrhenius Base) اس رواں پر منفی چارج زائد الکٹران کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے OH^- گروپ ایک مرکزہ پسند ہے۔ امونیا کا سالمہ بھی مرکزہ پسند ہے۔ امونیا میں نائٹروجن جوہر ہشتہ (Octet) کو مکمل کرتا ہے۔ تین ہائیڈروجن جوہر کے ساتھ تین شریک گرتی بند تیار کرتی ہے اور اس پر تنہا الکٹران جوڑ پایا جاتا ہے۔ نائٹروجن کے جوہر پر الکٹران جوڑ موجود رہتا ہے اور الکٹران دہندہ کی طرح عمل کرتا ہے۔ مرکزہ کی جانب اس کی رغبت ہوتی ہے اس طرح NH_3 ایک مرکزہ پسند (لیویس اساس) ہے۔

تمام اریٹھنس، لیوس اور برانسٹیڈ اساس (Arrhenius: Lewis, Bronsted Bases) مرکزہ پسند ہیں۔ π -بند سالمات بھی مرکزہ پسند ہوتے ہیں۔

ایٹھیلین (Ethylene) اور بینزین (Benzene) میں الکٹران کثافت زیادہ ہوتی ہے اور یہ لیوس اساس یا مرکزہ پسند کا کام انجام دیتے ہیں۔ بعض نامیاتی مرکبات الکٹران پسند اور مرکزہ پسند دونوں کا فعل انجام دیتے ہیں۔

مثلاً ایلڈ یہائیڈ اور کیٹون میں کاربونیل گروپ 'فعلی گروپ' ہوتا ہے۔ گمک کی وجہ سے کاربونیل گروپ (Carbonyl Group) میں قطبیت (Polarity) پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کاربن پر جزوی مثبت بار اور آکسیجن پر منفی بار پیدا ہوتا ہے۔



اس لیے ایلڈ یہائیڈ اور کیٹون میں کاربونیل گروپ کا کاربن جوہر الکٹران پسند اور آکسیجن جوہر مرکزہ پسند ہوتا ہے۔

چند الکٹران پسند اور مرکزہ پسند انواع کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ (جدول-6.1)


جدول- 6.1

مرکزہ پسند انواع (Nucleophiles)	الکٹران پسند انواع Electrophiles
(Negatively Charged Species)	(Positively Charged Species)
1- منفی بار انواع (منفی رواں)	1- مثبت بار انواع (مثبت رواں)
H^- (Hydride)، Cl^- (کلورائیڈ)، OH^- ، $\text{N}^- \text{H}_2$ ، OR^- (الککسائیڈ)، CN^- ، Carbanium ، RCOO^-	CH_3^+ ، NO_2^+ ، NO^+ ، H^+ (نائٹرونیئم رواں)، Cl^+ (Chloronium)، H_3O^+ ، NH_4^+ (کاربونیم رواں)، $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$ (بیزین ڈائزونیئم رواں)
2- تعدیلی سالمات	2- تعدیلی سالمات (Neutral Molecules)
RNH_2 ، ROH ، R-O-R ، H_3N ، H_2O	AlCl_3 ، CH_2 (Carbene)، CCl_2 ، ZnCl_2 ، FeCl_3 ، SO_3 ، BF_3
	3- لیویس ترشے
	4- الکٹران جوڑ قبول کنندہ (Electron Pair Acceptor)

III- آزاد اصلے

ایک شریک گرفتہ بند کی متجانس شکستگی سے آزاد اصلے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ طاق ((Odd الکٹران والے تعدیلی انواع ہیں بے جوڑ الکٹران کی وجہ سے آزاد اصلے متناطیس پسند (Paramagnetic) ہوتے ہیں۔ بالا تنفشی شعاع (Ultra Violet Light) 'حرارت اور نامیاتی پر آکسائیڈز کی موجودگی میں ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ آزاد اصلوں کے تعاملات عام طور پر گیس ہیئت (Gaseous Phase) اور غیر قطبی محلول کے محلول میں واقع ہوتے ہیں۔ آزاد اصلے تعاملات کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ تعاملات بہت تیز رفتار سے آگے بڑھتے ہیں آزاد اصلوں کی شناخت متناطیسی میلانیت پیمائش (Magnetic Susceptibility Measurement) سے کی جاتی ہے۔ آزاد اصلوں کو ضیاء کیمیائی طریقہ اور حراری طریقہ (Thermal Method) سے تیار کیا جاتا ہے۔ آزاد اصلے میں کاربن کا اختلاط (sp^2) ہوتا ہے جب کہ "p" مدارچہ میں ایک بے جوڑ الکٹران ہوتا ہے۔

آزاد اصلوں کی قیام پذیری کا درجہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔



علامات کی درجہ بندی کو ذیل میں دیا گیا ہے

علامات

آزاد اصلئے (Free Radicals)	سالمات (Molecules)	رواں (Ions)
لیویس اساس	لیوی ترشے	منفی رواں
(مرکزہ پسند)	(الکٹران پسند)	مثبت رواں
NH_3	BF_3	H^+
		OH^-
		(الکٹران پسند)

الکٹران پسند انواع اور ترشیت 'مرکزہ پسند انواع اور اساسیت

الکٹران پسند انواع میں الکٹران جوڑ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثلاً H^+ رواں الکٹران کو قبول یا حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر الکٹران پسند انواع ارہینس ترشے (Arrhenius Acid) 'لوری۔ برانسٹیڈ ترشے (Lowry-Bronsted Acids) اور لیوس ترشے ہوتے ہیں۔ ترشیت (Acidity) کا انحصار الکٹران قبول کرنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اس طرح H_3C^+ , NO^+ , NO_2^+ H^+ رواں الکٹران پسند ہیں۔ سالمات جیسے CH_2 , CCl_2 , BF_3 , AlCl_3 الکٹران پسند انواع ہیں۔

مرکزہ پسند انواع میں الکٹران کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو مرکزہ پسند کہتے ہیں مثلاً Cl^- تعامل کے دوران مثبت بار رواں کو قبول کرتا ہے۔ عام طور پر مرکزہ پسند انواع ارہینس اساس (Arrhenius Base) 'لوری۔ برانسٹیڈ اساس (Lowry Bronsted Base) اور لیویس اساس (Lewis Base) ہوتے ہیں۔ اساسیت کا انحصار مرکزہ پسند نوع کی نوعیت اور مرکزہ کی جانب رغبت پر ہوتا ہے۔


6.4 کاربن مثبت رواں، کاربن منفی رواں 'آزاد اصلئے، اشکال اور اضافی قیام پذیری

کاربونیئم رواں یا کاربن مثبت رواں (Carbocation or Carbonium Ion)


ایک شریک گرتی بند کی غیر متجانس شکستگی سے مثبت اور منفی رواں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کاربن جوہر بند میں برقی منفیت جوہر سے جڑا ہو تو الکٹران جوڑ برقی منفیت جوہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح اس پر منفی بار اور کاربن پر مثبت بار حاصل ہوتا ہے۔

مثبت برقی بار والے کاربن جوہر 'کاربونیئم رواں (کاربن مثبت رواں) کہلاتے ہیں۔


کاربونیئم رواں کے تین اقسام ہیں۔ ابتدائی، ثنائی، ثلاثی کاربونیئم رواں۔ اس کا انحصار ابتدائی، ثنائی، ثلاثی کاربن پر ہوتا ہے۔




میٹھائیل کاربونیئم رواں
(ابتدائی)



ایٹھائیل کاربونیئم رواں
(ابتدائی)



آئیسوپروپائل
کاربونیئم رواں
(ثانوی)




اربعی بیوٹائل
کاربونیئم رواں
(ثلاثی)

کاربونیئم رواں کی تیاری

کاربونیئم رواں کو غیر متجانس بند شکلیں، الکین اور ترشہ کے تعامل یا ڈائیزومرکبات (Diazo Compounds) کی تحلیل سے تیار کیا جاتا ہے۔


1- غیر متجانس بند شکلیں

شریک گرفتہ بند میں الیکٹران جوڑا اعلیٰ برقی منفیت والے جوہر پر کشش کرتا ہے۔ اس طرح کاربن پر مثبت بار اور دوسرے جوہر پر منفی بار حاصل ہوتا ہے۔




2- الکین اور ترشہ کے تعامل سے تیاری

لیکن اور ترشہ کے تعامل سے کاربونیئم رواں حاصل ہوتے ہیں۔



3- ڈائیزومرکبات کی تحلیل سے تیاری


بنزین ڈائیزونیم نمک کی تحلیل سے کاربونیئم رواں حاصل ہوتے ہیں۔



کاربونیئم رواں کی قیام پذیری

کاربونیئم رواں کی قیام پذیری کا امالی اثر اور بالامزدوجیت اثر سے تشریح کی جاتی ہے۔


الکائیل گروپ الکٹران دہندہ ہوتا ہے الکائیل گروپ جتنے زیادہ ہوں گے، کاربونیئم رواں اتنا ہی قیام پذیر ہوگا۔ اس طرح ثلاثی کاربونیئم رواں کی قیام پذیری، ثانوی کاربونیئم رواں سے زیادہ ہوتی ہے اور ثانوی کاربونیئم رواں، ابتدائی کاربونیئم رواں سے زیادہ قیام پذیر ہوگا۔



الکائیل گروپ کا +I اثر ہوتا ہے۔ ثلاثی کاربونیئم رواں میں مثبت بار تمام چار کاربن جوہروں پر منتشر ہوتا ہے جب کہ ثانوی اور ابتدائی کاربونیئم رواں میں تین (3) اور دو (2) کاربن جوہروں پر منتشر ہوتا ہے۔ اس طرح ثلاثی کاربونیئم رواں زیادہ قیام پذیر ہے۔


کاربونیئم رواں کی ساخت

کاربونیئم رواں میں کاربن کا اختلاط sp^2 ہوتا ہے اور یہ سطح (Planar) رواں ہوتا ہے۔ اس میں تین sp^2 مخلوط مدار چھپتے ہیں اور 'p' مدار چھ مخلوعہ (خالی) ہوتا ہے۔




کاربن منفی رواں (Carbanion)

ایک شریک گرفتی بند جس میں کاربن کم منفی برقییت جوہر ہے جڑا ہو 'کی غیر متجانس شکستگی سے الکٹران جوڑ کاربن جوہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح کاربن پر منفی بار حاصل ہوتا ہے۔ اس کو کاربن منفی رواں (Carbanion) کہتے ہیں۔ مثلاً C-H بند کی غیر متجانس شکستگی سے کاربن منفی رواں اور پروٹان حاصل ہوتا ہے۔




نامیاتی مرکب اور اساس کے تعامل سے بھی کاربن منفی رواں حاصل ہوتا ہے۔




اساس

کاربن منفی رواں کے تین اقسام ہیں، ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی کاربن منفی رواں۔ اس کا انحصار ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی کاربن جوہر پر ہوتا ہے۔



کاربن منفی رواں کی قیام پذیری


کاربن منفی رواں کی قیام پذیری کا درجہ ذیل میں دیا گیا ہے۔



الکائیل گروپ + I اثر رکھتا ہے۔ الکائیل گروپ الیکٹران دہندہ گروپ میں الکائیل گروپ کی وجہ سے مرکزی کاربن پر الیکٹران کثافت زیادہ ہو جاتی ہے اور عاملیت میں اضافہ جب کہ قیام پذیری میں کمی واقع ہوتی ہے۔

کاربن منفی رواں کی ساخت

کاربن منفی رواں میں کاربن کا اختلاط sp^3 ہوتا ہے۔ تین sp^3 مدارچے σ بند بناتے ہیں اور ایک sp^3 مدارچے میں الیکٹران جوڑ ہوتا ہے۔ اس طرح کاربن منفی رواں کی ساخت NH_3 کی طرح اہرامی ساخت (Pyramidal Structure) ہوتی ہے۔



کاربنینس (Carbenes)

کاربنینس تعدیلی نامیاتی انواع (مرکبات) ہیں جن میں کاربن دو (2) گرفتہ (Divalent) ہوتا ہے۔ اس میں الیکٹران ششہ (Electron Sextet) موجود رہتا ہے لیکن کوئی برقی بار نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی عامل مرکبات ہوتے ہیں یہ مرکبات الیکٹران پسند ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں الیکٹران صرف چھ (6) ہوتے ہیں۔




Methyl Carbene



Dichloro Carbene


کاربینس کی تیاری کے طریقے

1- کلوروفام اور سوڈیم ایٹھا کسائیڈ کے تعامل سے (Dichloro Carbene) حاصل ہوتی ہے




Dichloro Carbene

2- ڈائیزو میتھین (Diazo Methane) پر بالابنفشی اشعاع کے اثر سے (Methyl Carbene) حاصل ہوتا ہے۔




قیام پذیری

کاربینس کے دو (2) غیر بندشی الیکٹران جوڑے یا بے جوڑے ہوتے ہیں اگر دو (2) الیکٹرانس جوڑے کی شکل میں موجود ہوں تو اس کو مفردہ کاربینس (Singlet Carbene) کہتے ہیں۔ اگر کاربن کے دو الیکٹران بے جوڑے (Unpaired) ہوں تو اس کو ثلاثیہ کاربینس (Triplet Carbene) یا 'Biradical' کہتے ہیں کیوں کہ الیکٹران بے جوڑے ہوتے ہیں۔ ثلاثیہ حالت، مفردہ حالت (Singlet State) سے زیادہ قیام پذیر ہوتی ہے۔



کاربین اور C=C مرکبات میں اضافی تعامل واقع ہوتا ہے۔ Carbenes کی قیام پذیری کا درجہ ذیل میں دیا گیا ہے۔




کاربینس کی ساختیں

1- مفردہ کاربین (Singlet Carbene)

اس میں کاربن کا اختلاط sp^2 ہوتا ہے۔ دو (2) sp^2 مخلوط مدار چے شریک گرفتی بند بناتے ہیں اور تیسرے مدار چے میں الیکٹران جوڑے ہوتا ہے۔ 'p' مدار چے خالی رہتا ہے۔ اس کی ساخت کاربونیم رواں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس میں الیکٹران اسپن (Spin) مخالف سمت میں ہوتی ہے اس کو CH_2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

2- ثلاثیہ کاربین (Triplet Carbene)

اس میں کاربن کا اختلاط 'sp' ہوتا ہے۔ دو (2) مخلوط 'sp' مدار چے شریک گرفتی بند بناتے ہیں جب کہ غیر مخلوط دو (2) 'p' مدار چے ایک دوسرے کے عموداً واقع ہوتے ہیں جن میں بے جوڑے الیکٹران ہوتے ہیں۔ اس میں الیکٹران اسپن (Spin) موافق سمت میں ہوتی ہے۔ اس کو CH_2 (11) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



آزاد اسیلئے (Free Radicals)

ایک شریک گرتی بند کی متجانس شکستگی سے آزاد اسیلئے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بے جوڑ (طاق) الیکٹران کے تعدیل انواع ہیں۔ بے جوڑ الیکٹران کی وجہ سے یہ مقناطیس پسند (Paramagnetic) ہوتے ہیں ان کے تعاملات گیسو ہیٹ (Gaseous Phase) یا غیر قطبی محلات میں واقع ہوتے ہیں۔

آزاد اسیلوں کی تیاری:- ان کو عام طور پر دو طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔


1- ضیاء کیمیائی طریقہ (Photo Chemical Method)

بالا بنفشی شعاع کی موجودگی میں شریک گرتی بند کی متجانس شکستگی عمل میں آتی ہے اور آزاد اسیلئے حاصل ہوتے ہیں




2- حراری طریقہ (Thermal Method)

ایک نامیاتی مرکب کو گیسو ہیٹ میں زیادہ تپش پر گرم کیا جاتا ہے تو آزاد اسیلئے حاصل ہوتے ہیں اگر شریک گرتی بند کی افتراق توانائی (Dissociation Energy) کم ہو تو مائع ہیٹ میں بھی آزاد اسیلئے حاصل ہوتے ہیں مثلاً ایتھائل پر آکسائیڈ کو اعلیٰ تپش تک گرم کرنے سے آزاد اسیلئے حاصل ہوتے ہیں۔



آزاد اسیلوں کی قیام پذیری



آزاد اسیلوں کی قیام پذیری کی تشریح بالا مزدوجیت (Hyper Conjugation) یا غیر بند گمک ساختوں سے کی جاتی ہے۔ ابتدائی آزاد اسیلئے میں چار (4) گمک ساختیں ہوتی ہیں جب کہ ثانوی اور ثلاثی آزاد اسیلئے بالترتیب سات (7) اور دس (10) گمک ساختوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح قیام پذیری کا درجہ حسب ذیل ہے۔



گمگ ساختیں زیادہ ہوں تو قیام پذیری میں اضافہ ہوگا۔

آزاد اصلئے کی ساخت

آزاد اصلیوں میں کاربن جوہر کا sp^2 اختلاط ہوتا ہے اور ان کی شکل اہرامی یا سطح ساخت ہوتی ہے۔ 'p' مدار چہ عموداً ہوتا ہے جس میں ایک بے جوڑ الیکٹران ہوتا ہے الکیل اصلئے جیسے میتھائل اصلیه سطح ہوتا ہے۔ آزاد اصلئے جن میں کاربن جوہر برقی منفیت والے جوہر سے جڑا ہوتا ہے 'اہرامی ساخت رکھتے ہیں۔ برقی منفیت زیادہ ہو تو سطح ساخت سے انحراف ہوتا ہے اور اہرامی ساخت حاصل ہوتی ہے۔




6.5 نائٹرنس (Nitrenes)

نامیاتی کیمیا میں نائٹرنس نائٹروجن رکھنے والے Intermediates ہے۔ جو کہ Carbene کے مشابہہ (Analogous) ہوتے ہیں۔

نائٹرنس عام طور پر Azides کے Decomposition کے ذریعے بنتے ہیں یا پھر ایسے نائٹروجن مرکبات جن میں سے کہ Leaving Group کا Loss ہوتا ہے کہ ذریعہ بنتے ہیں۔

نائٹرنس، Electron Deficient ہوتے ہیں جس میں کہ نائٹروجن جوہر پر صرف چھ Valence Electrons ہوتے ہیں جو کہ اس کو Electrophile بناتے ہیں۔

نائیٹرنس 'دو Spin State یا حالتوں میں پائے جاتے ہیں جن کو کہ Singlet اور Triplet کہتے ہیں۔ ان Singlet اور Triplet حالتوں میں Triplet حالت بہت ہی Stable یا قیام پذیر ہوتی ہے۔



جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نائیٹرن جو کہ N - H یا اس کے مشتق کے Diatomic Molecules ہیں۔ جب ہائیڈروژونک ایسڈ (Hydrazoic Acid) یا نامیاتی ایزائیڈس (Organic Azides) کو گرم کیا جاتا ہے۔ یا پھر Light کے سامنے Exposed کیا جاتا ہے تو نائیٹرنس حاصل ہوتے ہیں۔

اوپر کی نائیٹرنس کی ساختوں میں Four Dots چار e^- غیر بندشی الیکٹران (Non Bonded) کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس میں کہ دو electrons جو کہ Nitrogen پر رہنے والے Lone Pair ہوتے ہیں۔

نائیٹرنس کی ساخت اور عالمیت

نائیٹرنس مخصوص سالمی مرکبات ہے جو کہ بہت ہی زیادہ عامیلت رکھتے ہیں۔ یہ Carbene کی طرح تیار اور Detect کئے جاتے ہیں حالانکہ کاربنس کے Iso-electronic ہوتے ہیں اور یہ اپنی مخصوص عامیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔


نائیٹرنس میں دو Non-bonded Electrons کی Paired, Spins یا Unpaired ہوتے ہیں اسی لئے نائیٹرنس 'کاربنس کی طرح دو Spin States میں وقوع پذیر (Exist) کرتے ہیں۔

نائیٹرنس کو ساخت کی بنا پر دو قسموں میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ نائیٹرنس کے نائٹروجن جو ہر کے sp -Hybridized, Orbital دو ظاہری Molecular Orbitals, Degenerate Nonbonding (Virtually) (NBMOs) میں حصہ لے کر نائیٹرنس بناتے ہیں جس میں کہ دو Valence Electrons ہوتے ہیں۔ p -Orbitals کو سالموں میں ان کی Orientation کی بنیاد پر دو زمروں میں درجہ بند کیا جاتا ہے مثلاً in Plane Orbital یا Out of Plane Orbital کہتے ہیں۔





Singlet Nitrene

Singlet Nitrene میں ایک Vacant p-Orbital اور دو الیکٹرونس Non-Bonding sp^2 Orbital میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ Azides کی Thermolysis میں Spin Conversion Rule کے مطابق پہلے Singlet Nitrene بناتا ہے۔




Triplet Nitrene

Triplet Nitrene میں ٹائیٹریٹ میں دو Parallel Spin Electrons (جو کہ ایک sp^2 NBMO's اور دو سر Vacant, p-Orbital) ہوتا ہے میں Occupy کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے Non Bonding electrons کے Columbic Repulsion میں کمی ہوتی ہے۔



(2) Isocyanates سے Carbon Monoxide کے اخراج کے ذریعہ:



نایٹرنس کی اہم تعاملات


نایٹرنس کی کیمیائی طور پر Carbene کی طرح عمل کرتے ہیں۔ نائیٹرنس 'Ring Closure' ہائیڈروجن جوہر کو Extract کر کے Primary Amine Group دیتے ہیں اور Isomerise ہو کر Imines دیتے ہیں۔

مزید نائیٹرنس آپس میں مل کر Cis & Trans Aziridines دیتے ہیں جبکہ Singlet Nitrene، C = C پر Add Stereo Specifically ہوتے ہیں۔


Cycloaddition Reactions of Nitrenes (A)

نایٹرنس 'الکیلین' پر 1, 2 Addition کے عمل سے گذر کر Aziridines بناتے ہیں۔ یہ تعامل خاص کر کے Nucleophilic Alkenes کے ساتھ واضح طور پر انجام پاتا ہے کیونکہ 'نایٹرنس' Electrophilic ہوتے ہیں اس تعامل پر حاصل ہونے والے Product یعنی کہ Aziridine کی Stereochemistry، نائیٹرنس کے Singlet یا Triplet حالت پر منحصر ہوتی ہے۔

Singlet Nitrene, Ethyl diazoformate Thermal Breakdown میں حالت میں Thermal Breakdown کے عمل سے گذر کر Alkene سے تعامل کے دوران Cis-But-2-ene میں Stereo-specifically تعامل کر کے Cis-Aziridine دیتے ہیں اس طرح Singlet Nitrene کے تعامل سے Stereochemistry Retain رہتی ہے۔



یہ تعامل گروہی جیسے کہ، R = Aryl, Cyano, EtO₂C اور RSO₂ اور دوسرے گروپس کی موجودگی و توقع پذیر ہوتی ہے۔




Curtius Rearrangement (B)

Curtius Rearrangement میں Acyl Azide Pyrolysis کے عمل سے گذر کر Molecular Nitrogen کو خارج کرتے ہے۔ اور پھر Rearrangement کے عمل سے گذر کر Isocyanate بناتے ہیں۔

Acyl Azide کو Acyl Chloride کی Sodium Azide کے ساتھ Nucleophilic Substitution یا پھر Acyl Hydrazides کے ساتھ تعامل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

Curtius Rearrangement مکمل طور پر Acid Chloride کے کاربن جوہر کے Loss ہونے کی وجہ سے Rearrangement کے ذریعہ Amine حاصل ہونے والا عمل ہے حسب ذیل میں مکمل تعامل کو ظاہر کیا گیا ہے جس میں کہ نائٹرائین کی تیاری اور Final Product کی تیاری کا عمل بیان کیا گیا ہے۔



6.6 ارا نینس (Arynes) یا بینزائینس (Benzyne)


ارا نینس جن کو بینزائینس بھی کہتے ہیں۔ ایسے Intermediates ہے جو کہ زیادہ عامل ہوتے ہیں اور جس کے عطری حلقہ (Aromatic ring) میں دو کاربن کے درمیان ($\equiv$) تھرا بند موجود ہوتا ہے یہ Aromatic Compound، ارا نینس کی طرح مستحکم نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی مخصوص ساخت اور عاملیت ان کو نامیاتی تالیف میں ایک اور Intermediate کا درجہ دلاتے ہیں یہ کئی ایک نامیاتی مرکب کی تیاری میں Intermediate کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

ارا نینس کی اہم خصوصیات

- (1) ارا نینس اُن میں موجود Triple Bond ($C \equiv C$) جو کہ Strained ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ Reactive ہوتے ہیں اس لئے یہ Nucleophilic Addition Reaction کو انجام دیتے ہیں۔
- (2) ارا نینس کو موضوع Leaving Group کے Elimination کے ذریعہ Aryl Halides یا Aryl Triflate سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک $C \equiv C$ Bond Reactive ہوتا ہے۔
- (3) ارا نینس کئی ایک تعامل جیسے کہ Cycloaddition، Nucleophilic Additions اور Electrophilic Aromatic Substitution کے ذریعہ کئی ایک پیچیدہ نامیاتی مرکبات بناتے ہیں۔ ارا نینس کی تیاری اور اس کی میکانیت

یہ دیکھا گیا کہ Halobenzenes جن پر کہ Electron Withdrawing Substitution نہیں ہوتے وہ عام طور پر Nucleophile کے ساتھ تعامل نہیں کرتے یہاں تک کہ Chlorobenzene تعامل میں حصہ لیتا ہے اس اعلیٰ دباؤ اور تپش پر یہ Nucleophilic Substitution تعامل Elimination Addition Mechanism کے ذریعہ اراٹینس یا بینزائیٹینس نامی Intermediate کے ذریعہ تکمیل پاتا ہے۔


1928 میں Ionic Chemical Compound میں Chemists نے صنعتی پیمانہ پر Chlorobenzene سے Phenol کی تیاری Dilute Aqueous NaOH کی موجودگی میں 170 دباؤ پر 340°C تپش پر کی جاتی ہے۔



میکانیت

اوپر کی دی گئی تعامل کی میکانیت کی حسب ذیل مرحلوں میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ تعامل دراصل اراٹینس کی ذریعہ Aromatic Nucleophilic Substitution تعامل کی ایک مثال ہے۔ جو Elimination Addition Mechanism کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ اس تعامل میں دو مرحلہ ہوتے ہیں پہلے مرحلہ میں HX کا Bose Catalyzed Elimination جو کہ Aryl Halide سے ہوتا ہے اس کے بعد Addition ہوتا ہے۔

Step – 1 Elimination





بنزائیٹینس کی الیکٹرانائی ساخت کو نیچے کی شکل میں بتلایا گیا ہے۔

Electronic Structure of Benzyne

پہلے مرحلہ میں تعامل سے حاصل ہونے والا مرکب بنزائینس کہلاتا ہے جس کو Dehydrobenzene بھی کہتے ہیں جو کہ Benzene سے دو ہائیڈروجن کم رکھتا ہے اور دو دہرے بند اور ایک تہرہ بند رکھتا ہے یہ بنزائینس فوراً ہی Nucleophile جیسے امونیا کہ ساتھ تعامل کر کے دوسرے مرحلہ میں Product بناتا ہے۔

Step – 2 Addition



Structure of Benzyne

6.7 فارمل بار کو محسوب کرنا

فارمل بار یا Formal Charge سے مراد ایسا Charge ہے جو کہ سالمہ میں ایک جوہر پر Assigned کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکٹرانس تمام جوہروں کی بیچ میں مساوی طور پر Shaped ہوتے ہیں۔ کسی بھی سالمہ کے فارمل بار کو محسوب کرنے کے لئے سالمہ کی گمک ساخت میں سے اُس ساخت کو Choose کیا جاتا ہے جس میں کہ فارمل بار ہر جوہر پر تقریباً Zero ہوتا ہے۔ کسی بھی سالمہ میں جوہر کے فارمل بار کو حسب ذیل ضابطہ سے محسوب کی جاتی ہے۔

$$Fc = V - N - \frac{B}{2} \quad Fc = V - N - \frac{B}{2}$$


جہاں پر

V = Number of Valence Electrons of the Neutral Atom in Isolation

N = Number of Non Bonding Valence Electrons on this Atom in the Molecules

B = Total Number of Electrons Shared in Bond with Other Atoms in the Molecule

مثلاً




Formal Charge	O	O	O
oxidation state	2-	4+	2-

6.8 تعاملی میکانیت کے تعین کے طریقے

کس بھی تعامل کی میکانیت کو ظاہر کرنے کے لئے کئی ایک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں زیادہ تر تعاملات میں ایک طریقہ کافی نہیں ہوتا اس لئے ایک سے زیادہ طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسکے ذریعہ تعامل کی میکانیت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

Identification Of Production (A)

کوئی بھی نامیاتی تعامل کی میکانیت اُس وقت یک Proposed نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اُس کے تمام حاصلات (Products) کے تناسب کو محسوب (Assign) نہیں کر لیا جاتا ہے اگر کسی بھی تعامل کے حاصلات کا تناسب صحیح طور پر Predict نہ ہوتا ہو تو اُس صورت میں اُس کی میکانیت کو Proposed نہیں کر سکتے۔



Example of Hydrolysis of Isomeric Allylic Chloride


Determination of Presence of an Intermediate (B)

کسی بھی تعامل کی میکانیت کو ثابت کرنے کے لئے اُس تعامل میں وقوع پذیر ہونے والے Intermediates کی موجودگی کو ثابت کرنا ضروری ہے اس کو Determine کرنے کے لئے حسب ذیل طریقے ہیں۔

Isolation of an Intermediate (1)

کسی بھی تعامل میں وقوع پذیر ہونے والے Intermediate کو مختصر وقت میں روک کر یا پھر Mild Reaction Condition کے استعمال کے ذریعہ تعامل کو انجام دے کر Isolate کیا جاتا ہے اگر اس طرح حاصل ہونے والا Product Independently دوسرے تعامل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ تعامل اُس Intermediate کے ذریعہ ہی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔

مثال:- Hoffman Rearrangement




Detection of Intermediate (2)

اگر تعامل میں بننے والا Intermediate غیر قیام پذیر ہوتا ہے تو اُس صورت میں اُس کو Detect کرنے کے لئے Spectroscopic Methods کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر E_1 اور SN^1 تعامل کے Pathway میں بننے والے Carbocation کو NMR Spectroscopy کے ذریعے Detect کیا جاتا ہے۔




Mechanism:


Step 1 Cleavage of C–Br bond **slowly** to form the carbocation intermediate.
Step 1 is the **rate-determining step**.



Step 2 Rapid reaction between carbocation intermediate and nucleophile H_2O ; H_2O attacks from both sides of the planar carbocation.





Step 3 Rapid deprotonation to produce neutral final product *t*-butyl alcohol (very fast step, and sometimes can be combined with step 2 together as one step).



Trapping of Intermediate (3)

یعنی تعاملات یا Cases میں Intermediate مخصوص مرکبات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ اگر اس مرکب کے ساتھ تعامل کے دوران تھوڑی سی مقدار کو نکال کر اُس مخصوص مرکب کے ساتھ تعامل کرانے پر حاصل ہونے والے Product کے ذریعہ Intermediate کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے مثلاً 'Benzyne' Diene کے ساتھ تعامل کر کے Diels-Alder Reaction دیتا ہے یہ تعامل Benzyne کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے۔

Substituted benzyne ("arynes") can produce multiple products




Benzyne Diels alder Reaction

Isotopic Labeling (4)


بعض تعاملات میں بننے والے Intermediate کو Isotopic Labeling کے طریقہ سے Detect کیا جاتا ہے اس طریقہ میں Radioactive Isotopes اور Stable Isotopes کو استعمال کیا جاتا ہے مثلاً D (Deuterium) کو Mass Spectroscopy، IR، NMR کے ذریعے Detect کیا جاتا ہے جب H کے بدلے D کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے C^{13} جو کہ ایک Non Radioactive عنصر ہے۔ C^{13} کے ذریعے Detect کیا جاتا ہے۔

مثلاً H_2O^{18} By Hydrolysis of Ester



Stereo Chemical Evidence (5)

اگر کسی بھی تعامل میں حاصل ہونے والا Product ایک سے زیادہ Stereoisomer کی شکل میں Exits ہوتا ہے اُس میں حاصل ہونے والا Stereoisomer اُس تعامل کی میکائیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً جب Cis-2-Butene کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو Meso 2,3-Butanediol بناتا ہے اور نہ کہ Racemic Mixture یہ تعامل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ Two OH گروپ Double Bond پر ایک ہی جانب سے Attack کرتے ہیں۔



Kinetic Evidence (6)

کئی ایک تعاملات میں میکائیت کو Kinetic Evidence کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے جس میں تعامل کے Order of the Reaction & Rate Determining Step کو محسوب کیا جاتا ہے۔

مثلاً:- Aliphatic Nucleophilic Substitution

Reaction - 1: Methyl Bromide کی Hydrolysis

Reaction - 1: Ter Butyl Bond کی Hydrolysis، First Order Kinetics کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\frac{-d[\text{CH}_3\text{Br}]}{dt} = K[(\text{CH}_3)(\text{Br})]$$

اس میں Intermediate کی جگہ پر Transition State حاصل ہوتی ہے اور یہ SN¹ Pathway کو ظاہر کرتی ہے۔

Reaction: 2: Methyl Bromide کی Hydrolysis میں Second Order Kinetics حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{-d[\text{CH}_3\text{Br}]}{dt} = K[(\text{CH}_3)(\text{Br})][\text{OH}^-]$$

یہ تعامل SN² Pathway کو ظاہر کرتی ہے۔

6.9 اکتسابی نتائج

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلباء بند کی متجانس (مشابہ) اور غیر متجانس (غیر مشابہ) شکستگی 'ان سے حاصل ہونے والے انواع (اشیاء) 'نامیاتی تعاملات اور نامیاتی عامل کے بارے میں جاننا۔

اس اکائی کو تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو گے اور حسب ذیل معلومات حاصل کی۔

☆ بند کی شکستگی 'متجانس اور غیر متجانس شکستگی۔

☆ بند کی شکستگی میں حاصل ہونے والے انواع۔

☆ متعملات اور عاملات 'الکٹران پسند' مرکزہ پسند اور آزاد اعلیٰ۔

☆ نامیاتی تعاملات کی درجہ بندی اور تعاملات کی میکانیت۔

☆ کاربن مثبت رواں (Carbocation or Carbonium)، کاربن منفی رواں (Carbanion)

، آزاد اعلیٰ (Free Radicals)، کاربنس (Carbenes) 'قیام پذیری اور اشکال۔

اسکے علاوہ 'Arynes 'Nitrenes 'Assigning Formal Charge. Methods of Determination of Reaction

Mechanism کے بارے میں بھی جاننا۔

6.10 کلیدی الفاظ

1- بند کی شکستگی شریک گرفتہ بند کا ٹوٹنا

- 2- متجانس شکستگی شریک گرفتگی بند کا متشکل طور پر ٹوٹنا
- 3- غیر متجانس شکستگی شریک گرفتگی بند کا غیر متشکل طور پر ٹوٹنا
- 4- الیکٹران پسند انواع مثبت بار رواں 'لیویس' ترشے
- 5- مرکزہ پسند انواع منفی بار رواں 'لیویس' اساس
- 6- Carbene تعدیلی نامیاتی انواع جن میں کاربن دو گرفتہ ہوتا ہے
- 7- آزاد اعلیٰ بے جوڑ الیکٹران انواع جو مقناطیس پسند ہوتے ہیں

6.11 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- متجانس شکستگی سے حاصل ہونے والے انواع ہیں۔
- 2- ایک کیمیائی تعامل کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک مثال دیجیے۔
- 3- الیکٹران پسند سالمہ سے کیا مراد ہے؟
- 4- Carbene سے کیا مراد ہے؟
- 5- آزاد اعلیٰ (Free Radicals) سے کیا مراد ہے۔
- 6- کاربن منفی رواں (Carbanion) میں کاربن کا اختلاط کونسا ہوتا ہے۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- متجانس یا مشابہ شکستگی اور غیر متجانس یا غیر مشابہ شکستگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح انجام پاتی ہے؟
- 2- الیکٹران پسند انواع کیا ہیں؟ یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ تشریح کیجیے۔
- 3- مرکزہ پسند انواع سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟
- 4- علامات اور متعلقات میں کیا فرق ہے؟ مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- بند کی شکستگی 'اس کے اقسام اور حاصل ہونے والے انواع کی تفصیل سے تشریح کیجیے۔
- 2- Nitrene پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔
- 3- Formal Charge سے مراد ایسا Charge ہے۔ اور اسکو کیسے ایک جوہر پر Assigned کیا جاتا ہے بیان کیجیے۔

اکائی - 7: نامیاتی مرکبات میں مکانی ہم ترکیبیت

(Unit-7: Stereochemistry of Organic Compounds)

اکائی کے اجزا	
7.0 تمہید	
7.1 مقاصد	
7.2 ہم ترکیبی اور ہم ترکیبی کے اقسام اور مثالیں	
7.3 ہندسی ہم ترکیبی اور ہندسی ہم ترکیبوں کے E اور Z شکل	
7.4 اکتسابی نتائج	
7.5 کلیدی الفاظ	
7.6 نمونہ امتحانی سوالات	

7.0 تمہید

نامیاتی کیمیا کی تعریف کاربن کے مرکبات کے طور پر کی جاتی ہے۔ کاربن تمام نامیاتی مرکبات میں موجود ہوتا ہے چاہے اس کی تفرید حیوان اور پودوں کے ذریعے یا تالیفی طریقے سے ہو۔ نامیاتی مرکبات میں کاربن چار گرفتہ (Tetravalent) ہوتا ہے اور اکہرا، دوہرا اور تہرا بند تیار کر سکتا ہے۔ کاربن عنصر کی یکتا خاصیت ہے کہ یہ زنجیریں یا حلقے بھی تیار کر سکتا ہے۔ اس خاصیت کو زنجیریت (Catenation) کہتے ہیں۔ کاربن مرکبات میں عام طور پر شریک گرفتہ بند ہوتے ہیں۔

نامیاتی مرکبات کی ایک اور خاصیت ہم ترکیبیت (Isomerism) ہے، یعنی مرکب کے سالمی ضابطے ایک ہوتے ہیں، لیکن ساختیں اور خواص مختلف ہوتے ہیں۔ یہ خاصیت ہم ترکیبی کہلاتی ہے اور مرکبات کو ہم ترکیبے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر H_2SO_4 کا ایک ہی مرکب ہے جس کو سلفیورک ترشہ کہتے ہیں۔ C_2H_6O سالمی ضابطہ دو مرکبات کو ظاہر کرتا ہے، جن کے نام میتھائل الکوحل (C_2H_5OH) اور ڈائی میتھائل ایتھر (CH_3OCH_3) ہیں۔ لہذا ایک ہی سالمی ضابطہ کے دو یا زائد نامیاتی مرکبات ہو سکتے ہیں اور یہ ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔ ہم ترکیبی کی مختلف جماعتوں میں گروپ بندی کی جاتی ہے۔

7.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء کو حسب ذیل کے بارے میں جانکاری فراہم کی جائیگی۔

- ☆ ہم ترکیبی اور اس کی جماعت بندی۔
- ☆ ساختی اور مکانی ہم ترکیبی اور ان کے اقسام۔
- ☆ غیر تشاکل کاربن کا مفہوم۔
- ☆ ضد وضعی اور دو نمجی ہم ترکیبی۔
- ☆ میسوہم ترکیبی اور ان کی خصوصیات۔
- ☆ ہندسی ہم ترکیبوں کے تشکل E-Z تشکل۔

7.2 ہم ترکیبی، ہم ترکیبی کے اقسام اور مثالیں

ایسے مرکبات جن کے سالمی ضابطے ایک ہوں، لیکن ساختی ضابطے (Structural Formula) اور خصوصیات مختلف ہو، ہم ترکیبی کہلاتے ہیں۔ (یونانی میں حصے = Meros، مساوی = Iso) اس خاصیت کو ہم ترکیبی کہتے ہیں۔ ہم ترکیبوں میں ایک ہی نوعیت کے اور مساوی تعداد کے جوہر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے منسلک ہونا مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسیٹون اور پروپیونالڈ یہائیڈ کا سالمی ضابطہ (C₃H₆O) ایک ہی ہے، لیکن ان کے خواص مختلف ہوتے ہیں۔ ہم ترکیبوں کی خصوصیات میں فرق کا سبب ان کی مختلف ساختیں ہیں۔

ہم ترکیبی کے اقسام :- ساختی ہم ترکیبی (Structural Isomerism) اور تجسیمی ہم ترکیبی (Stereo Isomerism)

ہم ترکیبی کے دو اہم اقسام ہیں۔

- 1- ساختی ہم ترکیبی
- 2- تجسیمی ہم ترکیبی۔
- I- ساختی ہم ترکیبی

ایسے مرکبات جن کے سالمی ضابطے ایک ہوں اور سالمی ساخت مختلف ہوں، ساختی ہم ترکیبی کہلاتے ہیں ان میں بندشی جوہروں کی ترکیب مختلف ہوتی ہے۔

ساختی ہم ترکیبی کی مزید قسمیں حسب ذیل ہیں۔

- 1- زنجیری ہم ترکیبی (Chain Isomerism)
- 2- وضعی یا مقامی ہم ترکیبی (Position Isomerism)

3- فعلی ہم ترکیبی (Functional Isomerism)

4- حرکی ہم ترکیبی (Tautomerism)

II- تجسیمی ہم ترکیبی

ایسے مرکبات جن کے سالمی ضابطے ایک ہوں اور گروپ یا جوہروں کی فضائی تشریق (Orientation) اور ساختیں، خصوصیات مختلف ہوں، مکانی یا تجسیمی ہم ترکیبی کہلاتے ہیں۔ مشابہ متعلقہ جوہر آپس میں بند بناتے ہیں۔ لیکن ان کا اضافی فضائی مقام (Relative Spatial Position) مختلف ہوتا ہے۔

مکانی ہم ترکیبی کی مزید تقسیم ذیل میں بتائی گئی ہیں۔

1- ہندسی یا ہم رُو۔ ضد رُو ہم ترکیبی (Cis-trans or Geometrical Isomerism)

2- مناظری ہم ترکیبی (Optical Isomerism)

3- ہم شکل ہم ترکیبی (Conformational Isomerism)


4- تشکلی ہم ترکیبی (Configurational Isomerism)

ساختی ہم ترکیبی اور مکانی ہم ترکیبی کے اقسام


I- ساختی ہم ترکیبی: جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ساختی ہم ترکیبوں کی سالمی ساختیں مختلف ہوتی ہیں۔ ساختی ہم ترکیبوں کے اقسام کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

1- زنجیری ہم ترکیبی

ایسے مرکبات جن میں کاربن ڈھانچے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، زنجیری ہم ترکیبی کہلاتے ہیں مثلاً n۔ بیوٹین اور آئیسو بیوٹین کا سالمی ضابطہ C_4H_{10} ہے لیکن ان دو مرکبات میں کاربن کے جوہروں کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہم ترکیبی میں کاربن کے چار جوہر سیدھی زنجیر میں ہوتے ہیں اور دوسرے میں کاربن زنجیر شاخدار ہوتی ہے۔ مثال - 1 سالمی ضابطہ C_4H_{10}



مثال - 2 سالمی ضابطہ C_5H_{12}




کاربن کے جوہروں کی تعداد کے اضافے سے زنجیری ہم ترکیبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

2- مقامی ہم ترکیبی


ایسے مرکبات جن میں علامتی جوہر یا فعلی گروپ کا مقام مختلف ہوں، مقامی ہم ترکیبی کہلاتے ہیں اور یہ خاصیت مقامی ہم ترکیبی کہلاتی ہے۔

مثلاً مونو کلورو پروپین (C_3H_7Cl) کے دو ہم ترکیبی ہوتے ہیں۔ ان میں تین کاربن جوہروں کی زنجیر ہوتی ہے۔ ایک میں کلورین جوہر سرے کی کاربن (Terminal Carbon) یا پہلے کاربن سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرے ہم ترکیبی میں درمیانی کاربن سے جڑا ہوتا ہے۔ ان دو ہم ترکیبوں میں کلورین جوہر کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو (1)۔ کلورو پروپین اور (2)۔ کلورو پروپین کہتے ہیں۔

مثال-1



مثال-3 کلورو پینٹین ($C_5H_{11}Cl$) (Chloropentane)



3- فعلی ہم ترکیبی

ایسے مرکبات جن میں فعلی گروپ مختلف ہوں فعلی ہم ترکیبی کہلاتے ہیں۔ مثلاً ایٹھائیل الکوحل اور ڈائی میتھائیل دونوں کا ضابطہ C_2H_6O ہے۔ الکوحل کا فعلی گروپ ($-OH$) اور ڈائی میتھائیل ایٹھر کا فعلی گروپ ($-O-$) ہے۔

مثال-1 سالمی ضابطہ (C_2H_6O):





مثال-2 سالمی ضابطہ C_3H_6O کے فعلی ہم ترکیبی۔



4- حرکی ترکیبی

اس قسم کی ہم ترکیبی میں ہم ترکیبی توازن میں ہوتے ہیں۔

مثلاً وینائل الکو حل اور ایٹالڈ یہائیڈ حالت توازن میں ہوتے ہیں۔ وینائل الکو حل میں $C=C$ (ene) اور الکو حل گروپ ہوتے ہیں جب کہ ایٹیلڈ یہائیڈ میں کیٹون گروپ ہوتا ہے اس لیے اس کو (Keto-enol Tautomerism) کیٹو-ینول حرکی ترکیبی کہتے ہیں۔







وینائل الکو حل
II- تجبیبی ہم ترکیبی

ان ہم ترکیبوں کے مرکبات کے سالمی ضابطے ایک ہوتے ہیں لیکن گروپ یا جوہروں کی فضائی تشریق مختلف ہوتی ہے۔ ان کی مختلف اقسام کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

1- ہندسی ہم ترکیبی یا ہم رو۔ ضد رو ہم ترکیبی $C=C$ مرکبات یعنی 1- لکین مرکبات اس ہم ترکیبی کا اظہار کرتے ہیں۔ $C=C$ بند پر دو مختلف گروپ موجود ہو تو ہم رو۔ ضد رو ہم ترکیبی حاصل ہوتے ہیں۔

مثلاً 2- بیوٹین (2-Butene) میں کاربن جوہر پر دو مختلف گروپس پائے جاتے ہیں ایک ہائیڈروجن جوہر اور دوسرا CH_3 ۔ گروپ $C=C$ کے کاربن جوہروں پر CH_3 ۔ گروپس ایک ہی جانب یا مخالف جانب ہو سکتے ہیں۔ اگر مشابہ گروپس ایک ہی جانب ہو تو اس کو ہم رو ترکیبی کہتے ہیں اور مشابہ گروپس یا جوہر مخالف جانب واقع ہو تو اس کو ضد رو ترکیبی کہتے ہیں۔




ان مرکبات میں ہائیڈروجن جوہر اور دوسرے گروپس کی فضائی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔

2- ہم شکل ہم ترکیبی

الکین میں C-C جوہر اکہرے بند سے جڑے ہوتے ہیں۔ اکہرے بند یا سنگما بند (-) میں بین مرکزائی محور پر الکٹرانس کی تشکلی تقسیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکہرے بند پر سالمہ کا آزادانہ 360° تک گھماؤ ممکن ہے۔ سالمات میں اکہرے بند پر آزادانہ حالت میں جوہروں کے گھومنے سے ایک خاص فضائی ترتیب حاصل ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس فضائی ترتیب سے حاصل ہونے والی ساختوں کو ہم شکل ہم ترکیبی ساختیں کہتے ہیں۔ الکین میں ہم شکل ہم ترکیبی کا اظہار ہوتا ہے۔

ایتھین کے ہم شکل ہم ترکیبی



3- تشکلی ہم ترکیبی


غیر تشکل کاربن جوہر کے اطراف چار مختلف جوہر یا گروپ کی فضائی ترتیب تشکل کہلاتی ہے غیر تشکل مرکبات جو دو یا زائد تشکل کا اظہار کرتے ہیں، تشکلی ہم ترکیبی کہلاتے ہیں۔ تشکلی ہم ترکیبی میں مناظری اور ہندی ترکیبی شامل ہیں۔

7.3 ہندی ہم ترکیبی اور ہندی ہم ترکیبوں کے E اور Z تشکل

آپ پہلے ہی مطالعہ کر چکے ہیں کہ ایسے مرکبات جن میں C=C پر جوہروں یا گروپس کی فضائی ترتیب مختلف ہوتی ہے 'ہندی ہم ترکیبی یا ہم رو-ضد رو' (Cis-Trans) ہم ترکیبی کہلاتے ہیں۔

اگر مشابہ جوہر یا گروپ ایک ہی جانب ہو تو اس کو ہم رو-ضد رو ترکیبہ (Cis-Trans) کہتے ہیں اور اگر مشابہ جوہر یا گروپ

مخالف جانب واقع ہو تو یہ ضد رو-ہم ترکیبہ (Cis-Trans) کہلاتا ہے۔ مثلاً: 2-Butene




ہندی ہم ترکیبوں کے E اور Z تشکل

اگر C=C پر مختلف جوہر یا گروپس جڑے ہوں تو ہم رو اور ضد رو ہم ترکیبوں میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے مرکبات کی E اور Z تسمیوں کی اساس پر درجہ بندی کی جاتی ہے۔


Ingold, Cahn اور Prologue کے دیے قانون کی رو سے ترجیح گروپ کا درجہ جوہری وزن کے لحاظ سے دیا جاتا ہے زیادہ جوہری وزن گروپ یا جوہر کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ترجیحی گروپس ایک ہی جانب واقع ہوں تو اس کو Z-ہم ترکیبہ کہتے ہیں (جرمن میں

Zusammen = Z کے معنی ایک ہی جانب) اگر ترجیح گروپس مخالف جانب ہوں 'تو اس کو E- ہم ترکیبہ کہتے ہیں (جرمن میں E = Entgegen کے معنی مخالف جانب)۔

مثال 1 ترجیحی گروپ $I > Br > Cl > F$




Z-Isomer




E- Isomer

مثال 2 ترجیحی گروپ $-C_3H_4 > -C_2H_3 > -CH_3 > -H$



Z- Isomer




E- Isomer

آکزانیمس کی جیومیٹرکال ہم ترکیبیت (Geometrical Isomerism in Oximes)


آکزانیمس (Oximes) ایسے مرکبات ہیں جن میں کاربن اور نائٹروجن کے درمیان دوہرا بند پایا جاتا ہے۔ آکزانیمس 'جیومیٹرکال آئیسومیرزم (Geometrical Isomerism) کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ $C=N$ بند کے اطراف گردش محدود ہوتی ہے اسلئے آکزانیمس دو مخصوص ہم ترکیبہ دیتے ہیں۔ جیومیٹرکال آئیسومیرزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسکے دو ممکنہ ہم ترکیبہ ہیں جنکو $Syn (Z)$ اور $Anti (E)$ کہتے ہیں۔

Aldoximes : Syn (Z) Isomer میں اگر H اور OH گروپس $C=N$ بند کے ایک ہی جانب ہو تو اسکو $Syn (Z)$ ہم ترکیبہ کہتے ہیں۔

Aldoximes : Anti (E) Isomer میں اگر H اور OH گروپس $C=N$ بند کے مخالف جانب ہو 'تو اسکو $Anti (E)$ ہم ترکیبہ کہتے ہیں۔



Syn (Cis) acetaldoxime



Anti (Trans) acetaldoxime

7.4 اکتسابی نتائج

- ☆ اس اکائی میں حسب ذیل کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔
- ☆ مرکبات جن کے سالمی ضابطے ایک ہوتے ہیں لیکن ساختی ضابطے اور خواص مختلف ہوتے ہیں، ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔ اس خاصیت کو ہم ترکیبی کہتے ہیں۔
- ☆ ہم ترکیبی کے دو اہم اقسام ہیں ساختی ہم ترکیبی اور مکانی ہم ترکیبی۔
- ☆ ساختی ہم ترکیبوں میں کاربن کی سیدھی زنجیر یا شاخدار زنجیر ہوتی ہے۔
- ☆ مکانی ہم ترکیبی میں غیر متناکل کاربن کے اطراف مختلف جوہروں یا گروپس کی فضائی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔
- ☆ ساختی ہم ترکیبوں میں زنجیری، مقامی، فعلی ہم ترکیبے شامل ہیں۔
- ☆ مکانی ہم ترکیبوں میں ہندسی، مناظری، ہم شکل ہم ترکیبے شامل ہیں۔
- ☆ ہندسی ہم ترکیبی $C=C$ (الکین) مرکبات میں پائی جاتی ہے۔ اگر $C=C$ کے کاربن جوہروں پر مشابہ جوہر یا گروپ ایک ہی جانب ہو تو اس کو ہم رو-ضد رو ترکیبہ (Cis-Trans) کہتے ہیں۔ اگر مشابہ جوہر یا گروپ مخالف جانب واقع ہو تو ضد رو ہم ترکیبہ (Cis-Trans) کہتے ہیں۔
- ☆ ہندسی ہم ترکیبوں کو E اور Z شکل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اگر $C=C$ کے جوہروں سے مختلف جوہر یا گروپ جڑے ہوں۔ ان میں ترجیحی گروپ اعلیٰ کمیتی عدد سے کم کمیتی عدد کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے۔
- ☆ مرکبات جن میں بعض حصے مشابہ اور دوسرے حصے ایک دوسرے کے آئینہ عکس ہوتے ہیں دو نجی مکانی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔

7.5 کلیدی الفاظ

- 1- زنجیریت : کاربن کی زنجیری یا حلقی مرکبات تیار کرنے کی خاصیت۔
- 2- مقامی ہم ترکیبی: ایسے مرکبات جن میں علامتی جوہر یا فعلی گروپ کا مقام مختلف ہوں، مقامی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں اور یہ خاصیت مقامی ہم ترکیبی کہلاتی ہے۔
- 3- فعلی ہم ترکیبی: ایسے مرکبات جن میں فعلی گروپ مختلف ہوں فعلی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔ مثلاً میتھائل الکوحل اور ڈائی میتھائل ایٹھر کا سالمی ضابطہ C_2H_6O ہے۔





7.6 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- CH_3OCH_3 اور $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ مرکبات کون سی ہم ترکیبی کو ظاہر کرتے ہیں؟
- 2- 1- کلورو پروپین اور 2- کلورو پروپین مرکبات میں کون سی ہم ترکیبی موجود ہے؟
- 4- $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ کے ممکنہ فعلی ہم ترکیبوں کی تشکل لکھیے؟
- 5- E, Z تشکل کو کون سے ہم ترکیبوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- ہم ترکیبی سے کیا مراد ہے؟ ساختی ہم ترکیبی کی تعریف کیجیے اور مثالیں لکھیے۔
- 2- غیر تشاکلیت سے کیا مراد ہے؟ تشکل کے عناصر بیان کیجیے۔
- 3- $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{Cl}$ سالمی ضابطہ والے مرکب کے ساختی ہم ترکیبے بنائیے۔
- 4- فعالی اور مقامی ہم ترکیبے کی مثال لکھیے۔
- 5- مندر ذیل سالمات کے لیے E اور Z ہم ترکیبوں کی تشکل کی وضاحت کیجیے۔



طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- ہم ترکیبی کی تعریف کیجیے۔ اس کی جماعت بندی کس طرح کی جاتی ہے؟ مثالیں دے کر تشریح کیجیے۔
- 2- جیومیٹرکل ہم ترکیبیت پر نوٹ لکھیے۔

اکائی - 8: مناظری ہم ترکیبی

(Unit-8: Optical Isomerism)

اکائی کے اجزا

8.0 تمہید

8.1 مقاصد

8.2 مناظری ہم ترکیبی میں استعمال ہونے والی اصطلاحات

8.3 ریسیمک آمیزہ

8.4 D & L شکل

8.5 R & S شکل

8.6 ریسیمک آمیزہ سے D اور L ہم ترکیبوں کو الگ کرنا۔

8.7 اکتسابی نتائج

8.8 کلیدی الفاظ

8.9 پرچہ نمونہ سوالات

8.0 تمہید

ایسے نامیاتی مرکبات جن کے سالمی ضابطے مساوی ہو لیکن ان کی ساختیں و خواص مختلف ہوں، ان مختلف ساختوں کو ہم ترکیبی کہتے ہیں۔ اور اس مظہر کو ہم ترکیبیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر، ہم ترکیبی کے دو اقسام ہیں۔ (i) ساخت ہم ترکیبی (Structural isomerism) اور (ii) مکانی ہم ترکیبی (Stereoisomerism)۔

ایسے ہم ترکیبے جن میں سالمات کے کیمیائی ضابطے یکساں لیکن ساختیں مختلف ہوں، ساختی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔ جبکہ، ایسے ہم ترکیبے جن میں جوہروں کی فضا میں اشتقاق (Orientation) مختلف ہوتا ہے، مکانی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔

مناظری ہم ترکیبی 'مکانی ہم ترکیبی کی ایک شاخ ہے۔ وہ مرکبات جو تقطیب شدہ نور کے ارتعاش کی سطح کو گھما سکتے ہیں، جب ان کے محلول سے اس نور کو گزارا جاتا ہے، مناظری ہم ترکیبے (Optical Isomers) کہلاتے ہیں اور اس مظہر کو مناظری ہم ترکیبی کہتے ہیں۔

مکانی ہم ترکیبی کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 1- ہندسی بندروہم ترکیبی اور 2- مناظری ہم ترکیبی۔ ہم اس اکٹی میں صرف مناظری ہم ترکیبی کا مطالعہ کریں گے۔

8.1 مقاصد

اس اکٹی کا مقصد طلباء کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی جائے۔

1. مناظری ہم ترکیبی کی تعریف، اور اس میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات کا علم حاصل کرنا۔

2. میز و مرکبات اور ریسیمک آمیزہ کی جانکاری۔

3. اینانشیومرس (Enantiomers) اور ڈایا اسٹییریومرس (Diastereoisomers) کی تعریف اور ان میں تقابل

4. مناظری عاملیت کا مطالعہ،

5. ریسیمک آمیزہ کی علیحدگی۔

6. مطلق تشکل کی تخمین اور نامیاتی مرکبات کے D & L, R & S تشکل کی جانکاری۔

8.2 مناظری ہم ترکیبی


مناظری ہم ترکیبی میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات

(a) مسطح تقطیب شدہ نور (Plane Polarized Light)

وہ روشنی (نور) جو ایک ہی سطح (Plane) میں گردش کرتی ہے، اس کو مسطح تقطیب شدہ نور (Plane Polarized Light) کہتے ہیں۔ اس کو ایک رنگ والی روشنی (Monochromatic light) بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی رنگ اور ایک ہی طول موج

(Wavelength) ہوتا ہے۔ اس نور کو، ایک عام روشنی (Ordinary Light) جس میں کئی طول موج ہوتے ہیں، کو ایک خاص کیلشیم

کاربونیٹ (CaCO_3) سے بنے پرزم (Prism)، جس کو نکول پرزم (Nicol prism) کہتے ہیں، سے گزرا جاتا ہے تو، یہ نور ایک ہی سطح میں گردش کرتی ہے، جس کو سطح تقطیب شدہ نور کہتے ہیں جیسا کہ شکل - 8.1 میں دیکھا جاسکتا ہے۔




شکل - 8.1: سطح تقطیب شدہ نور (Plane Polarized Light)

(b) مناظری عاملیت (Optical activity)

ایسے مرکبات جو سطح تقطیب شدہ نور کو گھمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان مرکبات کو مناظری عامل مرکبات (Optical Active Compound) کہتے ہیں۔ اور اس مظہر کو مناظری عاملیت (Optical Activity) کہتے ہیں۔

جب سطح تقطیب شدہ نور کو مناظری عامل مرکب کے محلول میں سے گزرا جاتا ہے، تو یہ سطح تقطیب شدہ نور کو دائیں یا بائیں جانب گھماتے ہیں۔ جو مرکبات سطح تقطیب شدہ نور کو دائیں جانب یعنی گھڑی کی سمت (Clockwise) میں گھماتے ہیں، وہ راست گردش (Dextrorotatory) کہلاتے ہیں۔ ان مرکبات کو $d/ (+)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مرکبات سطح تقطیب شدہ نور کو بائیں جانب یعنی گھڑی کی مخالف سمت (Anticlockwise) میں گھماتے ہیں، چپ گردش (Laevorotatory) کہتے ہیں۔ اور ان مرکبات کو $l/ (-)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل 8.2 ایسے مرکبات جو سطح تقطیب شدہ نور کو گھمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ مناظری غیر عامل مرکبات (Optically inactive Compounds) کہلاتے ہیں۔ وہ آلہ (Instrument) جو مناظری گردش (Optical rotation) کی پیمائش کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو تقطیب پیم (Polarimeter) کہتے ہیں۔ شکل 8.2- مناظری عاملیت کو بیان کرتا ہے۔



شکل-8.2: مناظری عاملیت (Optical activity)

(c) نوعی گردش (Specific Rotation)

مسطح تقطیب شدہ نور کے لیے گردش کا زاویہ (Angle of Rotation) صرف سالمہ کی فطرت پر منحصر نہیں کرتا ہے، بلکہ محلول کے ارتکاز، تقطیب پیمائی کی لمبائی، جس میں محلول کو تجربہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تپش، نور کی طول موج اور استعمال ہونے والے محلل کی فطرت پر منحصر کرتا ہے۔

کسی بھی مادہ کی مناظری عاملیت کو مخصوص گردش کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے جس کو $[\alpha]_D^{25}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مستقل عدد ہے اور ایک مخصوص مادہ کو ظاہر کرتا ہے۔

حسابی طور پر کو نوعی گردش (Specific Rotation) حسب ذیل ضابطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{c \times l}$$

جہاں، α گھماؤ کا زاویہ ڈگری میں، l ، تقطیب پیمائی کی لمبائی ڈیسی میٹر میں، c ، محلول کا ارتکاز (g/ml)، T ، مطلق تپش، λ ، نور کی طول موج

$$L = 1 \text{ Cm}, C = 1 \text{ g/ml}, \text{ جب ,}$$

$$\lambda = \alpha$$

تو ہم نوعی گردش (Specific rotation) کی تعریف اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔

"وہ گردش جو مرکب کے ایک گرام فی ملی لیٹر محلول سے حاصل کی گئی ہے، جب کہ تقطیب پیمائی کی لمبائی ایک ڈیسی میٹر ہو۔"


مثال کے طور پر۔ گنے کی شکر (Sugar Cane) کے لیے نوعی گردش کو اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔

$$[\alpha]_D^{20} = + 66.5^\circ (\text{Water})$$

(d) غیر متماثل کاربن جوہر (Asymmetric Carbon Atom)

وانٹ ہاف اور لے نیل (Vant Hoff and LeBel) نے نامیاتی مرکبات کی منظر کی عاملیت کے مظہر کو غیر متماثل کاربن کی موجودگی کی وجہ بتایا۔ ایک چو سطحی کاربن، جو چار مختلف گروپوں سے جڑا ہو، غیر متماثل کاربن کہلاتا ہے۔ (شکل-8.3 اور 8.4)

اس کاربن کو کائیرل کاربن (Chiral Carbon) یا اسٹیرو مرکز (Stereo Centre) بھی کہتے ہیں۔



شکل-8.3 اور 8.4 : غیر متماثل کاربن جوہر (Asymmetric Carbon Atom)

اصطلاح مناظر ہم ترکیبی کا استعمال ان مکانی ہم ترکیبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کا برتاؤ مسطح تقطیب شدہ نور کی طرف مختلف ہوتا ہے۔ ان مکانی ہم ترکیبیوں کو اینانشیومرس کہتے ہیں۔ اینانشیومرس ہمیشہ غیر برنہاد (Non-Super Imposable) ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے آئینہ عکس (Mirror image) ہوں۔ اس طرح سے ہم یہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ منظر کی ہم ترکیبی کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ کسی بھی نامیاتی مرکب میں کم سے کم ایک غیر متماثل کاربن موجود ہونا چاہیے۔

(e) کائیرلیٹی اور غیر متماثل (Chirality and Dissymmetry)

وہ تمام چیزیں جو ایک دوسرے کے آئینہ عکس اور Non-Super Imposable ہوں، ان کو کائیرل چیزیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔ جوتا، ہاتھ کے دستانے، ہاتھ کا جوڑا اور انگریزی کے کچھ حروف جیسے P, F, Z وغیرہ۔ اس کے برعکس، وہ تمام چیزیں، جو برنہاد اور ایک دوسرے کے آئینہ عکس نہ ہوں، ان تمام چیزوں کو Achiral کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔ گیند، گولا، اور انگریزی کے

چند حرف جیسے A, Y, O, M Achiral سالمہ میں Plane of Symmetry پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی سالمہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (شکل 8.5)۔ جبکہ، Chiral سالمہ میں Plane of Symmetry موجود نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی سالمہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (شکل 8.6)




شکل 8.5: کائیرالیٹی (Chirality)




شکل 8.6: کائیرالیٹی اور غیر متشکل (Chirality and Dissymmetry)

چند کائیرال نامیاتی مرکبات جن میں صرف ایک ہی کائیرال کاربن موجود ہے، کی مثالیں شکل 8.7 میں دیکھی جاسکتی ہیں، جبکہ شکل 8.8 ایک ایسے سالمہ کی ہے جس میں دو کائیرال کاربن موجود ہے۔



شکل 8.7: چند کائیرال نامیاتی مرکبات کی مثالیں



شکل-8.8: کائیرال نامیاتی مرکب Trtaric Acid

اینانشیومرس (Enantiomers) کے خواص

ان کے طبعی خواص ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن سطح تقطیب شدہ نور کی گردش کی سمت میں فرق رکھتے ہیں۔ یعنی دو اینانشیومرس سطح تقطیب شدہ نور کو مختلف سمت میں گھماتے ہیں جبکہ گردش کی حدود یکساں ہوتی ہے۔

- ان کے کیمیائی خواص ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن نظریاتی عامل 'متعامل کی جانب ان کی عاملیت الگ ہوتی ہے۔
- "جب دو اینانشیومرس کو مساوی مقدار میں ایک ساتھ ملایا جاتا ہے، تو مناظری غیر عامل ریسیمک آمیزہ (Racemic Mixture) حاصل ہوتا ہے، جس کو $\pm$ / dl سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- "حیاتیاتی نظام میں، -L گلوکوز کا جو نورس کے ذریعہ Metabolism نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی خمیر کے ذریعہ Ferment ہوتا ہے، جبکہ D گلوکوز ان دونوں عمل کو انجام دیتا ہے اور اس لیے جانورس کی Metabolism اور خمیر کے Fermentation میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ڈایا اسٹیریومرس (Diastereoisomers) کے خواص


- دیے گئے محل میں ان کے طبعی خصوصیات جیسے نقطہ جوش، نقطہ اجماعت، کثافت، نوعی گردش، حل پذیری وغیرہ مختلف ہوتے ہیں۔
- ان کے کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتے ہیں، لیکن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔

8.3 ریسیمک آمیزہ (Racemic Mixture)

وہ آمیزہ جس میں d (+) اور l (-) شکل یعنی اینٹیو مرس کی ایک ہی نسبت 1:1 میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ آمیزہ غیر عامل ہوتا ہے، یعنی اس میں سطح تقطیب شدہ نور کو گھمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ d ایسومر کی مناظیری عالمیت، l ایسومر کی مساوی تعداد کی گردش صلاحیت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔

میزو مرکبات (Meso compounds)

میزو مرکبات غیر کائیرال (Achiral) مرکبات ہیں جبکہ ان میں کائیرال مرکز (Chiral centre) موجود ہوتا ہے۔ ان میں دونوں ایسومر ایک دوسرے کے Super imposable ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اندرون توازن (Internal Compensation) کی وجہ سے Plane of symmetry پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ٹائرک ترشہ کے دو ممکن ایسومر یعنی D اور L ہیں۔ یہ دونوں ایسومر آئینہ میں ایک دوسرے کے Non-super imposable ہوتے ہیں، جبکہ تیسری شکل میزو کی مثال ہے جیسا کہ شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (شکل-8.9)





شکل-8.9: میزو مرکبات (Meso compounds)

ریسی مائیزیشن (Racemization)

ایسا عمل جس میں کہ ایک Optically Active Compound یعنی d یا l شکل کو ریسیمک آمیزہ جو کہ Optically Inactive ہوتا ہے، میں تبدیل کیا جاتا ہے، ریسی مائیزیشن کہلاتا ہے۔ ریسی مائیزیشن کا عمل کثافت، تپش، pH وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے۔

والڈن انورژن (Walden Inversion)

اس عمل کے بارے میں پال والڈن نام کے سائنسدان نے پہلی بار مشاہدہ کیا تھا، اس عمل میں سالمہ کی ساخت ایسے الٹی ہے جیسے اڑتی ہو ایسی چھتری۔ اس عمل کی تعریف اس طرح سے بیان کی جاسکتی ہے۔ "ایسا کیمیائی عمل جس میں کسی سالمہ کے چارل مرکز یعنی ایسا مرکز جہاں چار مختلف گروپس جڑے ہوں" کی ساخت الٹ جاتی ہے، یعنی اس کی Stereochemical Configuration تبدیل ہو جاتی ہے۔" مثال کے طور پر۔ Bimolecular Nucleophilic Substitution (SN²)، میں یہ عمل دیکھا جاسکتا ہے۔ اس عمل میں الیکٹران پسند گروپ سالمہ میں پچھلی جانب سے حملہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں جو نیا مرکب بنتا ہے اس کا چارل مرکز اصل سالمہ کے برعکس ہوتا ہے یعنی ایک اینانشیو مرس، دوسرے اینانشیو مرس میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسا کہ شکل 8.10 میں دیکھا جاسکتا ہے۔



شکل 8.10 : والڈن انورژن (Walden Inversion)

غیر متناسب ترکیب (Asymmetric Synthesis)


- غیر متناسب ترکیب ایک ایسا کیمیائی عمل ہے جس میں ایک غیر کائیرال (Achiral) سالمہ کو ایک مادے میں اس طرح کائیرال (Chiral) اکائی میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ اسٹیریو آئزومرز (Enantiomers یا Diastereomers) کی غیر مساوی مقداریں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر۔ پائیرویک ترشہ (Pyruvic Acid) نکل تماس کی موجودگی میں تحویل کر کے لیکٹیک ایسڈ کا آمیزہ (-) (+) بناتا ہے۔

- جب ایک مرکب، جس میں ایک غیر متناسب کاربن (Chiral) موجود ہو، عام تجربہ گاہی طریقوں سے ایک غیر کائیرال مرکب سے تیار کیا جاتا ہے، تو حاصل شدہ مرکب ایک ریسیمک آمیزہ ہوتا ہے۔



- اگر ایسا رد عمل کسی چارل اثر کے تحت انجام دیا جائے، تو صرف ایک نوری فعال (Optically active) آئزومر دوسرے پر فوقیت رکھتے ہوئے بنتا ہے۔


8.4 D اور L شکل

یہ نظام تسمیہ کا ئیرال مرکبات کا Absolute configuration کو بیان کرتا ہے۔ یہ نظام تسمیہ خاص کر امینو ایسڈس، شکر کے تشکلوں کو معلوم کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نظام تسمیہ میں گلسرلڈیہاڈ کو ایک معاری مرکب مانا جاتا ہے۔ اس کی نسبت میں کسی بھی امینو ایسڈس اور شکر کا تشکل طے کرتے ہیں۔ چونکہ گلسرلڈیہاڈ دو حالت میں پایا جاتا ہے، ایک کو D (+) Glyceraldehyde اور دوسرے کو L (-) Glyceraldehyde کہتے ہیں جیسا کہ شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (شکل 8.11)



L (-)- Glyceraldehyde D (+)- Glyceraldehyde





شکل - 8.11 : D اور L تشکل

جب امینو ایسڈ کا NH_2 -گروپ ، Glyceraldehydes کے OH -کی جانب موجود ہوتا ہے، تو اس امینو ایسڈ کا تشکل وہی ہوگا، جو گلسرلڈیہائیڈ کا۔ اس کے برعکس جب شکر کا OH گروپ Glyceraldehyde کے OH -کی جانب موجود ہوتا ہے، تو اس کا تشکل وہی ہوگا جو گلسرلڈیہائیڈ کا۔ یعنی - / یا + D / L-مثال کے طور پر۔


8.5 R اور S تشکل یا نظام تسمیہ

یہ نظام تسمیہ صرف ان سالمات کے لیے ممکن ہے جن کے پاس کم سے کم ایک کائیرال کاربن جو ہر موجود ہو یعنی اس کاربن سے چار مختلف گروپ جڑے ہوں۔ اس نظام تسمیہ میں Sequence کلیہ یا (CIP (Caughn Ingold & Prelog کے مطابق سالمہ کے تشکل کا تعین کیا جاتا ہے۔ Sequence کلیہ کے مختلف مرحلے مندرجہ ذیل ہیں۔

- پہلا مرحلہ
- اگر کائیرال کاربن سے چار مختلف گروپ براہ راست منسلک ہوں، تو سب سے پہلے ان کی ترجیح Sequence کلیہ کے مطابق ہوگی۔
- دوسرا مرحلہ


- اگر کائیرال کاربن جوہر کے اطراف چاروں گروپ مختلف ہیں تو، ان کی جوہری عدد (Atomic number) کی بنا پر ترجیح (Priority) مقرر کریں گے۔ یعنی جس عنصر کا جوہری عدد زیادہ ہوتا ہے، اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے یعنی Priority بلند ہوتی ہے۔ ان ترجیح کو 1, 2, 3 & 4 سے ظاہر کرتے ہیں۔ عدد 1 پ بلند ترجیح اور 4 کم ترجیح کو ظاہر کرتا ہے۔۔ مثال کے طور پر۔ مرکب , Bromochlorofluoromethane میں ترجیح کا گھٹتا سلسلہ (شکل-8.12)

Br > Cl > F > H (Decreasing order of priority)



شکل-8.12 : R اور S تشکل یا نظام تسمیہ


- اگر کائیرال کاربن جوہر کے اطراف چاروں گروپ میں سے دو گروپ ایک ہی عنصر کے ہجا (Isotope) ہیں، تو ان کی ترجیح کمیت عدد (Mass number) کی بنا پر کی جاتی ہے، یعنی جس کا Mass Number زیادہ ہوگا، اس کی ترجیح زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر۔ α [CH₃ CH - Deuterio ethyl bromide (D) Br] میں، ترجیح کا گھٹتا سلسلہ Br > CH₃ > D > H (شکل-8.13)



شکل-8.13 : α [CH₃ CH - Deuterio ethyl bromide (D) Br]


- اگر کائیرال کاربن جوہر سے دو گروپ کا پہلا جوہر یکساں ہو تو، ہر ایک گروپ کے دو سے جوہر کی بنا پر ترجیح مقرر کریں گے۔ مثال کے طور پر 2- Butanol میں، دو یکساں گروپ میں، کاربن اپنے آپ میں ہے۔ جیسے CH₃، CH₂، CH₃، تو اس حالت میں دوسرے عنصر کی مد سے مندرجہ ذیل طریقہ سے ترجیح مقرر کریں گے۔ (شکل-8.14)

CHHH (2) CHH, C (1) HHH




شکل - 8.14 : Butanol-2

- ایک اور مثال کی مدد سے اس بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ 1-Chloro-2-ChloroMethyl-3-methylbutane میں CH_2Cl کی ترجیح $(\text{Cl}, \text{H}, \text{H})$ کی ترجیح $(\text{CH}_3\text{CH}-\text{CH}_3\text{C}, \text{C}, \text{H})$ کے مقابلہ زیادہ ہوگی کیونکہ Cl کا جوہری عدد کاربن سے زیادہ ہے۔ (شکل - 8.15)




شکل - 8.15 : 1,2-Dichloro-3-methylbutane

- اگر کسی سالمہ میں دوہرہ یا تہرہ بند ہو تو، دونوں گروپ Duplet یا Triplet کی طرح برتاؤ کریں گے۔ یعنی دوہرہ بند دو یک بند کے مساوی اور تہرہ بند تین یک بند کے مساوی ہو گا جیسا کہ نیچے دیکھا جاسکتا ہے۔ (شکل - 8.16)




شکل - 8.16

مثال کے طور پر۔ Glyceraldehyde میں، -OH کی ترجیح، بقیہ سبھی گروپ سے زیادہ ہے۔ اس طرح ترجیح کا سلسلہ $\text{OH} (1) > \text{CHO} (2) > \text{CH}_2\text{OH} (3) > \text{H} (4)$ (شکل - 8.17)



شکل - 8.17: Glyceraldehyde

عام طور پر، مختلف گروپ کا ترجیح کا گھٹنا ہوا سلسلہ اس طرح ہے۔



دوسرا مرحلہ


کائیرال کاربن سے منسلک چاروں مختلف گروپ کی ترجیح مقرر کرنے بعد، سالمہ کو اس طرح سے گھماتا کہ سب سے کم ترجیح والا گروپ دیکھنے والے یا آنکھ سے دور ہو جبکہ باقی اپنی جگہ پر وہیں رہیں یعنی ان کی ترجیح کا سلسلہ اس طرح ہو 1,2,3۔ اگر اب آنکھ گھڑی کی سمت میں گھومتی ہے تو، اس سالمہ کی شکل کو R اور اگر آنکھ گھڑی کی غیر سمت میں گھومتی ہے تو، اس شکل کو S۔ یہاں R اور S کے معنی لیٹن زبان میں ریکٹس یعنی دائیں اور سینیسٹر یعنی بائیں کے ہیں۔

ایک کائیرال کاربن والے سالمہ کے فیئر پروجیکشن (Fisher Projection) میں R اور S کی نشاندہی۔

پہلا مرحلہ۔ کائیرال کاربن سے منسلک مختلف چاروں گروپ کی ترجیح مقرر کرنا۔


دوسرا مرحلہ۔ سب سے کم ترجیح والے گروپ جیسے H جوہر کو عمودی طور (Vertically) پر نیچے یا اوپر کی جانب اور دیکھنے والے سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سالمہ ترجیح کی نسبت سے گھمائیں اور سالمہ کی R اور S نشاندہ مندرجہ مرحلوں کی مدد سے کریں۔

- اگر سب سے کم ترجیح کا گروپ عمودی لائن (Vertical line) پر نیچے (Lower) کی جانب ہے، تو آنکھ کو زیادہ ترجیح سے کم ترجیح کی جانب گھومائیں۔ مثال کے طور پر۔ (شکل. 8.18)




شکل - 8.18

- اگر سب سے کم ترجیح کا گروپ عمودی لائن (Vertical line) پر اوپر (Upper) کی جانب ہے، تو اس حالت میں سب سے پہلے سالمہ کو 180° پر گھوماؤ جس سے بس سے کم ترجیح والا گروپ نیچے کی جانب آجائے۔ پھر سالمہ کو زیادہ ترجیح سے کم ترجیح کی جانب گھومائیں۔ مثال کے طور پر۔ (شکل. 8.19)



شکل - 8.19


- اگر سب سے کم ترجیح کا گروپ افقی لائن (Horizontal line) کے بائیں جانب ہوں، تو اس حالت میں عمودی لائن کے اوپر موجود گروپ کو بننا تبدیل کیے، بقیہ گروپ کو گھڑی کی غیر سمت (Anti-Clockwise) میں اس طرح سے گھوماؤ کی سب سے کم ترجیح کا گروپ عمودی لائن پر نیچے کی جانب آجائے۔ پھر سالمہ کو زیادہ ترجیح سے کم ترجیح کی جانب گھومائیں۔ مثال کے طور پر۔ (شکل - 8.20)



شکل - 8.20

- اگر سب سے کم ترجیح کا گروپ افقی لائن (Horizontal line) کے دائیں جانب ہوں، تو اس حالت میں عمودی لائن کے اُپر موجود گروپ کو بتدیل کیے، بقیہ گروپ کو گھڑی کی سمت (clockwise) میں اس طرح سے گھوماؤ کہ سب سے کم ترجیح کا گروپ عمودی لائن پر نیچے کی جانب آجائے۔ پھر سالمہ کو زیادہ ترجیح سے کم ترجیح کی جانب گھومائیں۔ مثال کے طور پر۔ (شکل۔


(8.21)




شکل - 8.21

دو کائیرل کاربن والے سالمہ کے فیئر پروجیکشن میں R اور S کی نشاندہی


ان سالمات میں R اور S نشانہ اس طرح سے کریں گے جیسی کہ ایک کائیرل کاربن والے سالمات میں کی گئی۔ مندرجہ ذیل مثال سے ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ (شکل - 8.22)



For Chiral carbon 2



For Chiral carbon 3



شکل - 8.22

8.6 Racemic آمیزہ سے D & L کو الگ کرنا

کسی بھی رسیمک آمیزہ (Racemic Mixture) کو ان کے انفرادی D اور L, اینانشیومرس میں علیحدہ کرنے کا عمل Resolution کہلاتا ہے۔

Resolution کا یہ عمل اینانشیومرس کو علیحدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے طبعی خواص ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ Rotation of Plane Polarized Light کو مخالف سمت میں Rotate کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انکو علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔

علیحیدگی کے طریقے (Methods for Resolution)

اینانشیومرس کو عام طور پر حسب ذیل طریقوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔


1- کیمیائی علیحیدگی (Chemical Resolution)

- اس طریقہ میں اینانشیومرس کو کیمیائی طور پر انکے ڈایا اسٹیریومرس کے آمیزہ میں Optically Pure Chiral Resolving Agent یا Another Enantiomerically Pure Compound کے ساتھ تعامل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

- جیسا کہ ڈایا اسٹیریومرس مختلف طبعی خصوصیات مثلاً حل پذیری اور نقطہ اعماد رکھتے ہیں اسلئے انکو علیحدہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس طرح انکو الگ کر کے پھر سے کیمیائی تعامل کے ذریعہ خالص اینانشیومرس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل Crystallization


Chromatography or کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اینانیشیومرس کو D اور L اینانیشیومرس کی

Resolution of D,L-2-Butanol: مثلاً: صورت میں حاصل کیا جاتا ہے۔



2- حیاتیاتی کیمیائی/خامرے کے ذریعہ علیحدگی (Biochemical/Enzymatic Separation)

خامرے بعض اوقات اینانیشیومرس کو آسانی سے Differentiate کرتے ہیں۔ اور D & L اینانیشیومرس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ علیحدگی کا یہ طریقہ بہت ہی مخصوص اور موثر ہے۔



8.7 اکتسابی نتائج

اس اکائی کے مطالعہ کرنے کے بعد طلباء مندرجہ ذیل کی اہم جانکاری حاصل کرلی۔

مناظری ہم ترکیبی کی اہم اصطلاحات، کائیرال کاربن اور غیر متشکال کاربن جوہر، اینانشیومرس اور ڈایا اسٹیرومرس -

8.8 کلیدی الفاظ

غیر متشکل کاربن جوہر:	وہ کاربن جو چار مختلف گروپ سے شریک گرفت بند بنائے۔
کائیرال سالمات:	وہ تمام چیزیں جو غیر برنہاد (Non-super imposable) اور ایک دوسرے کے آئینہ عکس (Mirror image) ہوں۔
غیر کائیرال سالمات:	وہ تمام چیزیں جو برنہاد (super imposable) اور ایک دوسرے کے آئینہ عکس (Mirror image) نہیں ہوں۔
مسطح تقطیب شدہ نور:	وہ روشنی (نور) جو ایک ہی سطح (Plane) میں گردش کرتی ہے۔
نوعی گردش:	وہ گردش جو مرکب کے ایک گرام فی ملی لیٹر محلول سے حاصل کی گئی ہے جب کہ تقطیب پیمانی کی لمبائی ایک ڈیسی میٹر ہو۔
تقطیب پیمانی:	اس نئی کا استعمال مناظری گردش (Optical Rotation) کی پیمائش کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

8.9 نمونہ پرچہ سوالات

معروضی سوالات

- i. غیر متشکل کاربن کی تعریف لکھیے۔
- ii. سطح تقطیب شدہ نور کی تعریف لکھیے۔
- iii. کائیرال کاربن کی تعریف لکھیے۔
- iv. ایک ایسے سالمہ کا نام لکھیے جس میں کائیرال کاربن موجود ہو۔
- v. مناظری گردش (Optical Rotation) کی پیمائش کرنے میں استعمال ہونے والے آلہ کا نام لکھیے۔
- vi. میز و مرکب کی ایک مثال لکھیے۔

.vii Racemization کی تعریف لکھیے۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

1. مناظری عاملیت پر نوٹ لکھیے۔
2. مسطح تقطیب شدہ نور کی تعریف لکھیے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے خاکہ بنا کر بیان کیجیے۔
3. کائیرال اور غیر کائیرال سالمات میں فرق مع مثالوں کے کیجیے۔
4. میزومرکبات کی تعریف مع مثال کے کیجیے۔

تفصیلی جوابات کے حامل سوالات

1. مندرجہ ذیل کی تعریف لکھیے۔
غیر متشکل کاربن جوہر، کائیرال سالمات، غیر کائیرال سالمات، مسطح تقطیب شدہ نور، نوعی گردش۔
2. ڈایا اسٹیریومرس کی تعریف مع مثال کے لکھیے اور ان کی خصوصیات بھی بیان کیجیے۔
3. اینانشیومرس کی تعریف مع مثال کے لکھیے اور ان کی خصوصیات بھی بیان کیجیے۔

اکائی - 9: الکینس

(Unit-9: Alkanes)

اکائی کے اجزا

- 9.0 تمہید
- 9.1 مقاصد
- 9.2 الکین کا نظام تسمیہ
- 9.3 الکین کی تیاری کے طریقے
 - 9.3.1 ہائیڈروجن تھامی عمل
 - 9.3.2 وٹنر تعامل
 - 9.3.3 کولب کی برق پاشیدگی
 - 9.3.4 گرگنارڈ تعامل
 - 9.3.5 کلیمینسن تحویل
- 9.4 الکین کے طبعی خواص
- 9.5 الکین کے کیمیائی خواص
 - 9.5.1 الکین کی لونجن اندازی
 - 9.5.2 لونجن اندازی کی میکینیت
 - 9.5.3 الکین کا نائٹراٹا
 - 9.5.4 الکین کا سلفو جٹانا
- 9.6 اکتسابی نتائج

9.7 کلیدی الفاظ

9.8 نمونہ امتحانی سوالات

9.0 تمہید

ہائیڈروکاربنس وہ نامیاتی مرکبات ہیں جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن کے جوہر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہائیڈروکاربنس قدرتی طور پر پائے جانے والے نامیاتی مرکبات ہیں جو خام تیل (Crude oil)، قدرتی گیس (Natural Gas)، کوئلے (Coal) اور کئی توانائی حاصل کرنے والی اشیاء کے بنیادی آمیزے ہوتے ہیں۔ ہائیڈروکاربنس انتہائی آتش گیر (Highly Combustible) مرکبات ہیں جو جل جانے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہائیڈروکاربنس ایندھن (Fuel) کا اہم ذریعہ ہیں۔ ہائیڈروکاربنس جیسے پروپین (Propane) اور بیوٹین (Butane) کو روزمرہ کی زندگی میں LPG (Liquefied Petroleum Gas) کی شکل میں ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

الکین (Alkanes) سیر شدہ ہائیڈروکاربنس ہیں جس میں کاربن کاربن اکہر ابند پایا جاتا۔ ان کا عام ضابطہ C_nH_{2n+2} ہوتا ہے۔ جہاں n سے مراد الکین میں موجود کاربن کی تعداد سے ہے۔ الکین تمام نامیاتی مرکبات میں سادہ ممبرس ہے۔ یہ غیر قطبی اور پانی میں ناعمل پذیر ہوتے ہیں۔ ہم اس اکائی میں الکین کی ساخت، اس کی تیاری، طبعی خواص اور کیمیائی خواص کے بارے میں مزید مطالعہ کریں گے۔

الکینس وہ سادہ ترین نامیاتی مرکبات ہیں جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کر بنتے ہیں۔ ان میں کاربن-کاربن (C-C) اور کاربن یا ہائیڈروجن اکہرے بند سے جڑے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے الکین سیر شدہ مرکبات (Saturated Compounds) ہوتے ہیں۔ یہ مرکبات عام حالات میں غیر متعادل ہوتے ہیں یعنی زیادہ تر تھامی عامل کی غیر موجودگی میں تعامل نہیں کرتے، اسی لیے ان کو پیرافن (Paraffin's) بھی کہا جاتا ہے۔ جو لاطینی زبان میں کم رغبت (Raght - affins کم Para) رکھنے والے مرکبات بھی کہا جاتا ہے۔ الکینس کا عام ضابطہ C_nH_{2n+2} ہے جہاں پر 'n' کاربن کے جوہروں کی تعداد سے مراد ہے۔ الکین کی ساخت کی بنیاد پر انہیں تین ذیلی گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو (a) سیدھی زنجیر والے مرکبات (b) شاخدار زنجیر والے مرکبات (Linear/ Straight Chain) اور حلقی یا سانگولکین (Cycloalkane)۔

9.1 مقاصد

اس اکائی میں ہائیڈروکاربنس کے سیر شدہ مرکبات خاص کر الکینس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے الکینس کی تیاری کے طریقے اور ان کی طبعی خواص، کیمیائی خواص اور ان میں لونجن اندازی کی میکینیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔

9.2 الکین کا نظام تسمیہ (Nomenclature of Alkanes)

ہائیڈروکاربن الکین کا لاحقہ ”ane“ ہے۔ الکین کے ابتدائی چار ارکان کے عام نام (Trivial Name)، کاربن کی تعداد 1,2,3 اور 4 کی مناسبت سے بالترتیب میتھین (Methane)، ایتھین (Ethane)، پروپین (Propane) اور بیوٹین (Butane) کہلاتے ہیں۔ ان مرکبات کو ہائیڈروکاربن کے قدرتی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔

الکین کے اعلیٰ ارکان کے نام لاطینی عددی لفظوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں جو کہ ایک سالمہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح پنٹا (5)، ہکزا (6)، ہیپٹا (7)، آکٹا (8)، نونا (9)، ڈیکا (10) سابقوں کو رکھ کر الکین کے نام لکھے جاتے ہیں۔

الکین سے ایک ہائیڈروجن (H) جوہر نکلنے سے حاصل ہونے والا گروپ الکائیل گروپ (Alkyl Group) کہلاتا ہے۔ الکائیل گروپس کے نام الکین کے لاحقہ ”ane“ کو ”yl“ سے تبدیل کر کے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھین (CH_4) سے میتھائیل گروپ (CH_3)، ایتھین (C_2H_6) سے ایتھائیل گروپ (C_2H_5) وغیرہ۔ (جدول - 9.1)

جدول - 9.1

Name of the Alkane Group	Formula of Alkane Group ($\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$)	Name of the Alkyl Group	Formula of Alkyl Group ($\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$)
Methane	CH_4	Methyl	$-\text{CH}_3$
Ethane	C_2H_6	Ethyl	$-\text{C}_2\text{H}_5$
Propane	C_3H_8	Propyl	$-\text{C}_3\text{H}_7$
Butane	C_4H_{10}	Butyl	$-\text{C}_4\text{H}_9$
Pentane	C_5H_{12}	Pentyl	$-\text{C}_5\text{H}_{11}$
Hexane	C_6H_{14}	Hexyl	$-\text{C}_6\text{H}_{13}$

Heptane	C_7H_{16}	Heptyl	$-C_7H_{15}$
Octane	C_8H_{18}	Octyl	$-C_8H_{17}$
Nonane	C_9H_{20}	Nonyl	$-C_9H_{19}$
Decane	$C_{10}H_{22}$	Decyl	$-C_{10}H_{21}$

9.3 الکینس کی تیاری کے طریقے (Methods of Preparation of Alkanes)





الکینس کو عام طور پر پٹرولیم (Petroleum) اور قدرتی گیس (Natural Gas) جیسے بنیادی ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ابتدائی الکینس جیسے ایتھین (Ethane) سے لے کر پینٹین (Pentane) تک کے مرکبات کو پٹرولیم اور قدرتی گیس کے Fractional Distillation کے طریقہ عمل کو استعمال میں لاتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن پینٹین (Pentane) اور اس سے زیادہ کاربن کی زنجیر رکھنے والے الکینس جو کئی ہم ترکیبیہ (Isomers) کی شکل میں موجود رہتے ہیں اور ان کے نقطہ جوش میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اس سے انہیں علیحدہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے خالص مرکبات (Pure Compounds) کو حاصل کرنے کے لیے انہیں تجربہ گاہ میں مندرجہ ذیل طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

9.3.1 ہائیڈروجن تماسی عمل (Catalytic Hydrogenation) کے ذریعہ

ناسیر شدہ ہائیڈروکاربنس جیسے الکپن اور الکائین میں ڈائی ہائیڈروجن گیس کے اضافی کے عمل کو ہائیڈروجن اندازی (Hydrogenation) کہتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے ناسیر شدہ ہائیڈروکاربنس سے سیر شدہ ہائیڈروکاربنس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں پلٹینم (Pt)، پلاڈیم (Pd) یا نیکل (Ni) دھات کے باریک صفوف کو بطور تماسی عامل (Catalyst) استعمال کیا جاتا ہے۔




تماسی عامل جیسے پلٹینم (Pt)، پلاڈیم (Pd) کو کرہ کی تپش پر بطور تماسی عمل استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ Ni کو تماسی عامل (Catalyst) کے طور پر استعمال کرنے کی صورت میں تعامل کو پورا ہونے کے لیے $250^{\circ}C$ سے $300^{\circ}C$ تپش درکار ہوتی ہے۔ اس ہائیڈروجن اندازی تعامل (Hydrogenation) کے دوران Pd، Pt اور Ni دھات ہائیڈروجن گیس کو اپنی سطح پر جذب (Absorb) کرتی ہیں اور پھر اسی طرح الکین کا سالمہ بھی دھاتوں کی سطح پر جذب (Absorb) ہو جاتا ہے اور پھر الکین کا دھات بند ٹوٹ کر ایک نیا بند کاربن اور دھات کے درمیان بنتا ہے اور پھر ایک کے بعد دیگر ہائیڈروجن الکین سے سکما بند (σ) کے ذریعے جڑ جاتے ہیں اور پھر سیر شدہ الکین

حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تعامل صنعتی طور پر ونسپتی تیل سے ونسپتی گھی کی تیاری کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اس طریقہ تعامل سے میتھین (Methane) کو تیار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کو پٹرولیم اور قدرتی گیس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔



9.3.2 وُرتز تعامل کے ذریعہ

الکائل ہیلائیڈس (Alkyl Halides) دھاتی سوڈیم کے ساتھ خشک ایٹھر (Dry Ether) کی موجودگی میں تعامل کر کے اعلیٰ الکینس (Alkanes) بناتے ہیں۔ اس تعامل کو وُرتز (Wurtz) نامی سائنسدان نے دریافت کیا اس لیے اس تعامل کو وُرتز تعامل (Wurtz Reaction) کہا جاتا ہے۔ اس تعامل کے لیے الکائل ہیلائیڈس کے دو سالمات درکار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مل کر الکینس بناتے ہیں۔




یہ تعامل الکینس کی تیاری کا ایک مؤثر طریقہ ہے اس تعامل کے ذریعے جفت کاربن (Even Carbon) جوہر والے الکینس جیسے ایتھین، بیوٹین اور ہیکسیسن وغیرہ کو تیار کیا جاتا ہے۔



9.3.3 کولب کا برق پاشیدگی کا طریقہ کے ذریعہ (Kolbe's Electrolytic Methods)

کاربو آکسین: ایک ترشہ کو سوڈیم یا پوٹاشیم کے آبی محلول (Aqueous Solution) کے ساتھ برق پاشیدگی (Electrolysis) یعنی برقی رو کو گزارنے سے الکین حاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل میں مثبت برقیہ (Anode) پر الکین حاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل میں جفت کاربن مرکبات (Odd Carbon atoms) جیسے پروپین، پیٹھین اور ہیپٹین ہائیڈرو کاربن حاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل کے دوران مندرجہ ذیل تعاملات واقع ہوتی ہیں۔





آنی محلول میں ایسیٹیٹ منفی رواں (CH_3COO^-) اور سوڈیم مثبت رواں (Na^+) کی شکل میں موجود رہتا ہے۔



At Anode: مثبت برقیہ (Anode) پر منفی ایسیٹھ رواں ایک الکٹران خارج کر کے ایسیٹھ آزاد اصلیه $(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ بناتا ہے، یہ اصلیه کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کر کے میتھائل فری ریڈیکل آزاد اصلیه $(\text{CH}_3^\cdot)$ بناتا ہیں۔ اور پھر ان کے آپس میں جڑنے سے آیتھین حاصل ہوتی ہے۔







At Cathode : منفی برقیہ (Cathode) پر سوڈیم رواں ایک الکٹران کو حاصل کر کے سوڈیم (دھات) بناتا ہے۔ اور پھر سوڈیم پانی کے ساتھ تعامل سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH) بناتا ہے اور ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔



9.3.4 گرگنارڈ تعامل کا استعمال کر کے




الکیل میگنیشیم ہیلائیڈ کو گرگنارڈ تعامل (Grignard Reagent) کہا جاتا ہے جسے عام طور پر RMgX سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جہاں ہیلائیڈ کو X^- اور الکیل (Alkyl) یا اریل (Aryl) گروپ کو R سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ الکیل ہیلائیڈس کو خشک ایٹھر (Dry ether) کی موجودگی میں میگنیشیم (Mg) دھات سے تعامل کروانے پر الکیل میگنیشیم ہیلائیڈ (R-Mg X) یعنی گرگنارڈ تعامل حاصل ہوتا ہے۔ اس تعامل کو Victor Grignard نامی سائنسدان نے دریافت کیا جنہیں اس دریافت پر 1912 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس تعامل کے دوران جب گرگنارڈ تعامل کو ایٹھر کی موجودگی میں پانی یا فعال ہیلائیڈروجن (Active Hydrogen) یا ایمائنس (Amines) سے تعامل کروایا جاتا ہے تب الکینس حاصل ہوتے ہیں۔



9.3.5 کلیمینسن تحویل کے ذریعہ

الڈیہائیڈس اور کیٹونس کے کاربونل گروپ کی زنک الملغم (Zinc Amalgam) اور مرتکز ہائیڈروکلورک ترشہ (Conc. Hydrochloric acid) کے ساتھ تعامل سے الکینس (Alkanes) کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تعامل کو Erik Christion

Clemmensen کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس تعامل کے ذریعے الکائیل اور ارائیل (Alkyl / Aryl) الڈیہائیڈ / کیٹون کو با آسانی تھویل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی کی اس تعامل میں کاربونل گروپ (C=O) میتھیلین گروپ (CH₂ Group) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



9.4 الکینس کے طبعی خواص

الکینس غیر قطبی مرکبات ہیں کیوں کہ کاربن-کاربن (C-C) اور کاربن-ہائیڈروجن (C-H) بند مکمل شریک گرتی ہوتے ہیں اور پھر کاربن اور ہائیڈروجن کی برقی منفیت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ الکین کے عام طور پر نقطہ اماعت اور نقطہ جوش بہت کم ہوتے ہیں کیوں کہ ان مرکبات میں کمزور وائڈروال قوتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے C₁-C₄ تک کے مرکبات گیسیں، C₅-C₁₇ تک مائع اور C₁₈ اور اس کے بعد کے مرکبات ٹھوس شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ الکین کے سالمات بے رنگ، بے مزہ اور بے بو ہوتے ہیں۔

یہ پانی میں نا حل پذیر ہوتے ہیں، لیکن نامیاتی محلول جیسے بنزین اور ایٹھر وغیرہ میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ الکینس کی زنجیر میں کاربن کے جوہروں کے اضافے کے ساتھ ان کے نقطہ اماعت و نقطہ جوش اور کثافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاخدار زنجیری مرکبات کا نقطہ جوش سیدھی زنجیری مرکبات کے بہ نسبت کم ہوتا ہے۔ کیونکہ سیدھی زنجیر الکین میں موجود اعلیٰ سطحی رقبہ کی وجہ سے ان میں پائی جانے والی بین سالمی کشش کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ (جدول - 9.2)

جدول - 9.2: چند الکین کے طبعی مستقالات (Physical Constant of Some Alkanes)

سلسلہ نمبر	نام	ضابطے	نقطہ اماعت (°C)	نقطہ جوش (°C)
1	میتھین (Methane)	CH ₄	-183	-162

2	ایٹھین (Ethane)	C_2H_6	-172	-88.5
3	پروپین (Propane)	C_3H_8	-187	-42.0
4	n-بیوٹین (n-Butane)	C_4H_{10}	-138	0
5	آئیسو-بیوٹین (Iso-Butane)	C_4H_{10}	-159	-12
6	این-پنٹین (n-Pentane)	C_5H_{12}	-130	-36
7	آئیسو-پنٹین (Iso-Pentane)	C_5H_{12}	-160	-28
8	نیو-پنٹین (Neo-Pentane)	C_5H_{12}	-17	-9.5

9.5 الکین کے کیمیائی خواص

الکین کے سالمات سیر شدہ ہائیڈروکاربن ہیں، جو اپنے اندر کوئی تعالیٰ سائٹس نہیں رکھتے۔ یہ سالمات کاربن-کاربن اور کاربن-ہائیڈروجن کے ساتھ اکہرے بند سے جڑے ہوتے ہیں۔ الکین کو پیرافین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام حالات میں غیر عامل یعنی تعامل میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں پیرافینی یعنی کم رغبت رکھنے والے مرکبات بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر الکینس میں بدلی تعاملات واقع ہوتی ہیں۔ یہ تمام بدلی تعاملات آزاد اصلیمیکانیت (Free Radical Mechanism) کے ذریعے انجام پاتی ہیں۔ ان تعاملات کے دوران الکینس میں موجود ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن کو دوسرے گروپ یا جوہر سے بدلا جاسکتا ہے۔ الکینس کے کچھ اہم تعاملات مندرجہ ذیل ہیں۔

1- لونجس اندازی


2- نائیٹروجنانا

3- سلفوجنانا


9.5.1 الکلیں کی لونجس اندازی

الکلیں کلورین (Cl_2) اور برومین (Br_2) کے ساتھ سورج کی روشنی یا بالائے بنفشی شعاعوں یا اعلیٰ درجہ تپش پر تعامل کر کے الکائل برومائڈ یا الکائل کلورائیڈ (Haloalkane) بناتے ہیں۔


مثال کے طور پر میتھین سورج کی روشنی کی موجودگی میں کلورین کے ساتھ تعامل کر کے کلورومیتھین (Chloromethane)، ڈائی کلورومیتھین (Dichloromethane)، ٹرائی کلورومیتھین (Trichloromethane) اور ٹیٹراکلورومیتھین (Tetrachloromethane) بناتے ہیں۔



لونجی عناصر میں برومین بھی کلورین کی طرح تعامل کرتی ہے، لیکن اس تعامل کی رفتار آہستہ ہوتی ہے۔ فلورین اندازی ایک بہت مشکل عمل ہے جس کے لیے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے اور اس تعامل پر قابو پانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ آئیوڈینس اندازی ایک انتہائی سست تعامل ہے اور یہ تعامل متعکس (reversible Reaction) تعامل ہے۔ الکلیں کے ساتھ لونجی عناصر کی شرح عاملیت اس طرح ہوتی ہے۔



لونجس اندازی کے دوران ثلاثی کاربن (Tertiary Carbon) کا ہائیڈروجن ابتدائی (Primary) اور ثانوی (Secondary) کاربن جو ہر کی بہ نسبت تیزی سے بدلا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن جو ہر کی عاملیت کی ترتیب (Reactivity Order) حسب ذیل ہے۔




9.5.2 لونجس اندازی کی میکینیت

الکین میں لونجن اندازی تعامل بالائے بنفشی روشنی یا حرارت کی موجودگی میں تین مراحل میں مکمل ہوتا ہے جیسے آغاز تعامل (Chain Initiation)، دوسرا مرحلہ توسیع تعامل (Propagation)، اور تیسرا مرحلہ اختتام تعامل ہے۔ یہ تعامل ایک آزاد اصلیه بدلی تعامل ہے۔


(a) آغاز تعامل

اس تعامل کا آغاز روشنی یا حرارت کی موجودگی میں Cl-Cl کے سالمے کے درمیانی بند کا دو برابر حصوں میں ٹوٹنا یعنی متجانس شکستگی سے دو کلورین کے آزاد اصلیه کا بننا ہے۔ یہ کلورین اصلیه گرفت خول میں تنہا الیکٹران رکھتے ہیں اور بے حد عامل ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے جوہر سے آسانی کے ساتھ شریک گرفت بند بنا سکتے ہیں۔



(b) زنجیری توسیع تعامل


تبادل کے اس مرحلے میں کلورین فری ریڈیکل (Cl[•]) میتھین میں موجود کاربن-ہائیڈروجن C-H بند پر اثر انداز ہو کر توڑتے ہیں۔ اس عمل سے میتھائل آزاد اصلیه (CH₃[•]) اور ہائیڈروجن کلورائیڈ حاصل ہوتے ہیں۔




میتھائل فری ریڈیکل کلورین کے سالمے پر عمل انداز ہو کر میتھائل کلورائیڈ اور دوسرا کلورین فری ریڈیکل بناتا ہے۔ یہ عمل بھی کلورین کے سالمے میں موجود بند میں Homolytic Fission کے ذریعہ سے بنتا ہے۔




یہ دو مرحلے مسلسل دہرائے جاتے ہیں جس سے مسلسل تعاملات کی ایک زنجیر قائم ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل تعاملات سے واضح ہو گا کہ بڑے میتھائل ہیلوائڈ سالمے کیسے بنتے ہیں۔






(c) اختتام تعامل

جب متعاملات مکمل طور پر حاصلات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو تعامل کچھ دیر کے لیے روک جاتا ہے۔ پھر ان ضمنی تعاملات کی وجہ سے اصل اختتامی تعاملات حسب ذیل ہیں۔




9.5.3 الکین کا نائٹرانا


وہ کیمیائی عمل جس میں الکین کے سہلے میں موجود ہائیڈروجن کو نائٹرو گروپ سے بدلا جاتا ہے۔ الکین کا عام حالات میں نائٹرانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان تعاملات کو انجام دینے کے لیے اعلیٰ تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے تعامل میں مونو نائٹرو الکین حاصل ہوتے ہیں۔



عام طور پر الکین کو نائٹرانے کے لیے میتھین اور نائٹروک ترشہ (HNO₃) کے آمیزہ کو 425⁰C پر گرم کرنے سے نائٹرو میتھین حاصل ہوتی ہے۔ اس تعامل کو بخاری حالت میں انجام دیا جاتا ہے۔ نائٹرانے کے تعامل میں ہائیڈروجن کی بدلنے کی صلاحیت مندرجہ ذیل رجحان میں ہوتی ہے۔ ابتدائی ہائیڈروجن (1⁰) > ثانوی ہائیڈروجن (2⁰) > تertiائی ہائیڈروجن (3⁰)




اعلیٰ الکین کو نائٹرانے کے دوران الکین میں موجود کاربن-کاربن (C-C) بند بھی ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے مختلف مرکبات کا آمیزہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پروپین کے نائٹرانے پر چار مختلف طرح کے نائٹرو مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔




9.5.4 الکین کا سلفوجننا

کسی نامیاتی مرکب کے ہائیڈروجن جوہر کو سلفونک ترشی گروپ ($-\text{SO}_3\text{H}$) سے بدلائے جانے کے عمل کو سلفوجننا (Sulphonation) کہتے ہیں۔ اس تعامل کے ذریعے الکین کے سلفوجننا سے الکین سلفونک ترشہ حاصل ہوتے ہیں۔



سلفو اندازی تعامل کو دھاتی سلفیورک ترشہ (Fuming Sulphuric Acid) کے ساتھ الکین کو گرم کر کے عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس تعامل کے لیے سلفورک ترشہ کے بجائے سلفورائیل کلورائیڈ (SOCl_2) کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔



9.6 اکتسابی نتائج

اس اکائی میں طلباء نے ہائیڈروکاربنس اور خاص کر الکین (Alkane) کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات حاصل کی ہیں۔

☆ نامیاتی مرکبات جو صرف کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنتے ہیں ہائیڈروکاربنس کہلاتے ہیں۔

☆ پٹرولیم اور قدرتی گیس ہائیڈروکاربنس کو حاصل کرنے کے دو اہم ذرائع ہیں۔

- ☆ الکین وہ نامیاتی مرکبات ہیں جو کاربن-کاربن (C-C) اور کاربن-ہائیڈروجن کے درمیان اکہرا بند (Single Bond) رکھتے ہیں۔
- ☆ الکین کو عام ضابطہ C_nH_{2n+2} سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں n سے مراد کاربن کے جوہروں کی تعداد ہے۔
- ☆ الکین کو پیرافین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام حالات میں غیر عامل یعنی تعامل میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔
- ☆ الکین کی تیاری کے مختلف طریقوں کو بیان کیا گیا جو مندرجہ ذیل ہیں۔
- (a) ہائیڈروجن تھامی عمل (b) ڈرٹز تعامل
- (c) کولب برق پاشیدگی (d) گرگنارڈ تعامل
- (e) کلیمینسن تحویل
- ☆ الکین کے طبعی خواص اور کیمیائی خواص کا تفصیل سے مطالعہ کیا گیا۔

9.7 کلیدی الفاظ

- 1- ہائیڈروکاربنس : وہ مرکبات جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کر بنتے ہیں۔
- 2- الکین : وہ نامیاتی مرکبات ہیں جو کاربن-کاربن اور کاربن-ہائیڈروجن کے درمیان اکہرا بند رکھتے ہیں۔ ان کا استعمال بایو گیس اور LPG گیس میں کیا جاتا ہے۔
- 3- ڈرٹز تعامل : الکیل ہیلالائیڈ کی سوڈیم دھات کے ساتھ خشک ایٹھر کی موجودگی میں تعامل کر کے متماثل ہائیڈروکاربن بننے کا عمل ڈرٹز تعامل کہلاتا ہے۔
- 4- گرگنارڈ تعامل : یہ ایک اہم متعامل ہے جو مختلف نامیاتی مرکبات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کھوج گرگنارڈ سائنسدان نے کی۔
- 5- کلیمینسن تحویل : اس تعامل کا استعمال کاربوئل مرکبات کو تحویل کر کے سیر شدہ ہائیڈروکاربن بنانے میں کیا

جاتا ہے۔

6۔ آزاد اعلیٰ تعاملات : یہ الکلیں خاندان کی اہم خصوصیات ہے، جس میں آزاد اعلیٰ حصہ بنتے ہیں۔

9.8 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات





1۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا رابطہ بیوٹین کا ہے؟

(a) C_2H_6 (b) C_3H_8 (c) CH_3 (d) C_4H_{10}



2۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا پانی میں حل پذیر نہیں ہے؟


(a) C_2H_6 (b) C_3H_8 (c) CH_4 (d) ان میں سے سبھی

3۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی ری ایکشن ورٹیز ری ایکشن کی مثال ہے۔



4۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا تعامل Clemmenson Reduction کی مثال ہے۔





5- الکیں میں کس طرح کے تعامل واقع ہوتے ہیں۔

(a) الکٹران پسند اضافی تعامل

(b) مرکز پسند اضافی تعامل

(c) آزاد اصلہ بدلی تعامل

(d) آزاد اصلہ اضافی تعامل

6- LPG میں کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟

(a) C_2H_6 (b) C_3H_6 (c) C_2H_4 (d) C_4H_{10}

مختصر جوابات کے حامل سوالات

1- ہائیڈروکاربن کی تعریف بیان کیجیے تین مثالوں کے ذریعہ بیان کیجیے۔

2- مندرجہ ذیل ری ایکشن کو ایک مثال دے کر بیان کیجیے۔

(a) ڈیڑ ری ایکشن

(b) کلیمینسن ری ایکشن

3- الکیں کی طبعی خصوصیات بیان کیجیے۔

4- الکیں بنانے کے دو طریقے متاوات کے ساتھ بیان کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

1- الکیں بنانے کے مختلف طریقوں کو متاوات کے ساتھ بیان کیجیے۔

2- آزاد اصلہ بدلی تعاملات کیا ہیں؟ الکیں کی مثال دے کر اس کی میکانیت بیان کیجیے۔

3- مندرجہ ذیل اصطلاحات کو متاوات دے کر بیان کیجیے۔

(a) نائٹریشن

(b) سلفونیشن

(c) ہیلوجینیشن

اکائی - 10: الکنس

(Unit-10: Alkenes)

اکائی کے اجزا

تمہید	10.0
مقاصد	10.1
الکنس کی نظام تسمیہ	10.2
الکنس کی تیاری کے عام طریقے	10.3
10.3.1 الکو حل کی ناہیدگی	
10.3.2 اکائیل ہیلائیڈ سے ہائیڈروجن اور لوئجن عناصر کی رہائی	
10.3.3 سیٹرف کا قانون	
10.3.4 ڈی ہیلوجنیشن	
10.3.5 سیٹیلین کی کنٹرول ہائیڈروجن اندازی	
الکنس کی طبعی خواص	10.4
الکنس کی کیمیائی خواص	10.5
10.5.1 ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل	
10.5.2 لوئجن عناصر کا اضافہ	
10.5.3 ہائیڈروجن ہیلائیڈز سے اضافی تعامل	
10.5.4 جمعی تعامل اضافہ - مارکونیکوف کا قانون	
10.5.5 ضد مارکونیکوف اضافی تعامل - پراسائیڈ اثر	

10.5.6 تماشائی آبیدگی

10.5.7 ہائیڈروبو ریشن - آکسیدیشن

10.5.8 اوزون پاشیدگی

10.5.9 الکپن کی پوٹاشیم پر میگنٹ کے ساتھ تعامل

10.6 الکپنس کے استعمالات


10.7 اکتسابی نتائج

10.8 کلیدی الفاظ

10.9 نمونہ امتحانی سوالات

10.0 تمہید

الکپن غیر سیر شدہ دہنی ہائیڈروکاربن ہوتے ہیں۔ جن میں کم سے کم دو کاربن کے درمیان ایک دہرا بند موجود ہوتا ہے۔ ان کا عام سالمی ضابطہ C_nH_{2n} ہوتا ہے جہاں پر n کاربن کے جوہروں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ الکپن میں الکین کی طرح کاربن کی تعداد مساوی ہوتی ہے لیکن صرف دو ہائیڈروجن کا فرق ہوتا ہے۔ الکپن کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر اولیفینس (Olefins) تیل بنانے والے مرکبات بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کا پہلا مرکب میتھیلین یا اتھین (C_2H_4) ہے جو گیس کی شکل میں موجود ہے۔ الکپن میں موجود کاربن - کاربن کے درمیان دہرے بند ($C=C$) کی موجودگی کی وجہ سے یہ الکین (Alkene) کی بہ نسبت زیادہ عامل ہوتے ہیں۔ اس خاندان کا پہلا رکن میتھیلین اور دوسرا ممبر پروپین (C_3H_6) کافی اہم مرکبات ہیں، جو کہ بہت کثیر تعداد میں ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساختی اعتبار سے الکپن میں کاربن - کاربن کے دوہرے بند میں سے ایک مضبوط سکما بند (σ) ہوتا ہے جو sp^2 مخلوط آرٹیل (Hybrid Orbital) کے سروں کے ساتھ انطباق (Overlapping) کی وجہ سے بنتا ہے اور ایک کمزور پائی بند (π) ہوتا ہے جو دو کاربن جوہروں کے p آرٹیل کے جانبی انطباق کی وجہ سے بنتا ہے۔ (شکل - 10.1)



شکل - 10.1: الکین میں اختلاط

کاربن-کاربن کا دوہرا بند 'بندشی لمبائی' کے لحاظ سے کاربن-کاربن اکہرے بند کے مقابلے میں (134 pm) ہوتا ہے۔ الکین میں موجود کمزور π کی موجودگی کی وجہ سے یہ مرکبات غیر سیر شدہ مرکبات ہوتے ہیں اور پھر الیکٹران پسند اضافی تعامل سے اکہرے بند کے مرکبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

10.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء کو کاربن-کاربن دوہرے بند رکھنے والے مرکبات یعنی غیر سیر شدہ مرکبات 'الکینس' انکی تیاری، طبعی اور کیمیا کی خواص کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جائے گی۔

10.2 الکینس کی نظام تسمیہ

الکینس مرکبات کی پہچان ان میں موجود کاربن-کاربن دوہرا بند سے ہوتی ہے۔ الکینس کا لاحقہ 'ene' ہے۔ کاربن-کاربن دوہرا بند اس کا فعلی گروپ ہے۔ الکینس میں پائے جانے والے دوہرے بند میں ایک سکما (σ) بند اور دوسرا پائی (π) بند ہوتا ہے۔ IUPAC تسمیہ نظام میں الکینس (Alkanes) کے لاحقہ 'ane' کو لاحقہ 'ene' میں بدلنے پر الکینس کے نام حاصل ہوتے ہیں۔ دوہرے بند کے مقام کو صحیح عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو نام سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ کاربن جوہروں کی گنتی اس سرے سے شروع کی جاتی ہے جس میں دوہرا بند قریب ترین ہوتا ہے۔ تسمیہ کے دوسرے بنیادی نکات وہی ہوتے ہیں جو الکین میں استعمال کئے گئے ہیں۔ لہذا ایتھیلین اور پروپیلین (Propylene) کو ایتھین اور پروپین کہتے ہیں۔ آئیسیویوٹیلین کو بلترتیب '1-Butene' اور '2-Butene' (جدول 10.1) کہتے ہیں۔

جدول 10.1

Formula	Alkylene	IUPAC Name
$H_2C=CH_2$	Ethylene	Ethene


$\text{CH}_2\text{-HC=CH}_2$	Propylene	Propene
$\text{CH}_2\text{-HC-CH=CH}_2$	1-Butylene	1-Butene
$\text{CH}_3\text{-HC=CH}_2\text{-CH}_2$	2-Butylene	2-Butene
$\text{CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$	Iso Butylene	2-Methyl-1-Propene

10.3 الکینس کی تیاری کے عام طریقے


چار کاربن جوہر کی تعداد رکھنے والے الکینس (Alkenes) یعنی کہ بیٹوین (Butene) تک کے مرکبات کو عام طور پر پٹرولیم صنعت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن چار کاربن جوہر سے زیادہ کاربن رکھنے والے الکینس کو مندرجہ ذیل طریقوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ عموماً انہیں آخری تعاملات سے تیار کیا جاتا ہے جس میں الکائیل ہیلوائڈس سے ہائیڈروجن اور لونجی عنصر کی رہائی (Dehydro Halogenations)، الکوحل سے پانی کی رہائی (Dehydration) اور ڈائی ہیلوالکینس (Dihalo Alkanes) سے لونجی عنصر کی رہائی (Dehalogenations) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ الکائینس کے زیر قابو تحویل (Controlled Reduction) کی مدد سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔

10.3.1 الکوحل کی نابیدگی

الکوحل کو مرکب سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں گرم کرنے پر الکین حاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل کے دوران پانی کا ایک سالمہ خارج ہوتا ہے۔ اس تعامل کو الکوحل کی ترشی نابیدگی (Acidic Dehydration of Alcohols) کہا جاتا ہے۔ اس تعامل کے بعض حالات میں خشک ہائیڈروکلورک ترشہ (HCl)، الومینا (Al_2O_3) اور بوران ٹرائی فلورائیڈ (BF_3) کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔




مثال کے طور پر۔ جب ایٹھائیل الکوحل کو مرکب سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں 170°C تپش پر گرم کرتے ہیں تو ایٹھائیل حاصل ہوتی ہے۔



Ethyl alcohol


Ethene

مرتکز سلفورک ترشہ کو تھامی عامل (Catalytic Agents) کے طور پر استعمال کر کے الکوحل سے الکین کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تعامل ایک سالمی ناآبیدگی (Intra Molecular Dehydration) کی ایک مثال ہے۔ عام طور پر اس تعامل کے ساتھ ذیلی تعامل (Side Reaction) بھی واقع ہوتی ہے۔ جس میں بین سالمی ناآبیدگی کی وجہ سے ایتھرس (Ethers) تشکیل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔




10.3.2 الکائل ہیلائیڈ سے ہائیڈروجن اور لونجینی عناصر کی رہائی

الکائل ہیلائیڈس (Alkyl Halides) کو الکوحلی پوٹاشیم یا سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر ہائیڈروجن اور لونجینی عناصر کی رہائی کے عمل سے الکین (Alkene) حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ہائیڈروجن اور لونجینی عناصر الکائل ہیلائیڈس میں موجود دو متصل کاربن جوہروں جس سے لونجینی عناصر منسلک ہوتا ہے، خارج ہوتے ہیں۔ اس تعامل کو ڈی ہیلو جینیٹیشن (Dehydrohalogenation) کہتے ہیں۔



مثال کے طور پر 1-بروموپروپین (1-Bromo Propane) کو الکوحلی سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH) کے ساتھ گرم کرنے پر پروپین (Propene) حاصل ہوتی ہے۔




1-Bromopropane

Propene

10.3.3 سیٹزف کا قانون (Saytzeff's Rule)


الکائل ہیلائیڈس میں اگر دو β ہائیڈروجن متبادل ہوں، تو ہائیڈروجن اور لوہی عنصر کی رہائی سے الکپن کی دوہم ترکیبی ساختیں (Isomeric Structures) حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ثانوی بیوٹائل کلورائیڈ (Secondary Butyl Chloride) سے ہائیڈروجن اور کلورین کی رہائی سے بیوٹین کے دوہمہ ترکیبے (Isomers) جیسے 1-بیوٹین (1-Butene) اور 2-بیوٹین (2-Butene) بنتے ہیں۔

اس تعامل کے دوران اگر β کاربن سے ہائیڈروجن اور α کاربن سے کلورین 'HCl' کی شکل میں خارج ہوتی ہے تو 2-بیوٹین (2-Butene) حاصل ہوتا ہے اور اگر β کاربن سے ہائیڈروجن اور α کاربن سے کلورین 'HCl' کی شکل میں خارج ہوتی ہے تو 1-بیوٹین (1-Butene) حاصل ہوتا ہے۔




10.3.4 ڈی ہیلوجنیشن

ایسے ڈائی ہیلائیڈس جن میں دو لوہی جوہر دوہمہ Adjacent کاربن جوہروں سے منسلک ہوتے ہیں، نواحی ڈائی ہیلائیڈ (Vicinal Dihalides) کہلاتے ہیں۔ نواحی ڈائی ہیلائیڈس زنک (Zn) دھات کے ساتھ تعامل کر کے ZnX_2 کا ایک سالمہ گنوا دیتے ہیں۔ اور ایک الکپن بناتے ہیں اس تعامل کو ڈی ہیلوجنیشن (Dehalogenation) کہتے ہیں۔




2,3-dibromobutane اس عمل کے ذریعہ 2-Butene دیتا ہے۔



10.3.5 الکائین کی زیر قابو تحویل

الکائین کے زیر قابو تحویل (Controlled Reduction) پر الکین حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کے لیے الکائین (Alkynes) میں تماسی ہائیڈروجنانے (Catalytic Hydrogenation) سے Cis جیومیٹری والے الکین حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسیٹیلین (Acetylene) کو (Pd-C) کی موجودگی میں تماسی ہائیڈروجنانے پر ایتھیلین (Ethylene) حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح 2-بیوٹائین (2-Butyne) کو تماسی ہائیڈروجنانے پر 2-Cis-بیوٹین (Cis-2-Butene) حاصل ہوتی ہے۔



10.4 الکینس کے طبعی خواص

الکینس کے طبعی خواص الکین کی طرح یکساں ہوتے ہیں۔ اس گروپ کے پہلے تین ممبر (ایتھلین، پروپین اور بیوٹین) عام حالات میں گیس ہوتی ہیں۔ اگلے چودہ ممبر مانع حالت میں پائے جاتے ہیں اور 18 سے زیادہ کاربن کے جوہر والے ممبر س ٹھوس حالت میں ہوتے ہیں۔ الکین بے رنگ اور بے بو والے مرکبات ہوتے ہیں۔ سوائے ایتھین کے جو ایک بے رنگ ہلکی بھینی خوشبو والی گیس ہوتی ہے۔ الکینس غیر قطبی مرکبات ہوتے ہیں۔ اس لیے پانی میں بہت کم حل ہوتے ہیں، لیکن نامیاتی محلل جیسے بنزین، کلوروفارم اور ایٹھر میں اچھی طرح حل پذیر ہوتے ہیں۔ انکے بڑھتے ہوئے سائز کے ساتھ نقطہ جوش میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، شاخدار زنجیری مرکبات (Branched Chain Compounds) کا نقطہ جوش بہ نسبت سیدھی زنجیر (Straight Chain Compounds) کے کم ہوتا ہے۔ الکین کے سالمی وزن کے اضافہ کے ساتھ نقطہ اماعت اور نقطہ جوش اور کثافت اضافی میں اضافہ ہوتا ہے۔ (جدول-10.2)

جدول-10.2


نام	سالمی ضابطہ	نقطہ جوش ($^{\circ}\text{C}$)	نقطہ اجماع ($^{\circ}\text{C}$)
ایتھین (Ethene)	C_2H_4	-169	-104
پروپین (Propene)	C_3H_6	-185	-47
بیوٹین (Butene)	C_4H_8	-130	-65
پینٹین (Pentene)	C_5H_{10}	-138	32
ہکزیٹین (Hexene)	C_6H_{12}	-141	65

10.5 الکینس کے کیمیائی خواص

الکین کاربن-کاربن دوہرے بند کی وجہ سے غیر سیر شدہ مرکبات ہوتے ہیں اور یہ الکین کی بہ نسبت تعاملات میں زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے الکین اضافی تعاملات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس میں الیکٹروفائل کاربن-کاربن دوہرے بند میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 'ایتھیلین (Ethylene) میں الیکٹران بدل کاربن-کاربن (C-C) محور بند کے اوپر اور نیچے پائے جاتے ہیں الیکٹرانس جزوی طور پر جڑے ہونے سے لیوس اساس (Lewis Base) اور مرکزہ پسند (Nucleophile) جیسے کام کرتے ہیں اس لیے الکین الیکٹران پسند سے تعامل کرتے ہیں جو اضافی حاصلات بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلورین کے اضافی تعاملات، ہائیڈروجن کے اضافی تعاملات اور پانی کے اضافی تعاملات وغیرہ۔ الکین تکسیدی عامل سے تعامل کرتے ہیں۔ الکین کی ایک اہم صلاحیت یہ ہے کہ یہ کثیر ترکیبی سازی (Polymerisation) کے ذریعے کئی ایک مرکبات جیسے پلاسٹک (Plastic) وغیرہ بناتے ہیں۔ الکین مخصوص حالات میں آزاد اصلہ اضافی (Free Radical Addition) اور آزاد اصلہ بدلی (Free Radical Substitution) تعاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ الکین کے کچھ عام تعاملات مندرجہ ذیل بیان کیے گئے ہیں۔



10.5.1 ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل

الکین 'پلاٹینم (Pt)، پالڈیم (Pd) اور نیکل (Ni) دھات کے باریک صفوف اور ڈائی ہائیڈروجن گیس کی موجودگی میں تعامل کر کے الکین (Alkane) بناتے ہیں۔ اس تعامل کے لیے اس تعامل میں استعمال ہونے والے تماسی عامل کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف تپش اور دباؤ درکار ہوتے ہیں۔ الکین کا ہائیڈروجنانا حرارت زاء تعامل (Exothermic Reaction) کی مثال ہے۔ اس تعامل کا استعمال ونسپتی تیل سے ونسپتی گھی بنانے میں کیا جاتا ہے۔




10.5.2 لونجی عناصر کا اضافہ

الکینس لونجی عناصر جیسے برومین یا کلورین سے اضافہ تعاملات کے ذریعے (Addition Reaction) ڈائی ہیلو الکین بناتے ہیں۔





الکینس میں اضافی تعاملات عام طور پر کلوروفارم، کاربن ٹیٹراکلورائیڈ اور اسیٹک تریک (Acetic Acid) کی موجودگی میں انجام پاتے ہیں۔ اس تعامل میں لونجی عناصر کی عالمیت (Reactivity) اس ترتیب سے ہوتی ہے۔



فلورین الکین کے ساتھ دھماکہ پیدا کر کے تعامل کرتی ہیں، جب کہ آئیوڈین کے اضافی تعاملات بہت سست اور متعکس ہوتے ہیں۔ لیکن البرومین کے رنگ کو بھورا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نامیاتی مرکبات میں غیر سیر شدگی کی جانچ کے لیے اس تعامل کو استعمال کیا جاتا ہے۔

10.5.3 ہائیڈروجن ہیلائیڈ سے اضافی تعامل


الکین ہائیڈروجن ہیلائیڈ (HI, HBr, HCl) سے تعامل کر کے الکائل ہیلائیڈ بناتے ہیں ہیلائیڈ کی عالمیت کی ترتیب



Alkyl halide


ایٹھلین ہائیڈروجن برومائیڈ سے تعامل کر کے ایٹھائل برومائیڈ بناتی ہیں۔ اس طرح کے تعامل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹھلین بطور مرکزہ پسند (Nucleophile) کا کام کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایٹھلین ہائیڈروجن برومائیڈ (HBr) سالمہ سے (H⁺) پروٹان حاصل کرتا ہے۔ اس

تفاعل کو مندرجہ ذیل میکائیک سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جس سے کاربونیم رواں (Carbonium ion) وجود میں آتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کاربونیم رواں ہر منفی رواں کا اصلیہ (Br) عمل کرتا ہے۔ اس طرح سے الکائیل ہالائیڈ حاصل ہوتا ہے۔




10.5.4 مارکونیکوف کا قانون (Markovnikov Rule)

مارکونیکوف قانون کے مطابق غیر متشاکل الکین (Unsymmetrical Alkene) میں اضافی تعاملات (Addition Reaction) کے دوران جمع ہونے والے سالے (Addendum) کا منفی حصہ الکین کے اس کاربن جوہر سے منسلک ہوگا جس کے پاس ہائیڈروجن جوہر کی تعداد کم ہوگی۔ اس عمل کو سمجھانے کے لیے غیر متشاکل الکین یعنی پروپین (Propene) میں HBr کے اضافی تعامل کے ذریعے شامل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس تعامل کے دوران 1-بروموپروپین اور 2-بروموپروپین کے حاصل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس تعامل کو مارکونیکوف اضافی تعامل بھی کہتے ہیں۔




10.5.5 ضد مارکونیکوف قانون (Anti Markovnikov Rule)

اس اصول کے مطابق غیر متشاکل الکینس (Unsymmetrical Alkenes) میں HBr کا اضافہ مارکونیکوف کے اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ اس اضافی تعامل کو 1933 میں کیمیا دان خراش (Kharash) نے دیکھا تھا۔ اس لیے اس تعامل کو خراش کا اثر یا پراکسائیڈ اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 'پراکسائیڈ جیسے Benzoyl peroxide کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔





10.5.6 تماشائی آبیدگی

الکین کے مرکب سلفوریک ترشہ کی موجودگی میں پانی کے سالمہ کے اضافی تعامل سے الکوحل حاصل ہوتا ہے۔





غیر متشکل الکینس (Unsymmetrical Alkene) جیسے پروپین پر آبیدگی کا عمل مارکونیکوف قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس عمل کو مندرجہ ذیل تعامل سے سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ تعامل Carbocation کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔




10.5.7 ہائیڈروبوریشن-آکسیدیشن

اس تعامل میں غیر متشکل الکینس (Unsymmetrical Alkenes) پر پانی کا اضافی تعامل تماشائی عامل ڈائی بورین کی موجودگی میں ہوتا ہے اور پھر الکوحل حاصل ہوتا ہے اس تعامل کے دوران ٹرائی الکائیل بوران حاصل ہوتا ہے۔ جس کی قلوبی ہائیڈروجن پر آکسائیڈ محلول کے ساتھ تکسید کی جاتی ہے۔ اس تعامل میں الکین میں موجود کاربن-کاربن کے درمیان موجود دوہرے بند پر بوران ہائیڈرائائیڈ کے اضافہ کو ہائیڈروبوریشن کہتے ہیں۔




Tri propyl Borane



Tri propyl Borane

10.5.8 اوزون پاشیدگی


الکپنس کے ساتھ اوزون تعامل کر کے غیر قیام پذیر اوزونائیڈ (Ozonide) بناتا ہے اور یہ $Zn-H_2O$ کے ساتھ آب پاشیدگی سے کاربونیل مرکبات جیسے ایلڈ یہائیڈ اور کیٹون (Aldehyde and Ketone) دیتے ہیں۔ کاربونیل مرکبات کی مزید تفسید کو روکنے کے لیے آب پاشیدگی کا عمل غیر عامل فضاء میں کروایا جاتا ہے۔




اوزون پاشیدگی کے پہلے مرحلے میں اوزونائیڈ بنتا ہے۔ اس کی Zn کی موجودگی میں آب پاشیدگی سے کاربونیل مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔ اوزون پاشیدگی کے دوران حاصل شدہ کاربونیل مرکبات کی شناخت کے ذریعہ سے الکپن کی ساخت کا تعین کیا جاتا ہے۔

10.5.9 الکپن کی پوٹاشیم پر میگنیٹ کے ساتھ تعامل

الکپنس 'پوٹاشیم پر میگنیٹ جو کی ایک طاقتور تفسیدی عامل ہے کے ساتھ نارمل حالات میں تعامل کر کے گلیکولس بناتے ہیں۔




الکپنس 'پوٹاشیم پر میگنیٹ کے ساتھ طاقتور حالات میں تعامل کر کے کاربو آکزیلک ایسڈ یا کیٹون بناتے ہیں۔




10.5.10 الکپن کی ہمہ سالیمنٹ (Polymerisation of Alkene)

ایسا عمل جس میں ایک ہی یا مختلف اشیاء کے سادہ یا چھوٹے سالمات آپس میں ملکر بڑے سالمات بناتے ہوں اور اس عمل کے دوران یا تو چھوٹے سالموں کا اخراج عمل میں آتا ہے یا نہیں ہمہ سالیمنٹ کہلاتا ہے۔ اور حاصل ہونے والا محاصل ہمہ سالمہ (Polymer) کہلاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا پلاسٹک اسی طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔



10.6 الپینس کے استعمالات

- الپینس خاصکر کے آیتھیلین کے استعمالات حسب ذیل ہیں۔
- 1- ایتھائل الکوحل اور پالیتھیلین کی تیاری میں۔
 - 2- مخالف انجماد اور آیتھیلین گلیکول کی تیاری میں۔
 - 3- مسٹرڈگیس کی تیاری۔ آیتھیلین 'سلفر مونوکلورائیڈ مسٹرڈگیس' (S_2Cl_2) سے تعامل کر کے مسٹرڈگیس سلفر دیتی ہے۔



10.7 اکتسابی نتائج

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو گئے کہ وہ کاربن-کاربن دوہرے بند رکھنے والے مرکبات یعنی غیر سیر شدہ مرکبات الپینس اور انکی تیاری 'طبعی' (Physical) اور 'کیمیائی' (Chemical) خواص کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کیا۔

10.8 کلیدی الفاظ

- 1- غیر سیر شدہ دہنی ہائیڈروکاربن: وہ ہائیڈروکاربن جس میں کاربن-کاربن کے درمیان کم از کم ایک دہرے بند موجود ہو
- 2- اولیفین: وہ مرکبات جن میں کاربن-کاربن کے درمیان دوہرے بند ہوتا ہے اور یہ تیل بناتے ہیں۔
- 3- ڈی ہائیڈروہیلو جینیٹیشن: وہ اخراجی تعامل جس کے دوران ہائیڈروجن اور لوئجی عنصر کو متعامل سے خارج کرتے ہیں۔
- 4- نواجی ڈائی ہیلائیڈ: ایسے ڈائی ہیلائیڈ جن میں دو لوئجی جوہر دو مستقل کاربن جوہروں سے منسلک ہوتے ہیں۔
- 5- مارکونیکوف کا قاعدہ: اس قاعدہ کے مطابق جمع ہونے والے سالمے کا منفی حصہ اس کاربن جوہر سے منسلک ہوگا جس کے پاس ہائیڈروجن کی تعداد کم ہے۔
- 6- خراس اثر: خراس یا پیر آکسائیڈ اثر مارکونیکوف قانون کے خلاف اضافی تعامل کہلاتا ہے۔

10.9 نمونہ امتحانی سوالات

مفروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- ایتھین (Ethene) ' پروپین (Propene) ' 1- بیوٹین (1-Butene) اور 2- بیوٹین (2-Butene) میں سے کون سا سب سے زیادہ مستحکم (Stable) ہے؟
- 2- ایتھینول کی بھاپ کو مرکب سلفیورک ایسڈ کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو کونسا مرکب حاصل ہوتا ہے؟
- 3- ایسے تعاملات جن میں ہائیڈروجن اور ہیلوجن دونوں کا ساتھ ساتھ اخراج ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟
- 4- ونسپتی تیل سے ونسپتی گھی بنانے میں کس ریاکشن کا استعمال کیا جاتا ہے؟
- 5- اوزون (Ozone) کے دو استعمالات بتائیے۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- مندرجہ ذیل تعاملات کو ایک مساوات دے کر بیان کیجیے۔
(a) ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن (b) ہائیڈرو جینیشن
- 2- اضافی تعامل سے کیا مراد ہے۔ اور ان کے اقسام کو مثال دے کر بیان کیجیے۔
- 3- مارکونیکوف قانون کی تعریف دو مثال و مساوات کے ساتھ بیان کیجیے۔
- 4- مندرجہ ذیل کی تعریف مساوات و مثال دے کر بیان کیجیے۔
(a) ڈی ہیلوجینیشن (b) ڈی ہائیڈریشن

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- الکین بنانے کے مختلف طریقوں کو بیان کیجیے۔ اور ان کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کو بھی بیان کیجیے۔
- 2- مندرجہ ذیل تعاملات کو ایک ایک مثال دے کر بیان کیجیے۔
(a) ہائیڈرو آکسلیشن
(b) ہائیڈرو بوریٹیشن - آکسائیڈیشن (Hydroboration - Oxidation)
- 3- ہائیڈریشن (Hydration) پر مختصر نوٹ لکھیے۔

اکائی-11: الکائینس

(Unit-11: Alkynes)


اکائی کے اجزا

- 11.0 تمہید
- 11.1 مقاصد
- 11.2 الکائین کی نظام تسمیہ
- 12.3 الکائین کی تیاری کے عام طریقے
- 11.3.1 ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن
- 11.3.2 ڈی ہائیڈرو جنیشن
- 11.3.3 ادنیٰ الکائین کی اعلیٰ الکائین میں تبدیلی
- 11.3.4 کولب کی برق پاشیدگی
- 11.4 الکائین کے طبعی خواص
- 11.5 الکائین کی کیمیائی خواص
- 11.5.1 ہائیڈرو جنیشن
- 11.5.2 لونجی عناصر سے اضافی تعاملات
- 11.5.3 تماسی آبیدگی
- 11.5.4 دھاتوں کے ساتھ تعامل
- 11.5.5 تکسید
- 11.5.6 سیٹیلین کی تیاری
- 11.5.7 الکائین کی زیر قابو تحویل
- 11.6 سیٹیلین کے استعمالات
- 11.7 اکتسابی نتائج
- 11.8 کلیدی الفاظ
- 11.9 نمونہ امتحانی سوالات

11.0 تمہید

الکائین غیر سیر شدہ دہنی ہائیڈروکاربن (Unsaturated Aliphatic Hydrocarbons) ہوتے ہیں۔ جن میں کم سے کم دو کاربن کے درمیان ایک تہرہ بند موجود ہوتا ہے۔ اس خاندان کے مرکبات کا لاحقہ ”yne“ (Suffix) اور عام ضابطہ C_nH_{2n-2} ہے۔ ایسیٹیلین ایک سادہ الکائین ہے۔ الکائین میں کاربن-کاربن کے درمیان کے تہرہ بند کا طول $1.20 \text{ \AA}$ ہے۔ جو دو ہرے بند اور اکہرے بند سے کم ہوتا ہے الکائین کی ساخت خطی ہوتی ہے۔ ایسیٹیلین میں $H-C-C$ بند کا زاویہ 180° ہوتا ہے۔ الکائینس مقامی ہم ترکیبی (Position Isomerism) کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم رو-ضد رو ہم ترکیبی (Geometrical Isomerism) کا اظہار نہیں کرتے۔

الکائین میں الکین اور الکین کے مقابلے میں ہائیڈروجن جوہروں کی تعداد مزید کم ہوتی ہے۔ ان کا عام ضابطہ C_nH_{2n-2} ہوتا ہے۔ الکائین کا پہلا ممبر ایٹھائن (C_2H_2) ہوتا ہے جو عام طور پر ایسیٹیلین کہلاتا ہے۔ الکائین میں کاربن-کاربن جوہر کے درمیان موجود تہرے بند کا طول $1.20 \text{ \AA}$ ہے اور پھر کاربن-ہائیڈروجن بند کا زاویہ 180° ہوتا ہے۔ ایسیٹیلین کی ساخت خطی (Linear) ہوتی ہیں۔ (شکل-11.1)



11.1 مقاصد

اس اکائی میں طلباء کو الکائین (Alkyne) کی نظام تسمیہ 'الکائین کی تیاری کے عام طریقے جیسے کے ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن اور ڈی ہائیڈرو جنیشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائیگا۔ اسکے علاوہ طلباء کو الکائین کے طبعی اور کیمیائی خواص کے بارے میں بھی بتایا جائیگا۔ آخر میں طلباء کو ایسیٹیلین کی تیاری کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیگی۔

11.2 الکائین کا نظام تسمیہ

الکائین غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن ہیں جن میں دو کاربن-کاربن جوہروں کے درمیان کم از کم ایک تہرہ بند $C \equiv C$ - ہوتا ہے۔ اس خاندان کے مرکبات کا لاحقہ "yne" (Suffix) سے ظاہر کیا جاتا ہے

عام طور پر الکائین کو ایسیٹیلین کے مشتق (Derivatives) کے طور پر نام دئے جاسکتے ہیں۔ IUPAC نظام میں انہیں ان کے متعلقہ الکین کے مشتق کی حیثیت سے نام دیا جاتا ہے۔ جہاں ane لاحقہ کو لاحقہ -yne سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ کاربن کی لمبی سیدھی زنجیر کی نوعیت تعداد اور مقام اور کاربن-کاربن تہرے بند (Triple Bond) کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ الکائین کے کچھ عام ارکان کے نام جدول (11.1) میں دئے گئے۔

جدول - 11.1

ساخت	عام نام	IUPAC نام
$HC \equiv CH$	ایسیٹیلین (Acetylene)	(Ethyne)
$H-C \equiv C-CH_3$	میتھائل ایسیٹیلین (Methyl acetylene)	(Propyne)
$H-C \equiv C-C_2H_5$	ایتھائل ایسیٹیلین (Ethyl acetylene)	(1-Butyne)
$H_3C-C \equiv C-CH_3$	ڈائی میتھائل ایسیٹیلین (Dimethyl acetylene)	(2-Butyne)



11.3 الکائین کی تیاری کے عام طریقے

الکائین کو عام طور پر حسب ذیل طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔


11.3.1 ویسل ڈائی ہیلائیڈ سے تیاری

ویسل ڈائی ہیلائیڈ سے مراد جب کسی مرکب میں دو لونجی عناصر (Halogens) دو متعلقہ کاربن جوہر پر موجود ہوں اور اگرچہ دو لونجی عناصر کی ایک مرکب میں ایک ہی کاربن پر موجود ہوں تو جمنائی ڈائی ہیلائیڈ (Gem-dihalides) کہلاتے ہیں۔ ویسل ڈائی ہیلائیڈ الکوہلی پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ 'پھر سوڈیم امائیڈ سے تعامل کر کے الکائین بناتے ہیں۔

اس تعامل کو اپناتے ہوئے 1'2-ڈائی برومو پروپین (1,2-Dibromo propane) سے پروپائین (Propyne) کو حاصل کیا جاتا ہے۔



مزید اس تعامل کو اپناتے ہوئے 1'1-ڈائی کلورو پروپین (1,1-Dichloro Propane) سے پروپائین (Propyne) کو حاصل کیا




11.3.2 ٹیٹراہیلوائیڈ کی ہیلوجن برداری

جب ٹیٹراہیلو الکین (1,1,2,2-Tetrahalo Alkane) کو زنک دھات کے ساتھ الکوحل کی موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے تب تعامل کے دوران لوہی عناصر (Halogens) کی رہائی عمل میں آکر الکائین حاصل ہوتے ہیں۔



مثال کے طور پر-Dehalogenation

جب 2,2,3,3-Tetra Chlorobutane کو زنک دھات کے ساتھ الکوحل کی موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے تب 2-بیوٹائین (-2) (Butyne) حاصل ہوتی ہے۔





11.3.3 ادنیٰ الکائین کی اعلیٰ الکائین میں تبدیلی

ادنیٰ الکائین کو سوڈامائیڈ کے ساتھ تعامل کروانے پر سوڈیم ایسیٹلائڈس (Sodium Acetylides) تیار ہوتے ہیں جو پرائمری الکائیل ہیلوائیڈ سے تعامل کر کے اعلیٰ الکائین بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر۔




اس عمل کو ایسیٹیلین (Acetylene) سے 1-بیوٹائین کی تیاری کے ذریعے سمجھایا جاسکتا ہے۔



11.3.4 کولب کی برق پاشیدگی

مرکنز-پوٹشیم میالیٹ یا فو میریٹ کے آبی محلول کی برق پاشیدگی سے اسیٹیلین حاصل ہوتی ہے۔



11.4 الکائین کے طبعی خواص

الکائین کے طبعی خواص بھی الکین اور الکین کی طرح ہوتے ہیں ان کے پہلے تین ممبرس گیس ہوتی ہیں اگلے آٹھ ممبرس مائع ہوتے ہیں اور ان سے بڑے ممبران ٹھوس ہوتے ہیں۔ تمام الکائین بے رنگ اور بغیر بو والے مرکبات ہوتے ہیں لیکن صرف اسیٹیلین (Acetylene) جو ایک مخصوص لہسن کی بو (Garlic Odour) والی ہوتی ہے یہ پانی میں ناعمل پذیر ہوتی ہے۔ لیکن نامیاتی محلول جیسے بینزین (C₆H₆)، کاربن ٹیٹراکلورائیڈ (CCl₄) اور ایٹھر میں حل پذیر ہوتی ہیں۔ کاربن کی تعداد میں اضافے کے ساتھ، الکائین کے نقطہ جوش اور نقطہ امانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل جدول (جدول-11.2) میں الکائین خاندان کے چند سادے کاربن کے نقطہ جوش بتائے گئے ہیں۔

جدول-11.2

الکائین	ضابطہ	نقطہ جوش (°C)
ایسیٹیلین (Acetylene)	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	-83
پروپائین (Propyne)	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	-23
1-بیوٹائین (1-Butyne)	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	9
2-بیوٹائین (2-Butyne)	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	27


40	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	1-پنٹائین (1-Pentyne)
55	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	2-پنٹائین (2-Pentyne)

11.5 الکائین کے کیمیائی خواص

الکائین بھی الکپن کی طرح الکٹران پسند اضافی تعاملات (Electrophilic Addition Reactions) کرنا پسند کرتے ہیں۔ الکائین میں پائے جانے والے کاربن-کاربن تھرے بند کی موجودگی کی وجہ سے یہ اضافی تعاملات میں آسانی سے حصہ لیتے ہیں، الکائین کے کچھ مخصوص تعاملات کو مندرجہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔



11.5.1 ہائیڈروجنیشن

الکائین کو پلاٹینم (Pt)، پالڈیم (Pd) اور نیکل (Ni) دھات کے صفوف کو بطور تماسی عامل استعمال کر کے ہائیڈروجن گیس کی موجودگی میں ہائیڈروجنیشن کرا کے پہلے الکپن اور پھر دوسرے مرحلے میں الکین حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح پروپائین کو دو مرحلوں میں پروپین میں تبدیل کیا جاتا ہے۔





11.5.2 لونجی عناصر سے اضافی تعاملات

الکائین 'لونجی عناصر' (Br_2) اور (Cl_2) سے تعامل کر کے پہلے مرحلے میں ڈائی ہیلو الکپن (Dihalo Alkenes) اور دوسرے مرحلے میں ٹیٹراہیلو الکین (Tetrahalo Alkanes) بناتے ہیں۔




11.5.3 تماسی آبیدگی

مرکیورک سلفیٹ (Mercuric Sulphate) اور مرتکز سلفورک ترشہ کی موجودگی میں الکائین کی آبیدگی کی جاسکتی ہے۔ الکائین میں پانی کے اضافہ سے کاربوناٹیل مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔ اس تعامل کے دوران ایک درمیانی مرکب حاصل ہوتا ہے جو ناسیر شدہ الکوحل ہے جس میں الکپن اور الکوحل دونوں فعلی گروپ موجود ہوتے ہیں اس اضافی مرکب میں حرکی - ہم ترکیبی (Tautomerism) سے کاربوناٹیل مرکب حاصل ہوتا ہے۔



11.5.4 دھاتوں کے ساتھ تعامل


الکائین سلور اور کیوپرس نمکیات کے امونیائی محلولات کے ساتھ تعامل کر کے دھاتی الکائینائیڈز کا رسوب بناتے ہیں۔ اس تعامل کو مختلف قسم کے الکائین کی پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایسیٹیلین کا تعامل سلور نائیٹریٹ (AgNO_3) اور امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (NH_4OH) کے ساتھ کروانے پر سلور ایٹالائیڈ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے اور Cuprous Chloride & Ammonium Hydroxide کے ساتھ تعامل کر کے کیوپرس ایسیٹائیڈ کا سرخ رسوب (Red ppt) حاصل ہوتا ہے۔




Acetylene

سرخ رسوب

الکائین قلوئی دھاتوں کے ساتھ بھی نمکیات بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسیٹیلین امونیائی موجودگی میں سوڈیم دھات کے ساتھ تعامل کر کے سوڈیم ایسیٹائیڈ بناتا ہے۔ جس میں آسانی سے آب باشیدگی کا عمل ہوتا ہے۔




Acetylene




11.4.5 تفسید (Oxidation)

ایسٹیلین 'پوٹاشیم پر میگنیٹ کی موجودگی میں تفسید پا کر پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتی ہے اس تعامل کے دوران درمیانی مرکبات این ڈائی اول (Enediol) گلائی آکسال (Glyoxal) اور آکزیلیک ترشہ (Oxalic Acid) حاصل ہوتا ہے۔




قلوی پوٹاشیم پر میگنیٹ ایسٹیلین کی تفسید کر کے اسکو آکزیلیک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ اس تعامل کو KMnO_4 کی رنگ جانش کے لیے ٹیسٹ کے طور پر کیا جاتا ہے۔



11.5.6 ایسٹیلین کی تیاری


تمام الکائین میں ایسٹیلین انتہائی صنعتی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ کیلشیم کاربائیڈ پر پانی کے اثر سے (آب پاشیدگی) سے ایسٹیلین کو تیار کیا جاتا ہے۔



Acetylene

11.5.7 الکائین کی زیر قابو تحویل

الکائین کے زیر قابو تحویل (Controlled Reduction) پر الکپن حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کے لیے الکائین (Alkynes) میں تماسی ہائیڈروجنانے (Catalytic Hydrogenation) سے Cis جیومیٹری والے الکپن حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسیٹیلین (Acetylene) کو (Pd-C) کی موجودگی میں تماسی ہائیڈروجنانے پر ایتھیلین (Ethylene) حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح 2-بیوٹائین (2-Butyne) کو تماسی ہائیڈروجنیشن سے 2-Cis-2-بیوٹین (Cis-2-Butene) حاصل ہوتی ہے۔



11.6 اسیٹیلین کے استعمالات

- 1- آکسی اسیٹیلین شعلہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے جو اشیاء کو کاٹنے اور ویلڈنگ میں استعمال ہوتی ہے۔
- 2- وینائل پلاسٹک کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- دوسرے کاربن کے مرکبات جیسے 'ایٹائلڈ ہیپٹائیڈ' 'اسیٹک ایسڈ' 'ایٹھنائیل الکوحل'، 'بنیزین وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔
- 4- محلل جیسے 'Westron (Acetylene Tetrachloride)' 'Westrol (Trichlorethylene)' کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 5- Haker's Slamp اور روشنی گھر (Light House) میں منور کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 6- Polyacetylene کی فلم بیڑی میں برقیہ کے طور پر کام کرتے ہیں جیسا کہ یہ "بہتر موصل" ہے یہ اور سستے ہوتے ہیں۔

11.7 اکتسابی نتائج

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے الکائین کی نظام تسمیہ ' الکائین کی تیاری کے عام طریقے جیسے کے ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن اور ڈی ہائیڈرو جنیشن کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ اسکے علاوہ طلباء نے الکائین کے طبعی اور کیمیائی خواص کے بارے میں بھی مکمل جانکاری حاصل کی۔ آخر میں طلباء نے اسیٹیلین کی تیاری کے طریقہ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔

11.8 کلیدی الفاظ

- 1- الکائین: الکائین غیر سیر شدہ دہنی ہائیڈروکاربن ہوتے ہیں۔
- 2- اسیٹیلین: الکائین کا پہلا ممبر اسیٹیلین ہے جسکو عام طور پر ایتھائین بھی کہتے ہیں۔ الکائین میں کاربن-کاربن جوہر کے درمیان موجود تہرے بند کا طول $1.21 \text{ \AA}$ ہے اور کاربن-ہائیڈروجن بند کا زاویہ 180° ہوتا ہے۔ اسیٹیلین کی ساخت خطی ہوتی ہے۔ یہ مقامی ہم ترکیبی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔
- 3- وینسل ڈائی ہیلائیڈ: وینسل ڈائی ہیلائیڈ سے مراد جب کسی مرکب میں دولونجی عناصر دو متعلقہ کاربن جوہر پر موجود ہوں۔
- 4- جمنائی ڈائی ہیلائیڈ: اگرچہ دولونجی عناصر کی ایک مرکب میں ایک ہی کاربن پر موجود ہوں تو جمنائی ڈائی ہیلائیڈ (Gem-dihalides) کہتے ہیں۔

11.9 نمونہ امتحانی سوالات

معروضی جوابات کے حامل سوالات

- 1- الکائین میں کونسا بند پایا جاتا ہے۔
- 2- کیلشیم کاربائیڈ کی پانی کے ساتھ تعامل کرنے پر کونسی گیس حاصل ہوتی ہے۔
- 3- الکائین برومین کے ساتھ ایڈیشن ریکشن (Addition reaction) کر کے ایک بے رنگ مرکب بناتا ہے۔ اس کا نام لکھیے۔
- 4- 1-Butyne کی ساخت بنائیے۔
- 5- الکائین میں کاربن-کاربن جوہر کے درمیان موجود تہرے بند کا طول کتنا ہوتا ہے؟
- 6- الکائین کون سے محل میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

- 1- مندرجہ ذیل تعاملات کو ایک مساوات دے کر بیان کیجیے۔

Hydrogenation (b) Dehydrohalogenation (a)

2- مندرجہ ذیل کی تعریف مساوات و مثال دے کر بیان کیجیے۔

(a) ڈی ہیلوجینیشن (b) ہائیڈریشن

3- ایسٹیلین کی تیاری کو بیان کیجیے۔

4- الکائین کے طبعی خواص کو بیان کیجیے۔




طویل جوابات کے حامل سوالات

1- الکائین کے بنانے کے طریقوں کو مع مثالوں کے لکھیے۔ ایسٹیلین سے 1-بیوٹائین (1-Butyne) کو حاصل کرنے کے لیے مساوات لکھیے۔

2- الکائین کے حسب ذیل تعاملات پر روشنی ڈالیے۔

(a) تماسی آبیدگی (b) دھاتوں کے ساتھ تعامل

3- مندرجہ ذیل ریاکشن کو مکمل کیجیے۔



اکائی - 12: سائیکلو الکیئس

(Unit-12: Cycloalkanes)


اکائی کے اجزا

تمہید	12.0
مقاصد	12.1
سائیکلو الکیئس کا نظام تسمیہ	12.2
سائیکلو الکیئس بنانے کے طریقے	12.3
12.3.1 فراونڈ طریقہ	
12.3.2 ڈائی کاربو آکزیلیک ایسڈ کے بیریم یا کیلشیم نمک سے۔ (Wislicenus Method)	
12.3.3 ڈیکمین طریقہ	
12.3.4 بینزین کی تھامی تعامل	
بیرکٹناؤ کا نظریہ	12.4
بیرکٹناؤ کے حق میں ثبوت	12.5
بیرکٹناؤ کے حدود	12.6
سیس مور کا نظریہ	12.7
اکتسابی نتائج	12.8
کلیدی الفاظ	12.9
نمونہ امتحانی سوالات	12.10

12.0 تمہید

سائیکلو الکیئس، سیر شدہ ہائیڈروکاربن ہیں جن میں کاربن جوہر آپس میں شریک گرفت بند سے جڑ کر ایک حلقہ بناتے ہیں۔ ان کو Alicyclic Compounds بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دھنی مرکبات (Aliphatic Compounds) سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان مرکبات کا عام ضابطہ C_nH_{2n} ہے جہاں n کاربن جوہر کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ سائیکلو الکیئس کا پہلا میمبر سائیکلو پروپین ہے جس میں

کاربن جوہر کی تعداد تین ہے۔ ان مرکبات کو پولی میتھالین (Polymethylene) بھی کہا جاتا ہے۔ سائیکلو الکیٹن مرکبات کی چند مثالیں اور ان کی ساختیں مندرجہ ذیل ہیں۔ (شکل-12.1)



شکل-12.1


12.1 مقاصد

اس اکائی کے مطالعہ کرنے کا مقصد سائیکلو الکیٹن کی تفصیلی جانکاری حاصل کرنا، مثال کے طور پر، ان کے تسمیہ نظام، ان کی تیاری کے مختلف طریقے، بیرکاتناؤ کا نظریہ اور سرموہر کا نظریہ۔

12.2 سائیکلو الکیٹن کا نظام تسمیہ

مندرجہ ذیل کلیات کی مدد سے سائیکلو الکیٹن کا نام لکھ سکتے ہیں۔


- ایک سیر شدہ یک حلقی مرکب کا نام اس کے متعلقہ سیدھی زنجیر والے الکیٹن سے پہلے سابقہ سائیکلو لگا کر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ (شکل-12.2)



شکل-12.2


- اگر دو یا زائد الکیل یا دوسرے متمائل بدلی (Substituents) حلقے میں موجود ہوں، تو ان کے مقام کو عربی کے اعداد (Arabic Numeral) سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے 1,2,3,4 وغیرہ۔ وغیرہ۔ حلقے میں موجود کاربن جوہر سے منسلک مختلف Substituent's

کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے گنتی حروف تہجی (Alphabetical Order) میں کی جاتی ہے۔ بشرطہ کہ Lowest Sum Rule کے تابع ہو مثال کے طور پر۔ (شکل-12.3)




شکل-12.3

- اگر حلقہ میں کاربن جوہر کی تعداد حلقہ سے منسلک جانبی زنجیر (Side Chain) میں موجود کاربن سے زیادہ یا اس کے مساوی ہو، تو، الکیل گروپ Substituent گروپ کی طرح برتاؤ کریگا، ورنہ پھر سائیڈو گروپ Substituent گروپ کی طرح لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ (شکل-12.4)




شکل-12.4

- اگر جانبی زنجیر میں فعالی گروپ موجود ہو، تو Substituent•Alicyclic Ring کی طرح کام کرتی ہے، چاہے حلقہ کی جسامت کچھ بھی ہو۔ اور گنتی جانبی زنجیر میں اس سمت سے کریں گے جس سے فعالی گروپ کو کم سے کم نمبر حاصل ہو۔ (شکل-12.5)



شکل-12.5


اگر حلقہ میں دونوں فعالی گروپ اور جانبی زنجیر بھی موجود ہو، تو، گنتی حلقہ میں اس سمت سے کریں گے جس سے فعالی گروپ کو کم سے کم نمبر حاصل ہو۔ لیکن نام لکھتے وقت جانبی زنجیر کو پہلے لکھا جائیگا۔ (شکل-12.6)



3-Methylhexan-1-ol

شکل-12.6

اگر کسی مرکب میں دو حلقے ایک ساتھ موجود ہوں، جن میں سے ایک سائیکلو اور ایک بینزین حلقہ ہو تو، سائیکلو حلقہ Substituent کی طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ (شکل-12.7)



Cyclohexylbenzene

شکل-12.7


12.3 سائیکلو الکینس بنانے کے طریقے

سائیکلو الکینس بنانے کے مختلف طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔


12.3.1 Freund طریقہ سے

اس طریقہ میں ٹرمینل ڈائی الکائیل ہیلائیڈ (Terminal Dialkyl halide) کی سوڈیم یا زنک دھات کے ساتھ تعامل

کرا کر کے سائیکلو الکین حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ورتز تعامل کا ہی دوسرا حلیہ ہے۔ اس لیے اس کو Internal Wurtz Reaction کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔




12.3.2 ڈائی کاربو آکزیلیک ایسڈ کے بیریم یا کیلشیم نمک سے۔ (Wislicenus Method)
 اس تعامل میں بیریم یا کیلشیم اڈیپیٹ کو گرم کر کے سب سے پہلے کیٹون کی تشکیل کی جاتی ہے جو مزید کلیمینسن تحویل کی مدد سے سائیکلو الکین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔




12.3.3 ڈیکمین تعامل کی مدد سے

اس تعامل میں سب سے پہلے ڈائی کاربو آکزیلیک ایسڈ کا ایسٹر سوڈیم دھات کے ساتھ تعامل کر کے بیٹا کیٹو ایسٹر کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا کیٹو ایسٹر آب پاشیدگی اور تحویل کا عمل کے ذریعہ متعلقہ سائیکلو الکین بناتا ہے۔



12.3.4 بینزین کی تماس کی موجودگی میں تحویل

بینزین کو نیکل تماس کی موجودگی میں گرم کرنے پر سائیکلو ہیکزین حاصل ہوتا ہے۔



12.4 بیرتناؤ کا نظریہ

Van't Hoff اور Le Bel نے کاربن کی چار سطحی جیومیٹری کو تجویز کیا۔ ایک کاربن جوہر جو کہ دوسرے چار کاربن جوہر سے منسلک ہو، چار سطحی جیومیٹری رکھتا ہے۔ اور ان کاربن کے درمیان بند زاویہ $109^\circ.28'$ ہوتا ہے۔ بیر نے مختلف سائیکلو الیکن کے لیے مختلف بند زاویہ کا مشاہدہ کیا اور ان کے مختلف خصوصیات اور ان کی مختلف استحکامیت کا بھی مشاہدہ کیا۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر Adolf von Baeyer نے اس نظریہ کو 1885 میں تجویز کیا۔ یہ نظریہ سائیکلو الیکن کی عاملیت اور استحکامیت کو بیان کرتا ہے۔ اس نظریہ کے اہم مفروضات مندرجہ ذیل ہیں۔

- سبھی حلقی نظام ایک سطح (Plane) میں ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سائیکلو الیکن میں بند زاویہ $109^\circ.28'$ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی عام چار سطحی زاویہ کے مساوی نہیں ہوتا ہے۔
- عام چار سطحی زاویہ سے انحراف کی وجہ سے کسی بھی سالمہ میں تناؤ پیدا ہوتا ہے جو کہ سائیکلو الیکن کی استحکامیت کو کم کر دیتا ہے۔ اس تناؤ کو زاویہ تناؤ (Angle Strain) کہتے ہیں۔

- جتنا زیادہ عام چار سطحی زاویہ سے انحراف ہوگا، اتنا ہی زیادہ Angel Strain پیدا ہوگا، اور سالمہ میں اتنی ہی استحکامیت میں کمی آگئی جس سے سالمہ کی عاملیت میں اضافہ ہوگا اور سالمہ کی دھن کی گرمی (Heat of Combustion) میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔

- جتنا زیادہ، حلقی نظام میں استحکامیت ہوگی، اتنا ہی آسانی سے اس کی تشکیل ہوگی۔
- بڑے حلقے والے نظام میں منفی تناؤ ہوتا ہے اس لیے وہ سالمہ نظام میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔
- زاویہ تناؤ (Angle Strain)

بیر نے مندرجہ ذیل ضابطہ کی مدد سے Angle Strain محسوب کرنا بتایا۔




$$\text{Deviation} = (\text{Normal Tetrahedral Bond Angle}) - (\text{Actual Bond Angle})$$


مثال کے طور پر۔ سائیکلو پروپین میں بند زاویہ 60° ہے۔ اور عام سطحی بند زاویہ 109.5° ہے۔ اس لیے، بند زاویہ میں انحراف

$$(\text{Deviation}) (\text{شکل-12.8})$$


$$109.5^\circ - 60^\circ = 49.5^\circ$$

$$\text{Angle Strain} = 49.5^\circ / 2 = 24.75^\circ$$







Cyclopropane



Cyclobutane



Cyclopentane



Cyclohexane

شکل-12.8

مثبت زاویہ تناؤ سے یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بند زاویہ عام سطحی زاویہ کے مقابلہ Compressed ہوتا ہے جب کہ منفی زاویہ تناؤ ظاہر کرتا ہے کیونکہ بند زاویہ عام سطحی زاویہ کے مقابلہ Expand ہوتا ہے۔ زاویہ تناؤ کے عدد سے یہ کسی بھی سالمہ میں موجود تناؤ اور اس کی استحکامیت کا پتا کر سکتے ہیں۔ زاویہ تناؤ کے ساتھ موجود منفی یا مثبت نشان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ (جدول 12.1)

جدول 12.1

Compound	Bond Angle	Deviation	Angle strain
Cyclopropane	60°	49.5	24.75°
Cyclobutane	90°	19.5	9.75°
Cyclopentane	108°	1.5	0.75°
Cyclohexane	120°	10.5	-5.27°

بیر تناؤ کے مطابق، سائیکلو پینٹین میں بند زاویہ 108° ہے جو کہ عام چار سطحی کے بند زاویہ کے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے اس سالمہ میں تناؤ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سالمہ بہت زیادہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اور تعامل کے دوران حلقہ بھی نہیں کھولتا ہے۔ سائیکلو ہیکزین میں زاویہ تناؤ سائیکلو پینٹین کے مقابلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کاربن جو ہر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سالمہ میں تناؤ بڑھتا ہے۔ اس لیے بیر کے مطابق، سائیکلو ہیکزین اور اعلی سائیکلو الکین کی مستحکیت (Stability) گھٹتی ہے اور عاملیت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس، یہ مشاہدہ ہوا کی سائیکلو ہیکزین جس میں زیادہ تناؤ ہے، وہ سائیکلو پینٹین سے کم مستحکم ہونا چاہیے اور حطا کہ اعلی سائیکلو الکین نظام میں بھی نہیں پایے جاتے۔ لیکن بعد میں یہ مزید مطالعہ کے بعد یہ مشاہدہ کیا گیا کہ سائیکلو الکین زیادہ مستحکم ہیں اور یہ اضافی تعامل بھی نہیں کرتے بلکہ تبادل تعاملات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح بیر تناؤ نظریہ صرف تین اراکین کی مستحکیت کو ہی تفصیل سے بیان کر سکا۔ اور سائیکلو ہیکزین اور دیگر اعلی اراکین کو سمجھانے میں بھی ناکامیاب رہا۔

پہلے چار اراکین کی مستحکیت کا سلسلہ

جدول 12.1 کے مطابق،

مختلف سائیکلو الکین کی مستحکیت کا بڑھتا سلسلہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔

Cyclopentane > Cyclohexane > Cyclobutane > Cyclopropane.

لیکن یہ سلسلہ اور مزید مطالعہ کرنے پر غلط ثابت ہوا۔

12.5 بیر تناؤ کا نظریہ کے حق میں ثبوت

بیر کے نظریہ کے مطابق، سائیکلو پروپین اور سائیکلو بیوٹین flat سالمات ہیں جن میں بند زاویہ 60° اور 120° ہے جو کہ عام چار سطحی بند زاویہ سے بہت زیادہ انحراف رکھتے ہیں اس لیے بہت کم مستحکم ہیں۔ اور ان سالمات کا حلقہ بھی آسانی سے کھل جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان میں اضافی تعاملات ممکن ہے۔

بیر نے مانا کہ سائیکلو پینٹین Planar سالمہ ہے، کیونکہ اس میں بند زاویہ چار سطحی سالمے بہت ہی نزدیک ہے۔

12.6 بیر تناؤ کی محدودیات

بیر کے نظریہ کے مطابق،


- بیر تناؤ نظریہ بڑے حلقے والے نظام میں زاویہ تناؤ کو نہیں سمجھاسکا۔
- سائیکلو پینٹین، سائیکلو ہیکزین کے مقابلہ زیادہ مستحکم ہونا چاہیے، لیکن سائیکلو ہیکزین اور اعلیٰ اراکین زیادہ مستحکم پائے گئے۔ دہن کی گرمی (Heat of Combustion) کے عدد سے بھی یہ ثابت ہوا کہ سائیکلو پینٹین، سائیکلو ہیکزین اور سائیکلو ہپٹین کی مستحکیمیت مساوی ہے۔
- بڑے حلقے والے اراکین Planar نہیں ہیں بلکہ ان کی ساخت Puckered ہے۔

12.7 سیس مور نظریہ (Sachse Mohr 's Theory)


اس نظریہ کو حلقہ کا بنناؤ والا نظریہ (Theory of Strain less Rings) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سیس اور مور نے 1918 میں سائیکلو ہیکزین اور دیگر اعلیٰ سائیکلو الکیں جیسے سائیکلو ہپٹین وغیرہ کی مستحکیمیت کو بیان کرنے کے لیے اس نظریہ کو پیش کیا۔ جو کہ بیر تناؤ نظریہ پیش نہیں کر سکا کیونکہ بیر نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ سبھی سائیکلو الکیں ایک ہی سطح میں ہوتے ہیں۔

سیس اور مور نظریہ کے مطابق، سبھی سائیکلو الکیں تناؤ سے آزاد ہوتے ہیں اور زیادہ مستحکیمیت رکھتے ہیں۔ سیس اور مور نے مشاہدہ کیا کہ سائیکلو الکیں کی ساخت Puckered ہوتی ہے اس لیے ان میں عام چار سطحی زاویہ $109^{\circ}.28'$ برقرار رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ تناؤ سے آزاد ہوتے ہیں۔ سیس اور مور نظریہ کے مطابق، سائیکلو ہیکزین کے لیے دو ممکن ساخت کرسی نما (Chair Form) اور ناو نما (Boat Form) مندرجہ ذیل ہیں۔

ناو نما ساخت میں، کاربن 2,3,5 اور 6 ایک ہی سطح میں پائے جاتے ہیں اور کاربن 1 اور 4 سطح کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ جبکہ کرسی نما ساخت میں کاربن جوہر 2,3,5 اور 6 ایک ہی سطح میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کاربن 1 اور 4 سطح کے اوپر موجود ہوتا ہے اور کاربن 1 سطح کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ (شکل-12.9)



Boat form of Cyclohexane



Chair form of Cyclohexane : 12.9 - شکل

کری نما ساخت، ناؤ نما ساخت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے اور یہ آپس میں آسانی سے ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

12.8 اکتسابی نتائج

اس اکائی کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم مندرجہ ذیل کی تفصیل سے جانکاری حاصل کریں گے۔

- سائیکلو الکیں کا نظام تسمیہ کے کلیات کی تفصیل سے جانکاری۔
- سائیکلو الکیں کیا ہیں اور ان کو تیاری کے مختلف طریقوں کی جانکاری۔
- سائیکلو الکیں کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کا علم۔
- بیرتناؤ کا نظریہ اور سیر مور نظریہ کی تفصیلی جانکاری۔

12.9 کلیدی الفاظ

- سیر شدہ ہائیڈروکاربن : وہ ہائیڈروکاربن جن میں کاربن جو ہر آپس میں یک بند سے جڑے ہوتے ہیں۔
- گرفت: ایک کاربن جو ہر دوسرے کاربن جو ہر سے چار شریک گرفت بناتا ہے۔ جملہ بنے چار بند کو گرفت کہتے ہیں۔

- ڈیکمین تعامل: اس کا استعمال سائیکلو ہائیڈروکاربن بنانے میں کیا جاتا ہے۔
- کلیمینسن تحول: اس کا استعمال کاربونل گروپ کو میتھیلیلن گروپ (Methylene Group) میں تبدیل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- بیرتناؤ نظریہ: اس کو روڈولف نام کے سائنسدان نے دیا۔


12.10 نمونہ امتحانی سوالات

معروضی سوالات

1. Alicyclic مرکبات کی تعریف لکھیے۔
2. Methyl cyclobutane اور Ethyl cyclohexane کی ساخت بنائیے۔
3. Freund Reaction کی ایک مثال لکھیے۔
4. Dieckman Reaction کی ایک مثال لکھیے۔
5. بیرتناؤ نظریہ کو کس سائنسدان نے پیش کیا۔

مختصر جوابات کے حامل سوالات

1. مندرجہ ذیل مرکبات کے IUPAC نام لکھیے۔



2. مندرجہ مرکبات کی ساخت بنائیے۔

4- Cyclobutyl Pentan-1-ol, Cyclohexanone, 2-Propylcyclopentane, 1,1-Dimethyl Cyclopentane, 2-Ethyl-1-Methyl Cyclopentane.

3. سائیکلو الکین بنانے کے دو طریقوں کو مساوات دے کر لکھیے۔
4. سائیکلو الکین کی کیمیائی خصوصیات کو کیمیائی مساوات کے ساتھ لکھیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

1. سائیکلو الکین کیا ہیں۔ ان کے بنانے کے مختلف طریقوں کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔
2. سائیکلو الکین کو ڈیکمین اور فروند تعاملات سے کیسے تیار کریں گے۔ ان کی کیمیائی خصوصیات بھی لکھیے۔
3. بیرتناؤ کے نظریہ کے مفروضات کو لکھیے۔
4. سیس مور کے نظریہ کو مثال دے کر بیان کیجیے۔

1. Organic Chemistry, Vol-I. I.L Finar, Pearson, 9th Edition, 2015, Pearson Books.
2. Organic Chemistry by P. L. Soni, H. M. Chawla, 2012. Sultan Chand & Sons.
3. General Organic Chemistry, Vol-1 & 2, by Sachin Kumar Ghosh, 2020, New Central Book Agency P Ltd.
4. Organic Chemistry by B. S. Bahl Arun Bahl, 2020, S Chand & Co Ltd
5. Organic Chemistry by L.G Wade 8th Edition, 2016, Pearson Publication.
6. Text Book of Organic Chemistry by Bruice Yuranis Powla. 2020, Pearson Education India.
7. Text book of Organic Chemistry by Morrison and Boyd, 7th edition. 2010. Pearson Education India.
8. Text Book of Organic Chemistry by C.N. Pillai, 2024. Taylor & Francis Inc.

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

B. Sc. II Semester Examination, April / May 2025

Paper Code – BNCH201DCT

Paper: Organic Chemistry – 1

پرچہ: نامیاتی کیمیا - 1

Time/ گھنٹے: 3: وقت / Hours

Maximum Marks/ جملہ نشانات: 50

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر / کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی

ہے۔ ہر سوال کے لیے 01 نمبر مختص ہے۔ (1 x 10 = 10 Marks)

2. حصہ دوم میں چھ 06 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100)

لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔ (4 x 5 = 20 Marks)

3. حصہ سوم میں 3 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 2 سوال کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو


(250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (2 x 10 = 20 Marks)

حصہ اول

سوال 1

i. Propene میں ہر ایک کاربن پر Hybridization بتائیے۔


ii. مندرجہ ذیل کا IUPAC نام لکھیے۔



iii. Hyperconjugation کا دوسرا نام لکھیے۔

iv. ایک Nucleophile کی مثال لکھیے۔

v. مندرجہ ذیل کے لیے E / Z بتائیے۔



- .vi Angle of Rotation کو ناپنے والے Instrument کا نام لکھیے۔
- .vii Clemmensen Reduction کی ایک مثال لکھیے۔
- .viii Dehalogenation Reaction کی ایک مثال لکھیے۔
- .ix کیا ہوتا ہے جبکہ کیلشیم کاربائیڈ پانی کے ساتھ تعامل کرتا ہے؟
- .x Baeyer Strain نظریہ کے ناکام ہونے کی وجہ لکھیے۔

حصہ دوم

2. Inductive Effect کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی دو Applications لکھیے۔
3. گمک پر مختصر نوٹ لکھیے۔
4. آزاد اعلیٰ (Free Radical) کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی Stability کو بھی بیان کیجیے۔
5. نامیاتی مرکبات میں ہم ترکیبیت (Isomerism) کی تعریف بیان کیجیے۔ اور ساختی ہم ترکیبیت (Structural Isomerism) کو ایک ایک مثال دے کر بیان کیجیے۔
6. مارکونیکوف کلیہ کی تعریف دو مثال دے کر بیان کیجیے۔
7. Kolbe Electrolysis سے Ethane بنانے کے طریقہ کو بیان کیجیے۔

حصہ سوم

8. مندرجہ ذیل مرکبات کی ساخت بنائیے۔
Neopentane, Isohexane, Propanal, 2-Pentanone, 3-Heptyne, 2-Butene, 2-Propanol, Diethylether, Ethyl methylamine, Ethylmethyl ketone
9. مندرجہ ذیل کی تعریف مع مثال کے کیجیے۔

Racemic mixture, Mesocompounds, chiral carbon, Diastereomers, Enantiomers

10. مندرجہ ذیل کو ایک ایک مثال دے کر بیان کیجیے۔

Grignard Reaction 'Wurtz reaction' Dehydrohalogenation, Hydration, Saytzeff rule



BNCH201DCP

لیب مینوئل

(Lab Manual)

اکائی-1

- سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ کی تیاری
- نامیاتی مرکبات میں نائٹروجن کی جانچ
- نامیاتی مرکبات میں سلفر کی جانچ
- نامیاتی مرکبات میں "جب سلفر اور نائٹروجن دونوں موجود ہوں" عناصر کی جانچ
- نامیاتی مرکبات میں ہیلوجن عناصر کی جانچ

اکائی - 1: سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ کی تیاری

(Preparation of Sodium Fusion Extract)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب کی مدد سے سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ (Lassaigne's Extract) کی تیاری

آلات اور کیمیائی اشیاء

اشتعالی نلی، ٹیسٹ ٹیوب، چائناڈش، تقطیری کاغذ، گلاس چھڑی، قیف، فور سیپ، اسٹینڈ، کیمیائی اشیا 'سوڈیم دھات، کشیدہ آب (water)، نامیاتی مرکب

طریقہ کار

- 1- ایک صاف شفاف خشک فیوژن ٹیوب لیں اب اس میں تقطیری کاغذ کی مدد سے خشک کیا گیا چھوٹا سا سوڈیم دھات کا ٹکڑا ڈالیں۔
- 2- اس فیوژن ٹیوب کو ہولڈر کی مدد سے پکڑ کر گرم کریں تاکہ سوڈیم دھات ایک چمکدار کرہ میں تبدیل ہوتی نظر آئے۔ کرہ کی طرح دکھائی دینے لگے۔
- 3- اب اس میں دیا ہوا نامیاتی مرکب ڈالیں اور دوبارہ گرم کریں۔ فیوژن ٹیوب کو پہلے ہلکا گرم پھر تیز گرم کریں جب تک کہ ٹیوب سرخ نہ ہو جائے۔
- 4- اس گرم کی گئی ٹیوب کو پہلے ایک چائناڈش میں جس میں تھوڑا کشیدہ آب پہلے سے لیا گیا ہو اس میں ڈبو دیں اور گلاس چھڑی کی مدد سے فیوژن ٹیوب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔
- 5- جب یہ محلول خوب اچھی طرح ابل جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں اور ایک ٹیسٹ ٹیوب پر قیف رکھ کر اس پر تقطیری کاغذ لگا کر تیار کر لیں۔ اب ٹھنڈا کیا ہوا محلول کو چھان لیں۔
- 6- ٹیسٹ ٹیوب میں حاصل شدہ محلول سوڈیم دھات اور نامیاتی مرکب کا تیار کردہ لسانین نچوڑ ہے۔ یہی فلٹریٹ لسانین ایکسٹریکٹ کہلاتا ہے۔

7۔ اب اس محلول کی مدد سے دیے گئے نامیاتی مرکب میں موجودہ کلورین، برومین، آیوڈین، سلفر نائیٹروجن کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔

8۔ جب ہر محلول خوب اچھی طرح اہل جائے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں اور ایک تقطیری کاغذ لگا کر ایک ٹیسٹ ٹیوب تیار کر دیں اور اس محلول کو چھان لیں۔

9۔ حاصل کیا ہوا محلول سوڈیم دھات اور نامیاتی مرکب کا تیار لسانین نچوڑ ہے۔ حاصل کردہ محلول لسانین کا نچوڑ محلول ہے۔

نامیاتی مرکبات میں نائٹروجن کی جانچ

(Detection of Nitrogen)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب میں نائٹروجن عنصر کی موجودگی کی جانچ کرنا لیسامین نچوڑ کو استعمال کرتے ہوئے

آلات

امتحانی ٹلی، ہولڈر، برنر

کیمیائی اشیاء

فیرس سلفیٹ کا محلول، فیرک کلورائیڈ کا محلول، مرکنز ہائیڈروکلورک ایسڈ، لیسامین کا محلول





طریقہ کار

اس تجربہ کو کرنے سے پہلے دیے گئے نامیاتی مرکب کی مدد سے لیسامین کا محلول یا نچوڑ تیار کرنا ہوگا اس کے بعد مندرجہ ذیل تجربہ کرنا ہوگا۔

سلسلہ نمبر	تجربہ	مشاہدہ	نتیجہ
1	ایک اجانچ نلی میں تھوڑا سا لیسامین محلول لیں اور اس میں 2 ملی لیٹر فوری تیار کردہ فیرس سلفیٹ محلول ملائیں اور جانچ نلی کو گرم کریں۔ اب اس میں دو یا تین قطرے فیرک کلورائیڈ محلول اور چند قطرے مرکنز ہائیڈروکلورک ایسڈ (Conc. HCl) کے ڈالیں	پرشین بلیورنگ (Prussian Blue colour) نظر آتا ہے۔	N عنصر کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس تجربہ میں جو کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں۔ ذیل میں درج کیے گئے ہیں۔

Chemical Reactions



نامیاتی مرکبات میں سلفر کی جانچ

(Detection of Sulphur)

مقصد

دیے گئے ہوئے نامیاتی مرکب میں سلفر عنصر کی جانچ کی موجودگی کی جانچ کرنا لیسائیٹن نچوڑ کو استعمال کرتے ہوئے۔

آلات

امتخانی نلی، برنز

کیمیائی اشیاء

لسائیٹن محلول، سوڈیم نائٹروپروسائیڈ، لیڈ لیسائیٹ محلول، ایسیٹک ایسڈ

طریقہ کار

اس تجربہ کو کرنے سے پہلے دیے گئے نامیاتی مرکب کی مدد سے لیسائیٹن کا محلول تیار کرنا ہو گا اسکے بعد مندرجہ ذیل تجربہ کرنا ہو گا۔



سلسلہ نمبر	تجربہ	مشاہدہ	نتیجہ
1	سوڈیم نائٹروپروسائیڈ جانچ (Sodium Nitroprusside Test): ایک امتخانی نلی میں تھوڑا سا لیسائیٹن نچوڑ محلول لیں۔ اب اس میں چند قطرے سوڈیم نائٹروپروسائیڈ ملائیں اور مشاہدہ کریں۔	جامنی رنگ (Purple Colour) نظر آتا ہے	S عنصر کی تصدیق کرتا ہے۔
2	لیڈ لیسائیٹ (Lead acetate) جانچ ایک امتخانی نلی میں تھوڑا سا لیسائیٹن	سیاہ رنگ کا تریسیبی مادہ بنتا ہے	S عنصر کی تصدیق کرتا ہے۔

		نچوڑ محلولیں۔ اب اس محلول میں چند قطرے ایسٹک ایسڈ (Acetic acid) اور پھر لیڈ ایسٹٹ محلول (Lead acetate) کے ڈالیں اور ہلائیں۔	
--	--	--	--

اوپر بیان کردہ تجربات میں ہوئے کیمیائی تعاملات ذیل میں درج کئے گئے ہیں۔

کیمیائی تعامل

Chemical Reactions



نامیاتی مرکبات میں "جب سلفر اور نائیٹروجن دونوں موجود ہوں" عناصر کی جانچ

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکبات میں "جب سلفر اور نائیٹروجن دونوں موجود ہوں" عناصر کی جانچ کرنا لیسائیٹن نیچوڑ کو استعمال کرتے ہوئے۔

آلات



ٹیسٹ ٹیوب، برنر

کیمیائی اشیاء

لسائیٹن محلول، پوٹاشیم سلفو سائیٹائیڈ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ	سلسلہ نمبر
دونوں N اور S عناصر کی تصدیق کرتا ہے۔	خون جیسا لال رنگ (Blood red colour) نظر آتا ہے۔	ایک امتحانی ٹی میں تھوڑا سا لیسائیٹن نیچوڑ محلول لیں - اب اس میں چند قطرے پوٹاشیم سلفو سائیٹائیڈ (KSCN) کے ملائیں اور ہلایں۔	1

Chemical Reactions



نامیاتی مرکبات میں ہیلوجن عناصر کی جانچ

(Detection of Halogen Elements)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب میں ہیلوجن عناصر کی جانچ کی موجودگی کی جانچ کرنا لیسائن نچوڑ کو استعمال کرتے ہوئے۔

آلات

ٹیسٹ ٹیوب، برنر

کیمیائی اشیاء

لسائن کا محلول، نائٹریک ایسڈ، سلور نائٹریٹ، کاربن ڈائی سلفائیڈ



سلسلہ نمبر	تجربہ	مشاہدہ	نتیجہ
(Silver nitrate Test) سلور نائٹریٹ جانچ			
1	ایک امتحانی ٹی میں 2 ملی لیٹر لسائن نچوڑ محلولیں۔ اب اس میں ایک ملی لیٹر مرتکز نائٹریک ایسڈ ڈالیں اور خوب تیز ابال لیں اور پھر اس محلول کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب یہ محلول ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک ملی لیٹر (1ml) سلور نائٹریٹ (Silver nitrate) محلول ملائیں۔	سفید رنگ کا ترسیبی مادہ بنتا ہے جو کہ امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (NH ₄ OH) میں حل پذیر ہے	Cl عنصر کی تصدیق کرتا ہے۔
2	ایک امتحانی ٹی میں 2 ملی لیٹر لسائن نچوڑ محلولیں۔ اب اس میں ایک ملی لیٹر مرتکز نائٹریک ایسڈ ڈالیں اور خوب تیز	ہلکا پیلا رنگ کا رسوب بنتا ہے جو کہ امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (NH ₄ OH) میں نا حل پذیر	Br عنصر کی تصدیق ہوتی ہے۔

	ہے۔	بلائیں اور پھر اس محلول کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب یہ محلول ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک ملی لیٹر (1ml) سلور نائٹریٹ (Silver Nitrate) محلول ملائیں۔	
3	ایک امتحانی ٹلی میں 2 ملی لیٹر لسائنہ نیچوڑ محلول لیں۔ اب اس میں ایک ملی لیٹر مرکب نائٹریک ایسڈ ڈالیں اور خوب تیز ابال لیں اور پھر اس محلول کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب یہ محلول ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک ملی لیٹر (1ml) سلور نائٹریٹ (Silver Nitrate) محلول ملائیں۔	گہرے پیلے رنگ کا تریسیبی مادہ بنتا ہے جو کہ امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (NH ₄ OH) میں حل پذیر ہے	1 عنصر کی تصدیق ہوتی ہے۔
کاربن ڈائی سلفائیڈ جانچ (Carbon disulphide Test)			
	ایک امتحانی ٹلی میں 2 ملی لیٹر لسائنہ نیچوڑ محلول لیں۔ اور چند قطرے مرکب ہائیڈرو کلورک ایسڈ (Conc. HCl) کے شامل کریں۔ اب اس محلول میں چند قطرے کاربن ڈائی سلفائیڈ ملائیں اور اس میں فوری تیار کردہ کلورین واٹر (Chlorine water) شامل کر لیں اور تیزی کے ساتھ ہلائیں۔	نارنگی رنگ (Orange colour) کی ایک پرت دکھائی دیتی ہے	Br عنصر کی تصدیق ہوتی ہے۔
	ایک امتحانی ٹلی میں 2 ملی لیٹر لسائنہ نیچوڑ محلول لیں اور چند قطرے مرکب ہائیڈرو کلورک ایسڈ (Conc. HCl) کے شامل	بیگنی رنگ (Violet colour) کی ایک پرت دکھائی دیتی ہے	I عنصر کی تصدیق ہوتی ہے۔

		کریں۔ اب اس محلول میں چند قطرے کاربن ڈائی سلفائیڈ ملائیں اور اس میں فوری تیار کردہ کلورین واٹر (Chlorine water) شامل کر لیں اور تیزی کے ساتھ ہلائیں۔	
--	--	---	--



کیمیائی تعاملات

Chemical Reactions





Carbon disulphide test



اکائی-2:

- الکوحل فعالی گروپ کی جانچ
- کار باکسلک فعالی گروپ کی جانچ
- فینالک فعالی گروپ کی جانچ
- الڈیہائیڈ اور کیٹون فعالی کی جانچ

اکائی - 2: الکوحل فعالی گروپ کی جانچ

(Unit-2: Identification of Alcoholic Group)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب میں الکوحل فعالی گروپ کی جانچ۔

آلات

: ٹیسٹ ٹیوب، برنر

کیمیائی اشیاء


سوڈیم دھات، گلیشیل ایسیٹک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، ایتھینول، سیرکامونیم نائٹریٹ، ایوڈین، سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		سوڈیم دھاتوں کے ذریعے جانچ (Sodium Metal Test)
دیے گئے نامیاتی مرکب میں الکوحل (OH) گروپ ہو سکتا ہے۔	بدبواہٹ کے ساتھ ہائیڈروجن گیس کا انکشاف ہوتا ہے۔	ایک سوکھی جانچ ٹی (Test Tube) لیں اس میں تقریباً ایک ملی لیٹر نمونہ ڈالیں اور پھر اس میں تازہ کٹے سوڈیم دھاتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں۔
		ایسٹر سازی کے ذریعے جانچ (Esterification Test)


دیے گئے نامیاتی مرکب میں الکوحل (OH) گروپ کی تصدیق کرتا ہے۔	پھلوں جیسی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔	نمونے کا ایک ملی لیٹر ایک سوکھی جانچ نلی میں لے کر اس میں ایک ملی لیٹر گلیشیل ایسٹک ایسڈ (Glacial Acetic acid) اور دو۔ تین قطرے مرکب سلفیورک ترشہ کے ملا کر اسے پن جنتر میں تقریباً دس منٹ تک گرم ہونے دیں۔ اب اسے ایک بیکر جس میں تقریباً 20 ملی لیٹر ٹھنڈا پانی ہو ڈال کر گھولیں۔
		تھیریک امونیم نائٹریٹ جانچ (Ceric Ammonium Nitrate Test)
دیے گئے نامیاتی مرکب میں الکوحل (OH) گروپ کی تصدیق کرتا ہے۔	گلابی یا سرخ لال رنگ ظاہر ہوتا ہے۔	نمونہ مرکب ایک سوکھی امتحانی نلی میں لے کر اس میں کچھ قطرے تھیریک امونیم نائٹریٹ کے ملائیں امتحانی نلی کو کچھ دیر اچھی طرح ہلائیں۔

Chemical Reactions

Sodium metal Test




Metal alkoxide





Sodium ethoxide



Ester Formation Test (Esterification)



Ceric ammonium nitrate (CAN) Test



Iodoform Test



کار باسکک فعالی گروپ کی جانچ

(Identification of Carboxylic Group)

مقصد

دیے گئے ہوئے نامیاتی مرکب میں کار باسکک فعالی گروپ کی جانچ۔

آلات

امتحانی نلی، برنر

کیمیائی اشیاء



لٹمس پیپر، ایسیٹک ایسڈ، ایسٹینول، سلفیورک ایسڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		لٹمس کاغذی جانچ (Litmus Paper Test)
دیے گئے نامیاتی مرکب میں کار باسکک گروپ (COOH) ہو سکتا ہے۔	نیلا لٹمس کاغذ کارنگ لال ہو جائیگا۔	نیلے لٹمس کاغذ پر کچھ قطرے یا کر سٹل کے رکھیں۔
		سوڈیم بائی کاربونیٹ جانچ (Sodium bicarbonate Test)
دیے گئے نامیاتی مرکب میں کاربوکسک	تیز بدبواہٹ کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO ₂) گیس کا انکشاف	ایک سوکھی جانچ نلی میں 5 ملی لیٹر ہاکا سوڈیم بائی کاربونیٹ (NaHCO ₃) کا محلول

لیس اور کچھ مرکب کے کرٹل یا قطرے ملائیں۔ اور پھر مشاہدہ کریں۔	ہوتا ہے۔	گروپ (COOH) کی تصدیق کرتا ہے۔
ایسٹر جانچ (Ester Test)		
ایک صاف سوکھی جانچ نلی میں دو حصے ایستھنول (2 حصہ) اور ایک حصہ سلفیورک ٹریشہ (1 حصہ) لے کر اس میں کچھ قطرے یا کرٹل دیے گئے مرکب کے ملائیں اور اسے احتیاط سے پنجر پر تقریباً پانچ منٹ تک گرم کریں۔	پھلوں جیسی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔	دیے گئے نامیاتی مرکب میں کاربکسک گروپ (COOH) کی تصدیق کرتا ہے۔

کیمیائی تعامل

Ester Formation Test (Esterification)



فینالک فعالی گروپ کی جانچ

(Tests for Phenolic Group)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب میں فینالک فعالی گروپ کی جانچ کی جائے گی۔

آلات

امتحانی ٹلی، برنر

کیمیائی اشیاء

لٹمس پیپر، فیرک کلورائیڈ، سوڈیم نائٹرائٹ، سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ، سلفیورک ایسڈ،

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ	سلسلہ نمبر
لٹمس کاغذی جانچ (Litmus Paper Test)			
دیے گئے نامیاتی مرکب میں فینال گروپ ہو سکتا ہے۔	نیلا لٹمس کاغذ کا رنگ لال ہو جائے گا۔	نیلے لٹمس کاغذ پر کچھ قطرے یا کرشٹل کے رکھیں۔	1-
2- تعدیلی فیرک کلورائیڈ (Neutral FeCl ₃ Test) کی جانچ			
دیے گئے نامیاتی مرکب میں فینال گروپ کی تصدیق کرتا ہے۔	محلول کا رنگ بنفشی یا نیلا رنگ ہو جاتا ہے۔	ایک خشک جانچ ٹلی میں مرکب کی تھوڑی سی مقدار میں 2 ملی لیٹر پانی ملائیں اور خوب ہلائیں۔ پھر تعدیلی فیرک کلورائیڈ محلول کے دو قطرے ملائیں اور مشاہدہ کریں۔	


نوٹ۔ آرتھو، میٹا پیپیرا، کریسیل ریسیلینال، بنفشی یا نیلا رنگ دیتے ہیں۔


3- لیبرمین جانچ (Liebermann's Test)

دے گئے نامیاتی مرکب میں فینال گروپ کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے	کچھ دیر کے بعد گہرا سبز یا نیلا رنگ حاصل ہوگا جو ہلانے پر سرخ ہو جائے گا۔ اس محلول میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا محلول ملانے پر پھر سے محلول میں نیلا یا سبز رنگ ظاہر ہو جائے گا۔	سوڈیم نائٹریٹ کے کچھ قلماء کو ایک خشک جانچ نلی میں ڈال لیجئے اور اس میں 0.5 گرام فینال ملائیں۔ اس کو آدھے منٹ کے لئے آہستہ آہستہ گرم کیجئے پھر ٹھنڈا کر کے مرتکز سلفیورک ترشہ کے پانچ یا چھ قطرے ملائیں
--	--	---

کیمیائی تعاملات

Chemical Reactions





الڈیہائیڈ اور کیٹون فعالی گروپ کی جانچ

(Test of Aldehyde and Ketones)

مقصد

دیے گئے نامیاتی مرکب میں الڈیہائیڈ اور کیٹون فعالی گروپس کی جانچ

تمہید

کاربن، آکسیجن دوہرا بند (C=O) کاربونل گروپ کہلاتے ہیں۔ اس اہم نامیاتی مرکبات میں اگر کاربونل گروپ، کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو الڈیہائیڈ کہلاتا ہے اور اگر کاربونل مرکبات دونوں کاربن ایٹم کے ساتھ بندش میں ہوتا ہے تو کیٹون (Ketone) بناتے ہیں۔ اور جب کاربونل گروپ، آکسیجن کے ساتھ بندش کرتا ہے تو کاربواسلک ایسڈ (Carboxylic acid) کہلاتا ہے۔

آلات


ٹیسٹ ٹیوب، برنز

کیمیائی اشیاء


2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین، ٹالس متعمل، فہلنگ محلول

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		1- ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین متعمل سے تعامل (2,4-DNP Test)
دیے گئے نامیاتی مرکب میں الڈیہائیڈ یا کیٹون گروپ (Carbonyl) کی موجودگی کو بتاتا ہے۔	ہلکے سرخ یا نارنگی رنگ کا مرکب حاصل ہوتا ہے۔	دو یا تین قطرے مرکب کو ایک ملی لیٹر میتھنول میں ملا کر اچھی طرح گھول لیں اور 2,4-DNP متعمل ملائیں۔ ضروری


		ہو تو ہلکا گرم کیجئے
		2 - ٹولنس متعامل سے جانچ (Tollen's Reagent Test) یا سلور آئینہ جانچ (Silver-mirror (Test
دے گئے نامیاتی مرکب میں الڈیہائیڈ گروپ کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔	ایک چمک دار نقرئی آئینہ، جانچ نلی کی دیواروں پر نمودار ہوگا	ایک صاف خشک جانچ نلی میں تھوڑا سا نامیاتی مرکب لیجیے اور پھر اس میں کچھ بوند ٹولنس متعامل کی دالیں اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے پہلے سے گرم پنجر پر گرم کریں۔
		3- فہلنگ محلول سے جانچ (Fehling's Solution Test)
دے گئے نامیاتی مرکب میں الڈیہائیڈ گروپ کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔	Cu_2O کے سرخ رنگ کا رسوب حاصل ہوتا ہے۔	فہلنگ متعامل A اور B کے ایک ایک ملی لیٹر کو 10 ملی لیٹر مرکب میں ملائیں اور پھر گرم پنجر پر پانچ منٹ تک گرم کریں۔



Tollen's Test (Silver mirror Test)



Fehling Test



اکائی-3: ایسپرین کی تیاری

(Unit-3: Preparation of Aspirin)

مقصد

تجربہ خانہ میں ایسپرین (Aspirin) تیار کرنا ہے۔

اغراض

ایسپرین سالیسیک ترشہ (Salicylic Acid) کا ایسٹائل (Acetyl) مشتق ہے جو عام طور پر ایک درد کش (Pain Killer) دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ایسپرین کو عام طور پر سرد درد، دانت درد، سردی و زکام، عضلاتی یا پٹھوں میں درد، دل کے دورہ کی روک تھام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

حاصل تجربہ

ایسپرین کے حصول کے بعد تجربے کے اختتام پر طالب علم اس قابل ہونگے۔ o-Acylation تعامل پر اثر کرنے والے مطلوبہ حالتوں کو سمجھ سکیں گے۔ اور N-Acylation اور o-Acylation تعاملات کے لئے مطلوبہ حالتوں میں فرق کا امتیاز بھی کر سکیں گے۔ ایسپرین کی تیاری کے دوران واقع ہونے والے نامیاتی تعامل کی نوعیت کو بھی صحیح سمجھا سکیں گے۔

کیمیائی آلات

- (i) 100 ملی لیٹر کا خشک منتقارہ
- (ii) خشک امتحانی نلی
- (iii) استوائی پیمانہ
- (iv) شیشہ کی سلاخ

کیمیائی اشیاء


- (i) 5 گرام سلیسیک ترشہ
- (ii) 10 ملی لیٹر ایسٹک این یہائیڈرائیڈ

اصول

سالیسیک ترشہ (Salicylic Acid) اور لیسٹک این ہائیڈرائیڈ (Acetic Anhydride) کے درمیان کیمیائی تعامل ہوتا ہے مرکب سلفیورک ترشہ (Conc. H₂SO₄) چند قطروں کی موجودگی میں اور اس دوران سالیسیک ترشہ میں موجود OH گروپ کا اسیلیشن (Acylation) واقع ہوتا ہے اور ایٹائل سالیسیک ترشہ (Acetyl Salicylic Acid) تیار ہوتا ہے جسے اسپرین (Asprin) کہتے ہیں۔

کیمیائی تعاملات

حسب ذیل کیمیائی تعامل کو ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے۔



تیاری کا طریقہ عمل

ایک خشک 100 ملی لیٹر منقارہ (Beaker) میں 5 گرام سالیسیک ترشہ (Salicylic Acid) لیں۔ اس میں 15 ملی لیٹر ایسٹک اینہائیڈرائیڈ (Acetic Anhydride) ڈال کر دو قطرے مرکب سلفیورک ترشہ (Conc. H₂SO₄) کے ڈالیں۔ شیشہ کی سلاخ (Glass Rod) کے ذریعہ 30 منٹ تک منقارہ (Beaker) میں موجود اشیاء کو خوب ہلائیں۔ اسی کے بعد ان تمام اشیاء کو ایک ایسے بیکر میں منتقل کر دیں جس میں پہلے ہی سے 100 ملی لیٹر پانی موجود ہو۔ ایک سفید ٹھوس شے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آئیگا۔ بختسرفیف (Buchner Funnel) کے ذریعہ ٹھوس کو مل تقطیر کے ذریعہ علیحدہ کر لیں اور پانی کے ساتھ بار بار دھولیں۔ اس کے بعد 50 فیصد ایتھانائل الکوحل کے ساتھ عمل قلماء دہرائیں۔ حاصل شدہ مرکب کی مقدار اور نقطہ اماعت معلوم کریں اور نوٹ کر لیں۔

رپورٹ

(i) حاصل شدہ خالص مرکب کی مقدار..... گرام

(ii) حاصل شدہ خالص مرکب کی نقطہ اماعت..... °C

احتیاطی تدابیر

اس بات کا خاص خیال رکھیں اور احتیاط برتیں کہ منقارہ خشک رہے اور تعامل کو مکمل کرنے کے لئے دو قطرے مرتکز H_2SO_4 ترشہ ڈالیں۔

اکائی-4a : نامیاتی مرکبات کی تخلیص (Purification of Organic Compounds)

• عمل قلماء (Crystallization)

• عمل کشید (Distillation)

عمل قلماء

(Crystallization)

مقصد

غیر خالص ٹھوس نامیاتی مرکبات کی تخلیص عمل قلماء کے ذریعہ کرنا۔

اغراض

ٹھوس غیر خالص نامیاتی مرکبات کی تخلیص کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ قلماء یا دوبارہ قلماء کا ہے۔ اس طریقہ عمل کو پڑھنے سیکھنے اور تجرباتی طور پر کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی ناخالص یا خام ٹھوس کاربن مرکب کی تخلیص کس طرح ہوتی ہے عمل قلماء کے ذریعہ واقف ہو جائیں گے۔

آلات

- (i) 100 ملی لیٹر کی مخروطی صراحی
- (ii) قیف
- (iii) بنسن برنر
- (iv) ٹرائی پوڈ اسٹادہ
- (v) بیکریا منتقارہ

کیمیائی اشیاء


- (i) غیر خالص ٹھوس نامیاتی مرکب جس کی تخلیص درکار ہے۔
- (ii) موزوں محلل (Suitable Solvent)

اصول


عمل قلماء میں ایک غیر خالص یا خام ٹھوس نامیاتی مرکب کو مناسب موزوں محلول (Solvent) میں حل کیا جاتا ہے جس میں کمرہ کے درجہ حرارت پر بہت کم حل پذیر اور زیادہ درجہ حرارت پر قابل لحاظ حد تک حل پذیر ہے۔ محلول کو جب ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو خالص مرکب کی قلم سازی علیحدہ ہوتی ہے۔ جسے عمل تقطیر کے ذریعہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اگر خام ٹھوس مرکب ایک محلول میں بہت زیادہ حل پذیر ہے اور دوسرے محلول میں بہت کم حل پذیر ہے تو اس کا قلماء ان دونوں محلولوں کے آمیزے میں کیا جاتا ہے ملاوٹیں اگر محلول کو رنگین بنا دیتی ہیں تو انہیں عامل کردہ چار کول پر سطحی جاذبیت (Adsorption) کے ذریعہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔

طریقہ عمل

عام طور پر خام ٹھوس نامیاتی مرکب کو ایک موزوں محلول میں حل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا انحصار صحیح اور موزوں محلول کے انتخاب پر ہے ایک اچھے اور موزوں محلول سے مراد ایسا محلول جس میں ٹھنڈی حالت میں مرکب کم حل پذیر ہو اور گرم حالت میں بہت زیادہ حل پذیر ہو۔ محلول میں لوٹیں (Impurities) ٹھنڈا اور گرم دونوں حالتوں میں نا حل پذیر ہوتی ہیں اس طریقہ کے دوران شے کو گرم محلول میں حل کیا جاتا ہے اور گرم حالت میں ہی قیف کو استعمال کرتے ہوئے عمل تقطیر (Filtration) کیا جاتا ہے۔ اور مقطر (Filtrate) کو کمرہ کی تیش تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور شے بہت ہی عمدہ سوئیوں ((needles کی شکل میں قلمی حالت میں علیحدہ ہوتی ہیں۔ خالص شے جو حاصل ہوتی ہے اس کو باقی محلول سے الگ کر لیا جاتا ہے اور خشک حالت میں لایا جاتا ہے۔ 100 ملی لیٹر کی مخروطی صراحی میں تقریباً ایک گرام غیر خالص یا خام ٹھوس مرکب لیا جاتا ہے۔ جس کی تخلیص مراد ہے۔ اس میں منتخب شدہ موزوں محلول کو ملایا جاتا ہے اور اس میں کے اجزاء کو شفاف محلول حاصل ہونے تک گرم کر لیا جاتا ہے۔ گرم حالت میں محلول سے لوٹوں کو الگ کرنے کے لیے محلول کی تقطیر کی جاتی ہے۔ اور شفاف مقطر کو عمل تبخیر (Evaporation) کے ذریعہ محلول کا حجم کم کر کے مرکب کو نکالنے کے لئے گرم کیا جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو خالص مرکب کی قلمی الگ کر لی جاتی ہیں اور انہیں خشک کر لیا جاتا ہے اور حاصل شدہ خالص خشک ٹھوس مرکب کا نقطہ امانت اور اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے عمل قلماء کا طریقہ عمل مندرجہ ذیل شکل 3.2 میں بتائے گئے طریقہ سے کیا جاتا ہے۔



شکل 4a.1: عمل قلماء (Crystallization)



شکل 4a.2: The Steps of Re_crystallization

احتیاطی تدابیر

- (i) موزوں محلل کا انتخاب بہت ہی احتیاط سے کریں۔
- (ii) مرکب کی تخلیص ہونے کے بعد قلمیں الگ کرنے میں احتیاط برتیں۔

رپورٹ

- (i) حاصل کردہ خالص ٹھوس نامیاتی مرکب کا نقطہ اجماع °C
- (ii) حاصل کردہ خالص ٹھوس نامیاتی مرکب کی مقدار گرام

☆☆☆

عمل کشید

(Distillation)

مقصد

غیر خالص یا خام مائع نامیاتی مرکب (Impure Liquid Organic Compound) کی تخلیص کا عمل کشید (Distillation) کا طریقہ عمل۔

اغراض

نامیاتی مرکبات کے اس طریقہ عمل کشید کو پڑھنے سیکھنے اور تجربہ کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک خام یا غیر خالص مائع نامیاتی مرکب کی تخلیص عمل کشید کے ذریعہ کس طرح کی جاسکتی ہے۔

آلات

- (i) 250 ملی لیٹر گول پیندہ والی صراحی یا فلاسک
- (ii) چینی کے ٹکڑے یا جھانواں پتھروں کے ٹکڑے
- (iii) تار کی جالی
- (iv) گرم پن خبتر
- (v) تپش پیما
- (vi) بنسن برز یا شعلہ
- (vii) لیگ کلنٹھ یا کنڈینسر
- (viii) قفلی
- (ix) استادے

کیمیائی اشیاء


(i) غیر خالص یا خام مائع نامیاتی مرکب جس کی تخلص مراد ہے۔

اصول

خام یا غیر خالص کاربن کے مائع مرکبات کی تخلص کے لئے سادہ اہم اور مفید جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو عمل کشید کہتے ہیں۔ عام طور پر مائع نامیاتی مرکبات بہت زیادہ طیران پذیر (Volatile) ہوتے ہیں اسی لئے ان کی تخلص طیران پذیری کے اصول کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران حاصل ہونے والے بخارات کو موزوں مکثف (Suitable condenser) کے ذریعہ مکثیف (Condense) کر کے مائع حاصل کیا جاتا ہے جو خالص حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ غیر طیران پذیر (non-volatile) تو پیش کشیدی فلاسک میں رہ جاتی ہے۔

طریقہ عمل

250 ملی لیٹر کروی پیندہ والی صراحی (Round Bottom Flask) میں تقریباً 50 ملی لیٹر غیر خالص یا خام مائع لیا جاتا ہے مائع کے ہموار جوش کے لئے چند چینی کے ٹکڑے یا جھانواں پتھری کے ٹکڑے (Pumice stone pieces) ڈالے جاتے ہیں۔ کشیدہ آلات کو ترتیب کے ساتھ شکل 3.1 میں دکھائے گئے طریقہ سے جوڑ دیا جاتا ہے اب جو مائع غیر خالص نامیاتی مرکب گول پیندہ صراحی میں لیا گیا ہے اس کے بعد بے حد احتیاط کے ساتھ صراحی کے اجزا کو راست یا تار کی جالی پر رکھتے ہوئے بنسن کے شعلہ کے ذریعہ گرم پن خستہ پر گرم کیا جاتا ہے جب مائع ابلا نا شروع ہو جائے تو بخارات ایک مکثف یا کنڈینسر (Condenser) سے گذر کر مکثیف پاتے ہیں اور خالص مائع حاصل ہوتا ہے جس کو ایک ریسیور (Receiver) میں جمع کر لیا جاتا ہے عمل کشید کے بعد کشیدی صراحی میں باقی بچے مائع میں خام رہ جاتے ہیں اور خالص مرکب ریسیور میں حاصل ہوتا ہے غرض اس طرح سے عمل کشید کے ذریعہ ایک غیر خالص یا خام مائع نامیاتی مرکب کی تخلص کی جاتی ہے۔



شکل 4a.3 : عمل کشید (Distillation)

احتیاطی تدابیر

- (i) 80°C سے کم تپش پر جوش کھانے والے مائع کو گرم پن خبتر یا بنسن شعلہ کے ذریعہ راست یا تار کی جالی پر گرم کیا جانا چاہیے
- (ii) نامیاتی مائع مرکبات کے بخارات انتہائی آتش گیر ہوتے ہیں۔ اس لئے بخارات کے کھلے شعلے کے قریب جانے سے گریز کریں۔
- (iii) کشید آلات کو اس طرح جوڑیں کہ جوڑوں اور کارک لگے ہوئے مقام سے بخارات کا اخراج نہ ہو۔
- (iv) عمل کشید کے دوران کافی احتیاط برتیں اس لئے کہ بعض اوقات بخارات انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔

نتیجہ یارپورٹ

عمل کشید کے بعد کشید شدہ خالص مائع مرکب حاصل ہوا ہے اس خالص مرکب کا نقطہ جوش $^{\circ}\text{C}$ ہے۔

اکائی-4b : نامیاتی مرکبات کے نقطہ امانت اور نقطہ جوش کی تخمین

(Determination of Melting Point and Boiling Point of Organic Compounds)

- ٹھوس نامیاتی مرکب کے نقطہ امانت کی تخمین

(Determination of Melting Point of Solid Organic Compounds)

- مائع نامیاتی مرکب کے نقطہ جوش کی تخمین

(Determination of Boiling Point of a Liquid Organic Compounds)

ٹھوس نامیاتی مرکب کے نقطہ اماعت کی تخمین

(Determination of Melting Point of Solid Organic Compounds)

مقصد

ٹھوس خالص نامیاتی مرکب کے نقطہ اماعت کو تجربہ خانہ میں تخمین کرنا۔

اغراض

اس تجربہ کی پوری عبارت یا مضمون کو پڑھنے، سیکھنے اور تجرباتی طور پر کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے اور انہیں معلوم ہو جائیگا کہ،

- (i) نامیاتی مرکب کا نقطہ اماعت اسکی تخلص کو پہچاننے کا ایک تجرباتی طریقہ ہے۔
- (ii) نامیاتی مرکب کے نقطہ اماعت کی تخمین دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک مرکب کے صفوف کو شعری نلی (Capillary Tube) میں داخل کرنا اور دوسرا نقطہ اماعت کے آلہ کی ترتیب۔

آلات

- (i) 200 ملی لیٹر منقارہ (بیکر)
- (ii) تھرماسٹیا تپش پیا 110°C والا یا 360°C والا
- (iii) شعری نلی چینی یا شیشے کی سلاخ (iv) تار کی جالی
- (v) ٹرائپاڈ استادہ (vi) بنسن برنر
- (vii) کلامپ والا استادہ

کیمیائی اشیاء

- (i) ٹھوس نامیاتی مرکب
- (ii) پانی یا مرکنز H_2SO_4 ترشہ یا گلیرین یا مالچ پیرافن جسکا استعمال نقطہ اماعت پر منحصر ہوتا ہے۔

اصول

خالص ٹھوس نامیاتی مرکب کو چینی کی تختی (Glass Plate) یا ہون (Mortar) میں لیکر عمدہ سفوف بنالیا جاتا ہے جس کو شعری نلی (Capillary Tube) میں داخل کرنے کے لئے ایک سرے کو شعلہ سے گرم کر کے بند کیا جاتا ہے اور دوسرا سر اکلار کھا جاتا ہے سفوف مرکب موجود شعری نلی کی بیرونی سطح کو تپش پیا کے بلب کو چمٹا دیا جاتا ہے تپش پیا بلب بیکر میں موجود سلفیورک ترشہ میں رکھا ہوتا ہے عام طور پر سطحی تناؤ (Surface Tension) کی وجہ سے شعری نلی خود تھرما میٹر سے چمٹ جاتی ہے بیکر کے اندر جس میں سلفیورک ترشہ ہے اس کے اندر تھرما میٹر سے منسلک شعری نلی کو داخل کر کے گرم کیا جاتا ہے اور مرکب پگھلنے پر مرکب کی نقطہ اماعت نوٹ کی جاتی ہے۔

نوٹ: اگر ٹھوس مرکب کا نقطہ اماعت 100°C سے کم ہو تو H_2SO_4 ترشہ کی بجائے بیکر میں پانی بھی لیا جاسکتا ہے اور اگر 200°C سے زیادہ ہے تو مائع پیرافن (Liquid Paraffin) یا گلیسرول (Glycerol) استعمال کیا جاتا ہے۔


طریقہ عمل

تھوڑا سا دیا گیا خالص ٹھوس نامیاتی مرکب لیکر چینی کی تختی (Glass Plate) یا ہون (Mortar) میں ڈال کر اچھی طرح پیس کر عمدہ سفوف بنالیں۔ ایک تقریباً 8 تا 10 سمر لمبی شعری نلی (Capillary Tube) لیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں اس کے ایک سرے کو بنسن کے شعلہ (Bunsen Burner) کی مدد سے بند کر دیں اور دوسرے کھلے سرے کے ذریعہ مرکب کے سفوف کو شعری نلی میں ڈھکیلیں اور آہستہ سے تھپتھپاتے ہوئے مرکب کے سفوف کو شعری نلی میں آدھی نلی سے زیادہ داخل کر لیں۔ شعری نلی پر اگر مرکب کی کچھ مقدار چمٹی ہوئی ہو تو اسکو تقطیری کاغذ (Filter paper) کے ذریعہ صاف کر لیں۔ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے 100 ملی لیٹر والا ایک منقارہ (Beaker) لیں اور اس میں آدھا بیکر تک مرکنز H_2SO_4 ڈال لیں۔

نوٹ: (اگر مرکب کا نقطہ اماعت 100°C سے کم ہونے کا اندیشہ ہو تو مرکنز H_2SO_4 ترشہ کی بجائے پانی استعمال کر سکتے ہیں)۔

تھرما میٹر کے بلب کو مرکنز H_2SO_4 ترشہ میں بھگو کر شعری نلی جس میں مرکب کا سفوف موجود ہے چمٹائیں سطحی تناؤ (Surface Tension) کی وجہ سے شعری نلی خود تھرما میٹر سے چمٹ جائیگی اگر یہ پوری طرح چمٹ نہ جائے تو دھاگے یا ربر کی پٹی (Thread) کے ذریعہ شعری نلی کو تھرما میٹر کے بلب سے باندھیں۔ تھرما میٹر اور اس سے منسلک شعری نلی تو بیکر کے اندر جس میں مرکنز H_2SO_4 ترشہ لیا گیا ہے داخل کریں اور تھرما میٹر کو کلانپ والے استادہ (Clamp Stand) کو فکس کر دیں بیکر کو تاروالی جالی (Wire Gauge) پر رکھیں جو کہ ٹرائپاڈ (تہائی) استادہ (Tripod Stand) رکھا ہوا ہے اس استادہ پر جو تاروالی جالی ہے اسکے نیچے بنسن برنر (Bunsen Burner) رکھا ہوتا ہے جس کے ذریعہ آہستہ آہستہ گرم کرتے ہیں۔ گرم کرنے کا عمل اس وقت تک جاری رکھتے ہیں

جب تک کہ شعری نلی میں موجود ٹھوس نامیاتی مرکب کا سفوف پگھلنا نہ شروع ہو جائے اور تپش پر مسلسل نظر رکھیں جوں ہی مرکب پگھلنے لگے تھرمامیٹر میں تپش نوٹ کر لیں اس تجرباتی عمل کو دو یا تین مرتبہ دہرائیں اور حاصل ہونے والی تپش کی قیمتوں کا اوسط محسوب کریں۔ حاصل کردہ تھرمامیٹر کی اوسط تپش کی قیمت ہی مرکب کا نقطہ اماعت ہوتا ہے۔



شکل-4b.1: نقطہ اماعت کی تخمین

نتیجہ یارپورٹ

دیئے گئے خالص ٹھوس نامیاتی مرکب کا حاصل کردہ نقطہ اماعت $^{\circ}\text{C}$ -----

احتیاطی تدابیر

- (i) ٹھوس نامیاتی مرکب خشک ہو اور عمدہ سفوف کی حالت میں ہو۔
- (ii) نقطہ اماعت اگر 100°C سے کم ہو تو 110°C تھرمامیٹر استعمال کریں ورنہ 360°C والا تھرمامیٹر استعمال کرنا ہو گا۔

Glycerol (استعمال کیا جاتا ہے۔

(iv) شعری نلی کے نچلے سرے اور تھرمائیٹر کو ایک ہی سطح پر رکھیں۔

نیچے دئے گئے جدول میں اپنے مشاہدات درج کریں۔

[illegible]

مائع نامیاتی مرکب کے نقطہ جوش کی تخمین

(Determination of Boiling Point of a Liquid Organic Compounds)

مقصد

مائع خالص نامیاتی مرکب کے نقطہ جوش کو تجربہ خانہ میں دریافت کرنا۔

اغراض

نقطہ جوش کی تخمین کے تجربہ کی پوری عبارت یا مضمون پڑھنے سیکھنے اور تجرباتی طور پر کرنے کے بعد طلبہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ نقطہ جوش کیا ہوتا ہے اور اسکی تخمین کس طرح کی جاتی ہے اور طلبہ کو معلوم ہو جائیگا کہ۔

- (i) نامیاتی مرکبات کی تخلیصیت (Purity) جاننے کا ایک تجرباتی طریقہ نقطہ جوش معلوم کرنا ہوتا ہے۔
- (ii) نقطہ جوش مائع نامیاتی مرکبات کے لئے معلوم کی جاتی ہے اور تخلیص کو جاننے کا تجرباتی طریقہ ہے۔

آلات

نقطہ جوش کے تعین کے تجرباتی طریقہ عمل میں مندرجہ ذیل آلات کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔

- (i) ایک شیشے کی سخت جوش امتحانی ٹلی۔
- (ii) امتحانی ٹلی کے لئے دو سورخ والا برکار کا ایک سورخ حساس تھرمامیٹر کے لئے اور دوسرا سورخ جوش کھانے والے مائع کے بخارات کے اخراج کے لئے۔
- (iii) بنسن برنر
- (iv) تہپائی استادہ
- (v) تار کی جالی
- (vi) جانبی ٹلی کے ساتھ 100 ملی لیٹر گول پیندہ والی کشید صراحی
- (vii) تھرمامیٹر
- (viii) واصل

(ix) امتحانی نلی جو واصل کے قریب رکھی جاتی ہے۔

درکار کیمیائی اشیاء

- (i) مائع نامیاتی مرکب جس کا نقطہ جوش معلوم کرنا ہے۔
(ii) چند چینی کے ٹکڑے یا جھانواں پتھروں کی ٹکڑے جوش کے دوران مائع کو اچھلنے سے بچانے کے لئے۔

اصول


نقطہ جوش مائع نامیاتی مرکب کا دو ترتیبوں کے ذریعہ دریافت کیا جاسکتا ہے کوئی ایک ترتیب اختیار کر سکتے ہیں ایک ترتیب میں نامیاتی مرکب جس کا نقطہ جوش معلوم کرنا ہے ایک سخت شیشے کی امتحانی نلی میں لیا جاتا ہے جسکو دو سوراخ والا برکارک لگایا جاتا ہے جس میں ایک سوراخ میں حساس تھرمامیٹر داخل کیا جاتا ہے اور دوسرے سوراخ کے ذریعہ جوش کھانے والے بخارات کا اخراج ہوتا ہے بنسن برنر کی مدد سے نلی گرم کی جاتی ہے مستقل تپش پر جب مائع جوش کھاتا ہے وہی تپش نقطہ جوش ہوتا ہے اسے نوٹ کر لیا جاتا ہے۔
دوسری ترتیب میں جانبی نلی والی گول پینڈہ والی صراحی لی جاتی ہے صراحی میں تھرمامیٹر اور جانبی نلی سے واصل (Adapter) لگایا جاتا ہے واصل کے ذریعہ امتحانی نلی جو اسے لگی ہوتی ہے اس میں خالص مائع حاصل ہوتا ہے اور اس تپش جس پر خالص مائع حاصل ہوتا ہے تو تپش نوٹ کیا جاتا ہے اور یہی نقطہ جوش ہے۔

طریقہ عمل


نقطہ جوش نامیاتی مائع مرکبات کی خالصیت کو جانچنے کا طریقہ ہے نقطہ جوش تجرباتی طریقہ عمل کے ذریعہ تعین کیا جاتا ہے۔
جس مائع نامیاتی مرکب کا نقطہ جوش معلوم کرنا ہو اسکو تقریباً 10 ملی لیٹر حجم ایک سخت شیشے کی امتحانی نلی میں لیا جاتا ہے اس نلی میں ایک ربرکارک (Rubber Cork) لگایا جاتا ہے جسکے ایک سوراخ میں حساس تھرمامیٹر (Sensitive Thermometer) داخل کیا جاتا ہے مائع کے جوش کھانے کے دوران بننے والے بخارات کے اخراج کے لئے کارک میں ایک اور سوراخ بنا دیا جاتا ہے نلی کو استادہ سے اس طرح فکس کر دیا جاتا ہے تاکہ نلی کا پینڈہ تہپائی استادہ (Tripod Stand) پر رکھی گئی تار کی جالی (Wire Guage) پر بیٹھ جائے یا رکھ دیا جائے۔ بنسن برنر (Bunsen Burner) کی مدد سے نلی کو گرم کیا جاتا ہے ایک احتیاط یہ برتیں کہ جوش کے دوران مائع کو اچھلنے سے بچانے کے لیے اس میں چند چینی کے ٹکڑے ڈالیں مستقل تپش پر نلی میں مائع جوش کھانے لگے گا۔ اس تپش کو نوٹ کر لیں خالص مائعات نمایاں نقطہ جوش ظاہر کرتے ہیں اور یہ تپش جوش کھانے کے دوران مستقل ہوتی ہے۔ غرض یہی نوٹ کی گئی تپش ہی نقطہ جوش ہوتی ہے۔

ایک دوسرا طریقہ عمل یہ ہے کہ ایک جانبی ٹی (Side Tube) والی 100 ملی لیٹر کشیدی صراحی لی جاتی ہے اس میں تقریباً 30 ملی لیٹر مائع مرکب لیا جاتا ہے صراحی میں ایک تھرما میٹر اور جانبی ٹی میں واصل (Adaptor) لگایا جاتا ہے۔ واصل کے قریب ایک امتحانی ٹی (Test Tube) کو رکھا جاتا ہے جس میں خالص مائع کو جمع کیا جاتا ہے اس پوری ترتیب کو تار کی جالی پر رکھا جاتا ہے جو کہ تہپائی استادہ پر رکھا ہوتا ہے بنسن برنز کے ذریعہ صراحی کو دھیمے شعلے سے گرم کیا جاتا ہے اور جب مائع جوش کھانے لگے تو تپش نوٹ کر لیا جائے۔ جوش کھانے کے دوران تپش مستقل ہوتی ہے اور یہی تپش نقطہ جوش ہوتی ہے جسکو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ نقطہ جوش کی تخمین کے یہ دونوں تجرباتی طریقوں کو مندرجہ ذیل شکلوں 1 اور 2 میں بتایا گیا ہے۔

نقطہ جوش کی تخمین کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے اشکال 4b.2 اور 4b.3 ہے۔



شکل-4b.3:



شکل-4b.2:

نتیجہ

تجرباتی طور پر دئے ہوئے مائع نامیاتی مرکب کا حاصل کردہ نقطہ جوش ----OC ہے۔

احتیاطی تدابیر

(i) نامیاتی مرکب مائع ہو اور خالص ہو۔

- (ii) نامیاتی مرکب کے بخارات کو برنر کے شعلہ سے دور رکھیں اس لئے کہ بخارات انتہائی آتش گیر ہوتے ہیں۔
- (iii) گرم کرنے کے لئے اگر بنسن برنر (Bunsen Burner) کو استعمال کیا جا رہا ہو تو شعلہ محافظ (Flame Protector) کا استعمال کیجئے۔
- (iv) اگر گرم جالی (Hot Wire Gauge) دستیاب ہو تو بہتر ہے اسے استعمال کیجئے اور کھلے شعلے کا استعمال سے احتراز یا گریز کیجئے۔

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

B. Sc. II Semester Examination, April / May 2025

Paper- DSC-2 Lab

Paper Code: BNCH201DCP

Paper: Organic Chemistry – 1

پرچہ: نامیاتی کیمیا - 1

Time/ گھنٹے: 3 / Hours

Maximum Marks/ جملہ نشانات: 20

1- ایسپرین کی تیاری کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اسکو تیار کیجیے۔ اسکے نقطک امارت کو رپوٹ کیجیے۔

2- دیئے گئے ٹھوس نامیاتی مرکب کے نقطہ امارت کی معلوم کیجیے؟۔

3- زبانی امتحان

4- ریکارڈ فائل